




د پوهنې وزارت
د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو
د روزنې او د ساینس د مرکز معینیت
د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي
کتابونو د تالیف لوی ریاست

کیمیا

لسم ټولگی

کیمیا لسم ټولگی



چاپ ۱۳۹۰ هـ. ش.

Ketabton.com



د پوهنې وزارت
د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو
د روزنې او د ساینس د مرکز معینیت
د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي
کتابونو د تالیف لوی ریاست

کیمیا

لسم ټولګی

د چاپ کال: ۱۳۹۰ هـ. ش



الف

ليکوالان:

پوهندوی دیپلوم انجینیر عبدالمحمد «عزیز» د کابل پوهنتون استاد.
مؤلف عتیق احمد شینواري د کیمیا د څانګې علمي غړی

علمي ایډیټي:

پوهندوی دیپلوم انجینیر عبدالمحمد «عزیز» د کابل پوهنتون استاد.

د ژبې ایډیټي:

مؤلف محمد قدوس د کونړ خیل

دیني، سیاسي او کلتوري کمیټه:

ډاکټر عطاء الله واحید د پوهنې وزارت ستر سلاکار او د نشراتو رئیس.
حسب الله راحل د تعلیمي نصاب په ریاست کې د پوهنې وزارت سلاکار.

مؤلف قاری مایل آقا «متقی» د اسلامي د څانګې علمي غړی

د څارنې کمیټه:


ډکټر اسلام الله محقق د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو د روزنې او د ساینس مرکز معین


ډکټر شیر علي ظریفې د تعلیمي نصاب د پروژې مسوول

د سر مؤلف مرستیال عبدالظاهر گلستاني د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف لوی رس

ډیزاین:

حمید کریمي (سینچل دره بی)








ملي سرود

دا وطن افغانستان دی	دا عزت د هر افغان دی
کور د سولې کور د تورې	هر بچی یې قهرمان دی
دا وطن د ټولو کور دی	د بلوڅو د ازبکو
د پښتون او هزاره وو	د ترکمنو د تاجکو
ورسره عرب، گوجر دي	پامیریان، نورستانیان
براهوي دي، قزلباش دي	هم ایماق، هم پشه یان
دا هیواد به قل خلیږي	لکه لمر پر شنه اسمان
په سینه کې د اسیا به	لکه زړه وي جاویدان
نوم د حق مو دی رهبر	وايو الله اکبر وایو الله اکبر



بسم الله الرحمن الرحيم

د پوهنې د وزیر پیغام گرانو ښوونکو او زده کوونکو،

ښوونه او روزنه د هر هېواد د پراختیا او پرمختګ بنسټ جوړوي. تعلیمي نصاب د ښوونې او روزنې مهم توک دی چې د معاصر علمي پرمختګ او ټولنې د اړتیاوو له مخې رامنځته کېږي. څرګنده ده چې علمي پرمختګ او ټولنیزې اړتیاوې تل د بدلون په حال کې وي. له دې امله لازمه ده چې تعلیمي نصاب هم علمي او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ښایي چې تعلیمي نصاب د سیاسي بدلونونو او د اشخاصو د نظریو او هیلو تابع شي. دا کتاب چې نن ستاسو په لاس کې دی، پر همدې ارزښتونو چمتو او ترتیب شوی دی. علمي ګټورې موضوعګانې پکې زياتې شوې دي. د زده کړې په بهیر کې د زده کوونکو فعال ساتل د تدریسي پلان برخه ګرځیدلې ده.

هیله من یم دا کتاب له لارښوونو او تعلیمي پلان سره سم د فعالې زده کړې د میتودونو د کارولو له لارې تدریس شي او د زده کوونکو میندې او پلرونه هم د خپلو لوڼو او زامنو په ټولګیو کې یې لارښوونه او روزنه کې پرله پسې ګډه مرسته وکړي چې د پوهنې د نظام هیلې ترسره شي او زده کوونکو او هېواد ته ښې بریاوې ور په برخه کړي.

پر دې ټکي پوره باور لرم چې زموږ ګران ښوونکي د تعلیمي نصاب په رغنده پلي کولو کې خپل مسؤلیت په رښتیني توګه سرته رسولی.

د پوهنې وزارت تل زیار ګاږي چې د پوهنې تعلیمي نصاب د اسلام د سپېڅلي دین له بنسټونو، د وطن دوستۍ د پاک حس په ساتلو او علمي معیارونو سره سم د ټولنې د څرګندو اړتیاوو له مخې پراختیا ومومي.


په دې ګډ کې د هېواد له ټولو علمي شخصیتونو، د ښوونې او روزنې له پوهانو او د زده کوونکو له میندو او پلرونو څخه هیله لرم چې د خپلو نظریو او رغنده وړاندیزونو له لارې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو په لاسه تالیف کې مرسته وکړي.

له ټولو هغو پوهانو څخه چې د دې کتاب په چمتو کولو او ترتیب کې یې مرسته کړې، له ملي او نړیوالو درنو مؤسسو، او نورو ملګرو هېوادونو څخه چې د نوي تعلیمي نصاب په چمتو کولو او تدوین او د درسي کتابونو په چاپ او وېش کې یې مرسته کړې ده، مننه او درناوی کوم.

ومن الله التوفیق

فاروق وردګ

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزیر



لومړۍ څپرکۍ

- ۲ د انومي تيوري پراختيا
- ۳ ۱-۱ : د انومي تيوري د پراختيا تاريخچه
- ۴ ۲-۱ : د انوم جوړښت
- ۹ ۳-۱ : انومي طيف
- ۱۱ ۴-۱ : د بور انومي تيوري
- ۱۷ ۵-۱ : اوسنۍ انومي تيوري
- ۲۴ ۶-۱ : څو الکتروني اټومونه الکتروني جوړښت
- ۲۸ د لومړۍ څپرکۍ لنډيز
- ۳۰ پوښتنې

دوهم څپرکۍ

- ۳۲ الکتروني ترتيب او د دوره يي عناصرونو خواص
- ۳۳ ۱-۲ : د پېروديک سيستم د جوړښت تاريخچه
- ۳۸ ۲-۲ : د عناصرونو الکتروني جوړښت
- ۴۱ ۳-۲ : د عناصرونو خواص او په دوره يي جدول کې دهغوي پر له پسې بدلون
- ۵۰ ۴-۲ : د انتقالی عناصرونو خواص
- ۵۴ د څپرکي لنډيز
- ۵۵ د څپرکي پوښتنې

درېم څپرکۍ

- ۵۸ کيمياوي اړيکې
- ۵۹ ۱-۳ : د کيمياوي اړيکو ځانګړتياوي او د ليريس سمبولونه
- ۶۰ ۲-۳ : د اوکسيت قانون او د ليريس جوړښت
- ۶۴ ۳-۳ : د کيمياوي اړيکو ډولونه
- ۶۴ ۳-۳ : ۱-۳ : اړيکې
- ۷۰ ۳-۳ : ۲-۳ : اشتراکي اړيکې
- ۸۵ د درېم څپرکي لنډيز
- ۸۶ د درېم څپرکي تمرين

څلورم څپرکۍ

- ۸۸ د ماليکولونو جوړښت او د هغوی قطبيت
- ۸۹ ۴-۱ : د ماليکولونو د مرکزي اټوم ولاسي قشر
- ۹۲ ۴-۲ : خطي ماليکولونه (يوه جوړه ازاد الکترونونه)
- ۹۳ ۴-۳ : مسطح ماليکولونه (د الکترونونو درې جوړې)
- ۹۴ ۴-۴ : څلور سطحي ماليکولونه (څلور جوړې الکترونونه)




لړلیک

سرلیک

مخ

۱۰۰.....	د اوبو ماليکولې جوړښت.....
۱۰۶.....	د څلورم څپرکي لنډيز.....
۱۰۷.....	د څلورم څپرکي پوښتنې.....
	پنځم څپرکي
۱۱۰.....	د ماليکولونو ترمنځ قواوې.....
۱۱۱.....	۱-۰: د کيمياوي اړيکو ترمنځ توپيرونه او د ماليکولونو ترمنځ قوۀ.....
۱۱۱.....	۲-۰: د ماليکولونو ترمنځ د جذب د قواو د ډولونه.....
۱۲۲.....	۳-۰: د موادو په فزيکي خواصو باندې د قواو اغيزې.....
۱۲۸.....	د پنځم څپرکي لنډيز.....
۱۲۹.....	د پنځم څپرکي تمرين.....
	شپږم څپرکي
۱۳۲.....	د مادي حالتونه.....
۱۳۳.....	۱-۶ جامدات مایعات او گازونه.....
۱۳۴.....	۱-۱: د جامداتو څښې لومړنې ليدنې.....
۱۳۴.....	۲-۱-۶: بلورونه.....
۱۴۰.....	۳-۱-۶: جامداتو ډولونه.....
۱۴۴.....	۴-۱-۶: د جامداتو خواص.....
۱۴۵.....	۲-۶: مایعات.....
۱۴۵.....	۱-۲-۶: د مایعاتو عمومي خواص.....
۱۴۵.....	۱-۱-۶: د مایعاتو اود گازونو دڅپرېدلو پرتله.....
۱۴۶.....	۲-۱-۶: براس کيځل او دمایعاتو د براس فشار.....
۱۴۷.....	۳-۱-۶: د مایعاتو د ایشیدو درجه.....
۱۴۸.....	۲-۱-۶: دودوخه او د مادي بدلونونه.....
۱۵۰.....	۲-۱-۴: د مایعاتو کنگل کيځل.....
۱۵۱.....	۳-۶: گازونه.....
۱۵۲.....	۱-۳-۶: گازي مادي مقدار.....
۱۵۲.....	۲-۳-۶: د بایل قانون.....
۱۵۴.....	۳-۳-۶: د چارلس قانون (په گازونو باندې د تودوخې اغيزه).....
۱۵۷.....	۴-۳-۶: د اوگدرو اصل.....
۱۵۸.....	۳-۳-۵: د ايډيال گازونو قوانين.....
۱۶۱.....	۳-۳-۶: ديو ايډيال گاز د مولي حجم محاسبه په شرايطو کې.....
۱۷۲.....	د شپږم لنډيز پوښتنې.....
۱۷۳.....	د شپږم څپرکي پوښتنې.....



اووم څپرکی

۱۷۶		کیمیایي تعاملونه
۱۷۷		۱-۷ : د کیمیایي معادلې مفهوم
۱۸۰		۲-۷ : د کیمیایي تعاملونو ډولونه
۱۹۸		د اووم څپرکي لنډيز
۱۹۹		د اووم څپرکي پوښتنې

اتم څپرکی

۲۰۲		د اکسیدیشن - ریدکشن تعاملونه
۲۰۳		۱-۸ : د اکسیدیشن او ریدکشن تعریف
۲۰۴		۲-۸ : د عناصرونو د اکسیدیشن نمبر
۲۰۷		۳-۸ : د اکسیدیشن - ریدکشن د تعاملونو ډولونه
۲۰۸		۴-۸ : Oxidation - Reduction تعاملونو د بیالاس ترتیب میتود
۲۱۲		۵-۸ : Redox تعاملونه په بیلابیلو محیطونو کې
۲۱۶		۶-۸ : د اکسیدیشن او ریدکشن کیمیایي تعاملونو د بیالاس ترتیب د پر اکسیدونو
۲۱۸		۷-۸ : د ریدوکس تعاملونو د ترتیب او توازن ځانګړی حالتونه او نور
۲۲۰		د اتم څپرکي لنډيز
۲۲۲		د اتم څپرکي پوښتنې

نهم څپرکی

۲۲۴		په کیمیا کې قوانین او محاسبې
۲۲۵		۱-۹ : د علمي مسائلو بنسټونه
۲۲۶		۲-۹ : د مادي او بقا قانون او یا د کتلې پایښت
۲۲۹		۳-۹ : د ثابتو نسبتونو قانون
۲۲۹		۴-۹ : د متعددو نسبتونو قانون یا د دالټن قانون
۲۳۰		۵-۹ : د معاملتونو قانون
۲۳۴		۶-۹ : د حجمي نسبتونو قانون
۲۳۵		۷-۹ : د اوږدو قانون
۲۳۷		۸-۹ : نسبتې اټومي کتله
۲۳۹		۹-۹ : د مالیکول نسبتي کتله
۲۴۰		۱۰-۹ : مول اټوم - ګرام او مالیکول - ګرام
۲۴۱		۹-۱۱ : د مرکبونو د جوړونکو عناصرونو د سلني لاس ته راوړل
۲۴۲		۹-۱۲ : تجربي او مالیکولي فورمول
۲۴۶		د نهم څپرکي لنډيز
۲۴۷		د نهم څپرکي تمرین



سرنيزه

کيميا هغه پوهنه ده چې د موادو د جوړښتونو ، خواصو او د بنسټيزو بدلونونو او تېرلاؤ څخه بحث کوي. دا پوهنه د طبيعي پوهنو يوه برخه ده چې د انسانانو د تجربو او څيړنو پرله پسې پيروي په بهير کې منځته راغلې ده .

کيميا ډيري ځانگړې لري چې د هغوی د ډلې څخه يوه يې هم عمومي کيميا ده. د لسم ټولگي کيميا د عمومي کيميا يوه لنډه برخه ده چې په ځانگړي توگه دا لاندې څپرکي او سرليکونه د کيميا په دې کتاب کې د مطالعې او څيړنې لاندې نيول شوي دي :


په لومړۍ څپرکي کې داتومي تيوري پراختيا، داتومي تيوري دپراختيا تاريخچه، داتوم جوړښت، اتمي طيف، کوانتوم ميخانيک او اوسني اتمي تيوري روښانه شوي ده . په دويم څپرکي د بربړودیک سيستم د جوړښت تاريخچه ، د عنصرونو الکتروني جوړښت ، د عنصرونو خواص او په دوره يي جدول کې د عنصرونو پرله پسې بدلون او د انتقالی عنصرونو د خواصو په اړه بحث شوی دي . په درېيم څپرکي کيمياوی اړيکې (chemical Bond) له ټولو ځانگړتياوو سره يې ، د ليويس سمبولونه ، د اوکټيت قانون او د ليويس جوړښت روښانه شوي دي .


په څلورم څپرکي کې د ماليکولونو د جوړښت او د هغوی د قطبيت په اړه معلومات وړاندې شوي دي . په پنځم څپرکي کې د ماليکولونو ترمنځ قواوې او د قواو ډولونه روښانه شوي دي چې د ډاډې پول – ډاډې پول د متقابل عمل قوه، د وانډرالس Vander walls forces) او لندن قواو ، هايډروجنې اړيکه او دموادو په فزيکي خواصو باندې د قواو اغيزه روښانه شوي ده.

په شپږم څپرکي کې د مادي حالتونه (جامد، مايع او گازونه) د گازونو قوانين د بحث لاندې نيول شوي دي او په اووم څپرکي کې کيمياوي تعاملونه وړاندې شوي دي چې د کيمياوي معادلو د مفهوم د کيمياوی تعاملونو د ډولونو په اړه توضيحات ورکړ شوي دي .

په اتم څپرکي کې د اکسايډيشن - ريډکشن تعاملونه، د اکسايډيشن – ريډکشن تعريف، د عنصرونو د اکسايډيشن نمبر، د اکسايډيشن – ريډکشن د تعاملونو ډولونه او د Reduction – oxidation د تعاملونو د بيلاس او ترتيب ميتودونه روښانه شوي وي .

نهم څپرکي په کيميا کې قانونونه او محاسبې رابښي او د کيميا بنسټيز قوانين روښانه کوي . د هر څپرکي په پاې کې لنډيز او ناحل شوي پوښتنې د زده کوونکو د مشق او تمرين په موخه وړاندې شوي دي ترڅو د هغوی په حل سره زده کوونکي ډير او ښه زده کړه وکړي شي. په دې کتاب کې کوشنې شوي دي چې زده کوونکي په مطلوبو کې ورنننه او د هغوی په زده کړه کې اسانتياوې را منځته شي .





د اټومي تیورۍ پراختیا

اټوم څه شی دي؟ د ساینس کومو پوهانو د اټوم د جوړښت په اړه څېړنې کړي دي او د اټومونو څرنگوالی فعل، انفعال او د اټومونو جوړښت یې توضیح کړي دي؟ اټومونه د کومو بنسټیزو ذرو څخه جوړ شوي دي؟ د الکترونونو څرنگوالی او حرکت د اټوم د هستې په چاپیریال کې په کوم شکل دي؟ د الکترونونو ځانګړتیاوي د اټوم د هستې په چاپیریال کې د کومو کوټنومو نمبرونو په واسطه روښانه کېدای شي؟

د دې څېړنې په لوستلو کولای شو چې د اټوم او د اټوم د الکتروني جوړښت په اړه معلومات تر لاسه او پورتني پوښتنې حل کړای شو.



۱- ۱: د اټومي تیورۍ د پراختیا تاریخچه

د علومو په تاریخ کې یوه له پخوانیو تیوریو څخه داسې وایي چې مواد تر هغه حده په کوچنیو ذرو وشل کیدای شي کوم چې نور په کوچنیو ذرو د ویش وړ نه وي. د تیورۍ د یوناني فیلسوف دیموکریټ (Democritus) په نوم په ۴۰۰ ق م کې پیشنهاد شوی ده ، نوموړي عالم دا ذرې د اټومونو (Atoms) په نامه یاد کړي دي ، په هغه وخت کې د دیموکریټ نظریه د نورو علماوو د منلو وړ ونه گرځیده. په 18 پیړۍ کې د کیمیا پوهانو د دوهم ځل لپاره اټومي تیورۍ د پام وړ وگرځوله .

پوهانو د تعامل کوونکو موادو کنلوي نسبت له یو بل سره د توضیح په اړه په خپلو تجربې څېړنو کې اټومي تیورۍ څخه استفاده وکړه او له دې تیورۍ سره سم کیمیاوی عنصرونه هریو د ټاکلې اټومي کتلې لرونکي دي .

په 1808 م کال کې دالټن (Dalton) انګلیسی کیمیا پوه د اټومي تیورۍ بنسټ کېښود. له دې تیورۍ سره سم ټول مواد له ډیرو کوچنیو ذرو (د اټومونو) څخه جوړ شوي دي ، دا اټومونه نه شي کیدای چې پیدا شي او هم نشي کیدای چه په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. د دالټن د تیورۍ مهم ټکی په لاندې ډول دی :


- 1 - مواد د اټومونو په نوم د ویش د نه وړ ذرو څخه جوړ شوي دي .
- 2 - د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي.
- 3 - اټومونه نه جوړېږي او نه له منځه ځي.
- 4 - د بیلا بیلو عنصر و اټومونه یو له بل سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي .

5 - د بیلا بیلو عنصر و اټومونه د بیلا بیلو کتلو او بیلا بیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي.

6 - د یو ټاکلې مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبتی شمیر او ډولونه یو شان دي.

7 - کیمیاوي تعاملونه د اټومونو ځای پر ځای کیدلو څخه عبارت او د هغوی د اړیکو جوړښت د مالیکولونو په مرکبونو کې دي چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې د عنصرونو اټومونه بدلون نه مومي.

کیمیا پوهانو تر 19 پیړۍ پورې د دالټن اټومي تیورۍ تحلیل کړه. سره له دې چې د دالټن اټومي تیورۍ ځینې ټکي؛ د بیلګې په ډول: د اټوم د ویشلو نه وړتیا او د هغه عنصر اټومونو د یو شان والی بې دلیل ثابت شو او د پوهانو د تائید وړ و نه گرځیده ؛ خو بیا هم د دالټن اټومي تیورۍ د کیمیا په علم کې ګټوره وه او د کیمیا په برخه کې یو مثبت ګام بلل شوی دی .



- 1- ټول مواد له ډیرو کوچنیو ذرو څخه چې اټوم نومېږي، جوړ شوي دي.
- 2- اټومونه کوچني ذري دي چې د کیمیاوي ساده وسایلو په واسطه نه تجزیه کېږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه هریو د کیمیاوي عنصر په نوم یادېږي.
- 3- د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل په حرکت کې دي، د تودوخې په زیاتوالي، د هغوی د حرکت چټکتیا هم زیاتیږي او دا حرکت د هغوی په منځ کې د تعامل لامل ګرځي.
- 4- د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د کتلې، حجم او خواصو له امله یو له بل څخه توپیر لري.

د اټوم اندازه


هغه څیړنې چه په 20 پیړۍ کې د روښتګین د وړانګو پریښست ترسره شوي، لاس ته راغلل چې د اټوم قطر په تقریبي ډول $2 \cdot 10m^{-10}$ دی.

د اټومونو کتله د 10^{-24} - 10^{-22} یا 10^{-25} - $10^{-27} kg$ کمیت ترمنځ شتون لري، څرنگه چې دا کتلوي کمیت ډیر کوچنی دی؛ له دې لامله اټومي نسبتي کتله د اټومونو لپاره وټاکل شوه چې د $1.661 \cdot 10^{-27} kg$ اټومي واحد (amu) قیمت پریښت ټاکل شوی ده.

۲-۱: د اټوم جوړښت

د ټامسن مودل

انګلیسي فزیک پوه ټامسن (J. I. Thomson) د کتود د وړانګو انحراف په برېښنايي مقناطیسي ساحه کې مطالعه کړه، (1-1) شکل د هغې دستگاه جوړښت راښيي کوم چې ټامسن په خپلو څیړنو کې په کار وړی ده:



شکل (1-1) د ټامسن د څیړنو دستگاه

د ټامسن د دستگاه توضیح په لاندې ډول ده

- 1- کتود (د الکترونونو سرچینه)، 2- انود، 3- د کتود د وړانګو لېږدېدل، 4- د برېښنا سرچینه (لوړ ولتاژ) 5- د برېښنايي ساحې سرچینه چې د وړانګو د لېږدېدو لوری ته بدلون ورکوي، یعنې د برېښنايي ساحې شدت دي چې د وړانګو لېږدېدو د کتود (1) لور ته بیرته ګرځوي، 6- هغه مقناطیس ښیي چې د کتود وړانګو د لېږدېدلو ته انحراف (کوږوالی) ورکوي، 7- هغه روښنای لکي چې د پردې پر مخ لیدل کېږي او د کتود د وړانګو د لېږدلو د حرکت بهیر سموي.

تامسن په خپلو څيړنو کې د $(\frac{e}{m})$ نسبت يې محاسبه کړ چې $\frac{Cb}{kg} 1.76 \cdot 10^{11}$ کميت يې پر لاس راوړ ، دلته m کولمب دی چې د چارج د مقدار بين المللي واحد دی .
تامسن همدارنگه پيدا کړه چې په دستگاه کې د گاز د استعمال او هم د الکترونونو (انو د وکتود) ډول نه شي کيدای چې مشخص او معين وي.

پام وکړئ



تامسن دې پايلې ته ورسيد چې دا منفي چارج لرونکي ذرې په ټولو موادو کې ليدل کيږي او دا ذرې يې د الکترونونو (Electrons) په نوم يادې کړي ، دا نوم له الکتريک د کلمې څخه اخيستل شويدي او هغه ذره ته ويل کيږي چې د هغوي د حرکت په پايله کې د بريښنا جريان منځته راځي.

کړنه



1 - هغه وړانگې چې د کتود څخه د تامسن د تجزيي د تخليقي په تيوب کې ځي ، کوم لوړنه کيږي؟

2 - د کتود وړانگې د څه ډول چارج لرونکي دي؟
3 - ولی چارج لرونکي کشف شوی ذرې د تامسن د تجزيي د تخليقي په تيوب کې د تامسن دستگاه د (Mass Spectrometer) د محاسبې وروستي بشپړونې لپاره د هغې لامل وگرځيدلي چې تر څو کتلوي سپکټرو متر ($\frac{e}{m}$) مينځته راشي چې د دې متناسبو ليونونو په واسطه د هغوی يو له بل څخه جلا کړي؟

مهم ټکي

د الکترون د برقي چارج قيمت د امريکايي پوه ميلکان Millikan په واسطه وټاکل شو نوموړي ډاکميټ په (1917-1917) کالونو کې د ټيلوپه شاخو کې کشف کړ چې مساوی په $Cb 1.602 \cdot 10^{-19}$ دي ، ډاکميټ د چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په حيث ومنل شو؛ پر دې بنسټ د الکترون کتله عبارت ده له:

$$1.76 \cdot 10^{11} Cb / kg = \frac{e}{m}$$

$$m = \frac{e}{1.76 \cdot 10^{11} Cb / kg} = \frac{1.602 \cdot 10^{-19} Cb . kg}{1.76 \cdot 10^{11} Cb}$$

$$m = 9.1 \cdot 10^{-31} kg$$

د الکترون کتله مساوي په $9.11 \cdot 10^{-31} kg$ يا $\frac{1}{1840}$ برخه د هايډروجن د يو اټوم د کتلې (پروتون) ده. په 1898 کال کې تامسن د څيړونو په پايله کې داسې نظر ورکړ: اټومونه د يو مثبت چارج



لرونکي هستې څخه جوړ شوي دي چې د هغې په چاپيريال کې الکترونونه د منفي چارج په لرلو سره خپاره شوي دي. د تامسن اټومي موډل ممیز لرونکي کيک ته ورته جوړښت لري، داسې چې ممیز په کيک کې د الکترونونو په شان د اټومونو د هستو په منځ کې بنسټګاري کيږي، ليدل کېږي.


منفي الکترون



(1-2) شکل د تامسن اټومي موډل

د هستې منځته چارج لرونکي ساحه

په 1909م کال کې د رادر فورډ ملګرو کليګر (Geiger) او مرسلین (Mersden) د تامسن پېشنهاد د مطالعې لاندې ونیو او کشف یې کړه چې ذرې د سرورزو له نازکو پاتو څخه تیرېږي؛ خو $\frac{1}{800}$ برخه د هغوي بېرته ګرځي او یا خپرېږي. رادر فورډ په دې هکله کې داسې نظر ورکړی دی: (چې تقریباً د باور وړ نه ده که چیرې مونږ له $4.5m$ فاصله څخه د سګرتو د قطبي پر کاغذي ورځه باندې فیور وکړو، دا مرسي له لګیدو څخه وروسته بېرته وګرځي او پر تاسو ولګېږي). رادر فورډ پیدا کړ چې کټله او مثبت چارج د اټوم د حجم په کوچنۍ برخه کې راټول شوي دي کوم چې د هستې په نوم یادېږي. (لاندې شکل وګورئ):



(1-3) شکل الف: د α د ذرو خپریدل ب: د ګایګر او مرسلین دستگاه

فلزونو د اټوم د هستې په واسطه

د الف شکل توضیح: 1- اټوم، 2- د اټوم هسته، 3- د α ټکر کوونکي ذرې، 4- د α د ذرو خپریدل د ب شکل توضیح: 1- هغه مرکبه چې α ذرو سرچینه وي، 2- د تالک صندوقچه چې د α ذرې ورڅخه تیرېږي، 3- د سرورزو نازکه ورځه، 4- سربې پرده چې α د α د ذرو کشف کوونکي د α د ذرو له نیغ سقوط څخه ساتنه کوي، 5- α د α د ذرو کشف کوونکي د α د ذرو له ټکر کلاو او اوریې اخسته، 6- مایکروسکوپ دی چې وړانګې ښکاره کوي. د α بڅرکي له ټکر څخه وروسته بیا تیر ته راګرځي کوم چې په هستې لګیدلی وي.

د α د پخړکو زیاته برخه د اټومونو د هستو د منځ له فضا څخه تیرېږي. پورتنی شکل د اټوم مودل دی، د اټوم رښتیني بڼه نه ده. که چیرې د اټوم هسته د () په اندازه اوسې د اټوم حجم به د یو درسي کوتي له حجم سره برابر وي. هغه اټوم چې قطر یې $m \cdot 10^{-8}$ وي، هسته به یې $m \cdot 10^{-15}$ قطر ولري. رادفورد په 1911 م کال کې داسې مودل پیشنهاد کړ چې شمسي نظام په یاد راوړي ؛ داسې چې هسته د لمر په شان په مرکز کې شتون او الکترونونه د سیارو په شان د هستې په چاپیریال کې په ټاکلو مدارو کې د ګرځیدلو په حال کې دي.

فکر وکړئ!



1 - په نازکه طلايي پاڼه باندې د ټکرکونکو وړانګو له ټکر وروسته کومه پېښه رامنځته شوه ؟


2 - ولې ځینې بېحرکي بیرته ګرځېدلي دي ؟

3 - ولې د α ځینې بېحرکي کړي شويدي ؟

اتومي نمبر

په 1913 کال کې انګلیسی فزیک پوه د موزلی (Moseley) په نوم د روښنګین وړانګو چې د بیلابیلو فازونو څخه په کټوډي تیوب کې خپرېږي، مطالعه کړې، نوموړې د روښنګین د وړانګو د څپو د اوږدوالی د جذر مربعي معکوس کمیت پورې ($\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$) مربوط ګراف یې د عنصرونو د ترتیبي نمبر په پړوډیک سیستم کې رسم کړ، لاندې شکل وګورئ. نوموړی ګراف ښکاره کوي چې د عنصرونو اټومي نمبر د عنصرونو له مهمو ځانګړتیاوو څخه کوم یو منعکس کوي.

موزلی داسې نظر ورکړ: دا ځانګړتیا د اټوم د هستې مثبت چارج له ځانه ښیي او هم دا ذرې له یو عنصر څخه تر بل راتلونکي عنصر پورې د یو واحد په اندازه په متناوب شکل زیاتېږي.



(1- 4) شکل پر اټومي نمبر پورې تړلی ګراف او د هغو د څپو د اوږدوالي د مربع جذر معکوس

د عنصرونو ځای په پړوډیک سیستم کې (افقي محور) د هغو په هسته کې د پروتونونو شمیر ټاکي، موزلی د عنصرونو ترتیبي نمبر په پړوډیک سیستم کې د اټومي نمبر په نوم یاد کړ او (Z) په سمبول یې وښود. بالاخره پوه شو چې په اټوم کې د عنصرونو ترتیبي نمبر د عنصرونو د پروتونونو له شمیر سره سمون لري.



نیوترون

د موزلی د اظهاراتوله مخې د عنصرونو اټومي نمبر ، د هغوی له هستې د چارج سره مساوي دي او په هسته کې د پروتونو شمیر ښکاره کوي. (پرتون لاینې کلمه ده ، د لومړنۍ معنی او یا د ټولو څخه د پخوانۍ معنا ورکوي)

ډیروټونونو شمیر د هغو د الکترونونو له شمیر سره مساوي دي .

اټومي کتله د اټوم د هستې د پروتونونو د مجموعې کتلې په نسبت لویه ده، د دې توپیر د توضیح لپاره رادرفورډ وړاندوینه وکړه چې د اټوم په هسته کې ختیځې ذرې هم شتون لري چې د هغوی د هر یوې کتله د یو پروتون کتلې سره سمون لري خو د چارج له امله ختیځې دي ؛ له دې کبله نیوترون (neutron) د (ختیځې) په نوم یاد شوی دی . چادویک (chadwick) په 1932 م کال کې د هستوي تعاملونو په پایله کې نیوترون کشف کړ؛ نوموړي د بیرلیم هسته د α ذرې په واسطه بمباردمان کړه چې په پایله کې یې نیوترون پر لاس راوړ، د تعامل معادله یې په لاندې ډول ده:



په دې معادله کې ${}^1_0\text{n}$ د نیوترون سمبول، ${}^9_4\text{Be}$ ، ${}^4_2\text{He}$ او ${}^{12}_6\text{C}$ په ترتیب سره د بیرلیم، هیلیم او کاربن د عنصرونو هستې راښيي .

د اټوم اساسي ذرې

د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته نوکلېون (Nucleon) ویلي او د کتلې د نمبر په نوم هم یادېږي

$$\sum P + \sum n = Nucleon$$

لاندې جدول د اټوم د بنسټیزو ذرو ځینې فزیکي خصوصیات راښيي .

(1-1) جدول د اټوم د بنسټیزو ذرو فزیکي خصوصیات

ذره	چارج په کولمب	نسبتی چارج	کتله په کیلو گرام	نسبتی کتله
پروتون	$1.902 \cdot 10^{-19}$	+1	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	1.0073
نیوترون		0	$1.657 \cdot 10^{-27}$	1.0087
الکترون	$-1.902 \cdot 10^{-19}$	-1	$9.1 \cdot 10^{-31}$	$5.4858 \cdot 10^{-4}$

نوکلیدونه او ایزوټوپونه

نوکلیدونه د اټومونو هستې افاده کوي ، د هغې په واسطه د اټوم هسته ښودل کېږي د عنصرونو نوکلیدونه داسې ښودل کېږي چې نوکلېون یې د سمبول په کینه او پورتنۍ خواکې او اټومي نمبر (پروټونونو شمیر) یې د سمبول په کینه او لاندینۍ خواکې لیکل کېږي؛ د بیلگې په ډول:



ایزوتوپونه (Isotops)

د عین عنصر له نیکلویدونو څخه عبارت دی چې د پروتونونو شمیر یې یوشان وي؛ خو د هغوی د نوکلونونو شمیر یو له بل څخه توپیر لري، یعنې د دوی د نوکلیدونو او نیوترونونو شمیر یو له بل څخه توپیر لري.

څرنګه چې د عنصرونو کیمیاوي خواص د عنصرونو د اټومونو د هستې پرمخت چارج او د هغوی پراکټروني جوړښت پورې اړه لري، نو له دې امله د عنصرونو د ایزوتوپونو کیمیاوي خواص یو شان دي؛ د بیلګې په ډول: د کلورین عنصر ایزوتوپونه عبارت له $^{35}_{17}\text{Cl}$ او $^{37}_{17}\text{Cl}$ څخه دي چې د هغوی اټومي نمبر 17 او د هغه نوکلیدونو په ترتیب سره 35 او 37 او نیوترونونه یې په ترتیب سره 18 او 20 دي، د کلورین د دواړو اټومونو کیمیاوي تعاملونه یو شان دي.


ګڼه :

$^{20}_{10}\text{Ne}$ او $^{21}_{10}\text{Ne}$ نوکلیدونو ته پام وکړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب وراندې کړئ:

- الف - د نوموړو نوکلیدونو د نیوترونونو شمیر څومره دی؟
- ب - دا نوکلیدونه یو بل په نسبت په کوم نوم یادېږي؟

۳- ۱: اټومي طیف

د اټومي سپکټر ځانګړتیا او بېلابېلت د پوښتنې حل کړي چې د رادرفورډ د اټومي موډل په مرسته یې حل امکان نه درلود. که چېرې د لمر او یا د برېښنايي خراغ رڼا د یو سوري څخه تیره او په یو منشور باندې ولګېږي او له منشور څخه تیارې پردې ته تیرې شي، په دې صورت کې سره زرخونه (رڼګین کمان) ساحه ښکاره کېږي چه له جلا رنګه لیکو څخه جوړه شوي ده، د دې رنګونو توپلګي دلیل وړ وړانګې له ټولو څیزو لیکو سره سمون لري چې د پرله پسې (مسلسل) سپکټر په نوم یادېږي.



1- 5) شکل اټومي سپکټر

که چېرې د برېښنا منبع له خالي توب څخه سرچینه واخلي چې د څو عنصری ګازونو لرونکی وي، په دې صورت کې هغه سپکټر تولیدوي چې د جلا بیلابیلو رنګه خطونو لرونکی وي چې دا ډول سپکټرونه د وتونکي اټومي سپکټر (Emission) یاد خطي سپکټر په نوم یادوي، (1- 6) شکل، که چېرې کیمیاوي مواد د کومې وسیلې په واسطه تحرک شي، د هغوی خطي سپکټر په منشور کې



لیدل کیری؛ د بیلگې په ډول: مواد کیدای شي چې د تخلیه تیرونو د برېښنا د بهیر او یا د تودوخې وړانگو په واسطه تحریک شي، خطي اټومي سپیکترونه د لیدلو وړ په ساحه او دماورای بنفش سپیکترونو په ساحه کې لیدل کیږي، نو کله چې د خراغ په شعله باندې د سوډیم فلز او یا د هغه مرکبونه ورزیات شي په هغه صورت کې رڼا په څپیز خطونو 590nm وړانگې لگېږي او شعله یي زېر رنګه ده. که چیرې په تخلیه شوی تیوب کې د هایدروجن گاز واچول شي او د برېښنا ولتاژ په واسطه تحریک شي، په دې صورت کې به سور رنګ ګلابي ته ورته دي، په هغه کې ولیدل شي. جنبي سپیکتر له موادو څخه د سپینې رڼا د تیریدلو څخه لاسته راځي چې د لیدلو په ساحه کې د څپې په ټول اوږدوالي کې شامل دي، هغه رڼا چې د اوږدوالي ټاکلې څپې لري، د موادو په واسطه جذب کیږي چې په دې ساحه کې تور خطونه لیدل کیږي، د جنبي او وټونکو سپیکتر د مطالعې په خاطر، د سپیکرومتر (Spectro meter) په نوم اله په کار وړل کیږي.

د سپیکرومتر لیدنې او څیړنې ښيي چې د هایدروجن سپیکتر Emission د څو ګروپو له مسلسلو خطونو څخه جوړیږي د خطونو دا سلسله د هغوي کشف کونکو په نوم نومول شويدي؛ د بیلګې په ډول: د بالمر (Balmer) سلسله د یو عالم په واسطه چې بالمر (Balmer) نومیده کشف شوه چې د سپیکتر د لیدلو په ساحه کې لیدل کیږي. په هریو سلسله کې د حرکت په پایله کې د سپیکتر د لوړې فریکونسي په لور د موادو د مجاورو خطونو فاصله په کلې ډول کموالې پیدا کوي چې بالاخره یو له بل سره یو ځای شوي دي او مسلسل سپیکتر (Continuum) تولید کوي دی، د خطي سپیکتر فریکونسي Redberg د معادلې په واسطه چې یو عالم دي، توضیح کیږي:

$$\gamma = CR_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

په پورتنۍ معادله γ فریکونسي، C د رڼا چټکتیا، R_H ثابت ریډبرګ، n_1 او n_2 نام کوونکي عددونه ښيي:



(1 - 6) الف. شکل د هایدروجن د

اټوم سپیکتر، ب- د هایدروجن په اټومي سپیکتر کې د بالمر سلسله

Balmer - Pfund Brackett - Paschen - Laeman سلسله

د برکیت سلسله د پفونډ او پویشن د سلسلې په واسطه پوښول شويده $\gamma_n = C$ معادله د څپې د اوږدوالی او فریکونسي په منځ کې اړیکه توضیح کوي.

د هایدروجن د گاز د مالیکول د بمباردمانولو په پایله کې چې له کتود خضه د وتل شوو الکترونونو په واسطه ترسره کېږي، په اړونده اتومونو بدلون مومي، ځینې دا اتومونو انرژي جذبوي او تحرېک شوی حالت ځانته غوره کوي او د انرژي لوړو سربو ته انتقالیږي.



(mm)
د ځینې اوردوالي



1-7) شکل دهایدروجن د ائوم سپکتر

پام وکړئ!

1 - که چېرې الکترونونه له $(n = 2, 3, 4)$ قشرونو څخه هسته ته نژدې قشرونو ته انتقال شي، له ائوم څخه زیاته انرژي ازادېږي او د وړانگو خواصو لري چې د ماورای بنفش په ساحه کې لیدل کېږي، دا ګیلېي د لیمن په نوم یادېږي، نوموړی وړانګې د څپو اوږدوالی $12164 - 973$ دی.

2 - که چېرې الکترون له $(n = 3, 4, 5)$ قشرونو څخه دوهم قشر ته انتقال شي، د هغه نورې انرژۍ کمزوري او د لیدود رڼا خواص لري چې د وړانګو دا ګیلېي د (Balmer) په نوم یادوي. د نوموړو وړانګو د څپو اوږدوالی $6563.4 - 410$ په منځ کې دي.

3 - که چېرې الکترونونه $(n = 4, 5, 6)$ له لوړو سربو څخه د انرژۍ درېمي سربې ته انتقال شي، د روښنایي انرژي او د هغه نشر شوي وړانګې یې کمزورې دي او د هغه ځانګړتیاوې د سرو وړانګو تر لاندې نژدې دي. د روښنایي دا سلسلې د (Poshen) په نوم یادېږي او د نشر شوی شعاعو د څپو اوږدوالی یې $17850.4 - 12820$ دی.

4 - بالاخره که چېرې الکترونو انتقال د $(n = 4)$ څخه لوړی د انرژۍ څلورمې سربې ته ترسره شي، د هغه د رڼا د وړانګو نشر شوي انرژۍ ډیر کمزوري ده او د هغه ځانګړتیاوو د سره رنگ له ساحې څخه لاندې لیدل کېږي، دا رڼایي سلسله د Pfond په نوم یادېږي.

د ذکر شوو سلسلو ځانګړتیاوې (1 - 6) شکل کې لیدلې شي.


۴-۱: د بور ائومي تیوري

د ائوم د جوړښت په اړه د بور څیړنې چې د پلانک په کوانتمې تیوري باندې ولاړې دي، په لومړي

سرکي زياتي برباليتوبونونه ورسېدي؛ خو له دوولسو کالو وروسته يې دلېليه ثابتې شوې؛ لکن موزلي (1915-1889) په خپلو تجربونو کې د انوم په جوړښت کې د بور له فرضيې څخه ګټه واخيسته. د بور نظريه د انوم دسپکتر په خپرېدو کې مرسته وکړه.

د پلانک له تيوري سره سم، انرژي کوانتيزېشن Cuentization کېږي. د سپکترونو د ليکود توضيح لپاره د بور (Bohr) په نوم ډنمارکي عالم په 1913 م کال کې اتومي مودل يې پېشنهاد کړ، د بور دا مودل د پلانک کوانتي فرضيې باندې ټينګ وو، د پلانک له تيوري سره سم: هغه ممکنه انرژي چې جذب او يا خپريږي، له ټاکلو قطعو څخه تشکيل شوی ده چې د کوانتوم انرژي په نوم يادېږي او دا کوانتومي انرژي ده. بور داسې نظر ورکړ: د انوم دهمسې په چاپېريال کې د متحرک الکترون انرژي ټاکلې او معينه ده، د الکترونونو لازمه انرژي د ټاکلي حرکت لپاره د انوم په قشر (Orbit) کې د هغه د ټاکلي قشر پر شعاع پورې اړه لري. (کوانتوم لايينه کلمه ده چې معني يې مقدار اويا کميټ دي). هغه الکترونونه چې له همسې څخه په لرې قشرونو کې حرکت کوي، د مغزی الکترونونو په نسبت چې همسې ته نژدې په حرکت دي، زياته انرژي لري، څرنگه چې د الکترونونو انرژي کوانتومي ده، له دې امله د اوريټال شعاع هم کوانتومي ده، د اوريټالونو شعاع کېدای شي يوازې د ټاکلو قيمتونو لرونکې وي.

کله چې الکترونونه د انوم په ټاکلو اوريټالونو کې د همسې په شاوخوا په حرکت بوخت دي، نه لري کوانت انرژي جذب او نه يې ازادوي. که چيرې الکترون له همسې له نژدې قشر څخه د همسې لري قشر ته انتقال شي، کوانت انرژي جذب او برعکس که په ټاکلي مقدار انرژي ازاده کړي، له همسې څخه همسې ته نژدې قشر ته انتقال کېږي؛ خو ډېر ژر ازاده شوی کوانت انرژي بيرته جذب او يا جذب شوي انرژي بيرته ازادوي، د فوتونونو له جذب څخه په کافي اندازه رڼا او له هغې څخه ډېرې زياتې توري ليکې په جذبي سپکتر کې ليدل کېږي:



د کوانتوم له تیوري سره سم د فوتون انرژي عبارت د رڼا نې کوانت له فریکونسي (ν) سره دی او مساوي په $h\nu$ دی؛ یعنې:

$$E = h\nu$$

په پورتنی معادلې کې h د پلانک ثابت ($h = 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ Joule} \cdot \text{sec}$) دی. که چیرې الکترون له هغه اوربیت څخه چې د E_1 انرژي لرونکی دی، هغه اوربیت ته چې د E_2 انرژي لرونکی دی؛ انتقال شي، یوه اندازه انرژي جذب او یا نې ازاد وي نوموړي انرژي عبارت ده له.

$$E_2 - E_1 = h\nu \quad E_1 - E_2 = h\nu$$

د الکترون ممکنه حرکي حالت له هغه حالت څخه عبارت دي چې د زاویوي حرکت د مومنت د اندازې د هغه د دورانې یا زاویوي حرکت له قوانینو سره سم ټاکل شوی وي. د دایروي حرکت مومنت اندازه د هغه حرکت اندازه ده چې د سرعت، کتلې او د دایرې د شعاع د ضرب له حاصل سره مساوی کېږي:

$$P = mvr$$

د الکترون د زاویوي حرکت د اندازې مومنت د صحیح او پوره مضروب $\frac{h}{2\pi}$ سره مساوی دی چې ثابت کمیت بېکاره کوي، په دې ځای کې صحیح او پوره مضروب اصلي کوانتوم نمبر (n) دي چې $1, 2, 3, \dots$ او نور قیمتونه ځانته اختیاري:

$$mvr = \frac{nh}{2\pi} \quad \dots \quad 1$$

د بور د نظریو څخه کولای شو داسې پایله تر لاسه کړو چې الکترون د اټوم د هستې په چاپیریال کې د دوه قوو لاندې حرکت کوي چې عبارت دي له مرکز څخه د فرار قوه او د ذرو په منځ کې الکتروستاتيکې دفعې او یا د جذب قوو ده:

$$2 \quad \frac{mv^2}{r} = F \quad \text{له مرکز څخه د فرار قوه}$$

$$3 \quad F = \frac{ke^2}{r^2} \quad \text{د کولمب د جذب یادځي قوه}$$

څرنگه چې د 2 او 3 معادلو کینی خوا سره مساوي دي، نو نې خوا نې هم سره مساوي کېږي:

$$4 \quad \frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

په پورتنی فارمول کې m کتله او v د الکترون سرعت دي، z د هستې چارج، e د الکترون چارج او r د اټوم شعاع رانېږي.

په لومړۍ معادله کې دوه مجهول کمیته شته دي چې v او r دي، د یو مجهول لومړی درجو



معادلو د حل پرېنستې ، دا مجهول کمیتونه کو لاي شو په لاندي ډول پيدا کړو:

د r قیمت له څلورمې معادلي څخه په لاس راوړو او په لومړۍ معادله کې ېې دهمه پرځای ږدو:

$$r \frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

$$mv^2 = ke^2$$

$$r = \frac{ke^2}{mv^2} \text{-----5}$$

$$mv \left(\frac{ke^2}{mv^2} \right) = \frac{nh}{2\pi}$$

$$vnh = ke^2 \cdot 2\pi \quad \text{یا} \quad V = \frac{ke^2 \cdot 2\pi}{nh} \text{-----6}$$

له شپږمې معادلي څخه د V قیمت په پنځمې معادلې کې معامله کوو چې r لاسته راوړو.

$$r = \frac{ke^2}{m \left(\frac{ke^2}{nh} \right)^2}$$

$$r = \frac{ke^2}{1} = \frac{n^2 h^2}{mk^2 z^2 \cdot 4\pi^2 \cdot e^2 \cdot 4\pi^2}$$

$$r = \frac{n^2 h^2}{mkze^2 4\pi^2} \text{-----7}$$

کړنه



له شپږمې معادلې څخه پر لاس راغلل چې د هایدروجن د اتوم د الکترون چټکتیا ($n=1$) مساوي 2200 km/sec ده او د 7 معادلې پرېنستې محاسبه شوي دي چې د هایدروجن د اتوم شعاع 0.053 nm ($n=1$) ده.

دا عبارت سم دي او یا ناسم؟ په دې اړه فکر وکړئ او پورتنۍ کمیتونه د محاسبې پرېنست پيدا کړئ.

که چیرې د الکترونو حرکتې او پوتنسیالې انرژۍ، له $E = \frac{1}{2} mC^2$ او $E_p = \frac{-ke^2}{r}$ سره جمع کړو، د الکترون مجموعي انرژي پر لاندي ډول په لاس راځي:

$$E = E_o + E_p = \frac{1}{2} mv^2 + \left(-\frac{ke^2}{r} \right)$$

$$E = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{ke^2}{r} \text{-----8}$$



پام وکړئ



که چیري د برق اندازه یو کولمب او د چارجونو د تعیین فاصله $1m$ وي هغوی یو بل په $9 \cdot 10^9$ قوه جذب او یا دفع کوي. نو د K قیمت په لاندې ډول محاسبه کېږي:

$$F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$K = \frac{F \cdot r^2}{q_1 q_2} = \frac{9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot m^2}{CbCb} \quad k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot m^2}{Cb^2}$$

که چیري د دوهمې معادلې دواړه خواوې په $\frac{1}{2}$ کې ضرب کړو، په دې صورت کې حاصلیږي چې:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{kze^2}{r^2}$$

$$\frac{1}{2} \frac{mv^2}{r} = \frac{kze^2}{r^2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} mv^2 = \frac{kze^2}{2r} \text{-----9}$$

اوس د $\frac{1}{2} mv^2$ قیمت په ۸ معادله کې معامله کړو، حاصلیږي چې:

$$E = \frac{kze^2}{2r} - \frac{kze^2}{r}$$

$$E = \frac{kze^2 - 2kze^2}{2r} = \frac{-kze^2}{2r}$$

$$E = -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{kze^2}{r} \right) \text{-----10}$$

د r قیمت له پنځمې معادلې څخه په لسمې معادلې معامله کړو، حاصلیږي چې:

$$E = \frac{-1(-kze^2)}{2} \cdot \frac{mke^2 4\pi}{n^2 h^2}$$

$$E = \frac{-(-k^2 z^2 e^4 \cdot 2\pi^2)}{n^2 h^2} \text{-----11}$$

دلته $n = 1, 2, 3$ دي.




لاندې توضیحاتو ته پام وکړئ.

د بور د لومړۍ قاعدې پر اساس کېدای شي چې د الکترون حرکتې چټکتیا توضیح کړلی شي. په دوهمه قاعده کېدای شي، دا مطلب توضیح شي، چې الکترون پرته له دې چې انرژۍ جذب او یا ازاده کړي، په یو قشر کې د څیږ حرکت په حال کې دی او که الکترون ته انرژۍ ورکړل شي، د هستې د نژدې قشر څخه، د هستې لرې قشر ته انتقالېږي خو که چېرې د الکترون څخه انرژي واخیستل شي، هستې ته نژدې لاندینیو قشرونو ته سقوط کوي، لکن جذب شوي انرژي په 10^{-8} - 10^{-10} ټاټبه کې بیرته ازاد او یا ازاده شوي انرژي بیرته په 10^{-8} - 10^{-10} ټاټبه کې جذب وي او خپل اصلي موقعیت ته بیرته ځي چې الکترونونه په دایروي مدارونو کې د هستې په چاپېرېال کې د حرکت په حال کې دي.

کړنه

لاندې شکل ته څیر شئ، د شکل څخه لاندې جملو کې د نامناسبو کلمو لاندې خط ریاسي او جملي سمې کړئ:



(۱-۹) شکل اتومونه د الکترون اخیستلو او یا ورکولو په بهیر کې

په الف شکل کې الکترون (د انرژي په اخیستلو، انرژي له لاسه ورکولو) کې د انرژي (پورته،

ښکته) سوبو ته انتقال شوې دي.

د ب په شکل کې الکترون د (انرژي په اخیستلو، انرژي له لاسه ورکولو) کې د انرژي (پورته/ ښکته) سوبو ته انتقال شوې دي.

زیاتي معلومات

د بور تیوري ته په ۱۹۱۶ م کال کې د زومیر فیلډ په نوم یو عالم پراختیا ورکړه، نوموړي داسې نظر ورکړ: د کوانتوم هر یو نمبر د کروي اوریټونو انرژي ټاکلې ده او هم کېدای شي چې ځینې بیضوي قشرونه د همدې اصلي کوانتوم نمبرونو په نوم ونومول شي چې دا نمبر کوانتوم د (n) په توري ښودل کېږي او دوهم کوانتوم نمبرونه هم په کې شامل کړل شي چې د قشرونو بیضوي شکل (مختلف المکر) ټاکي او په ۸ ښودل کېږي، د ټولو کوانتوم نمبرونو په اړه به معلومات

وراندې شي.

کړنه:

الف - د انرژي د بدلونو کمیت چې یو الکترون د انرژي له لومړي سوبې څخه د انرژي دوهمې سوبه ته انتقال شي، څومره دی؟

ب- د انرژي د بدلونونو کمیت کله چې یو الکترون د دوهمې سوريې څخه لومړۍ سوريې ته سقوط کوي، څومره به وي؟

پروټیو تیوریو د اټوم د الکتروني جوړښت په اړه اړونده معلومات ورکولی نه شول، نو له دې امله نورې تیوري منځته راغلې چې لاندې مطالعه کېږي:

۱- ۵: اوسنی اټومي تیوري

ممکن خیر انګرنګي وي. چې د بور نظریه له خپلو بریالیتوبونو سره، له نشر څخه لس کاله وروسته رد شوه، سره له دې چې د بور نظريې وکولی شول د یو الکتروني اټومونو سپکتر توضیح کړي؛ خو د څو الکتروني اټومونو د سپکتر په توضیح کولو بریالي نه شو. په ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ کلونو کې په نظري فزیک کې دوه پوښتنې منځته راغلې:

۱- لومړۍ پوښتنه د نور د طبیعت په اړه د دوه بیلابیلو نظرونو پورې اړه لري چې «څپیزه او د نورفوتوني طبیعت نظریه» ده.

۲- دوهمه پوښتنه د رڼا او انرژي د ټاکلې اندازې کوانتومي پدیدې څخه عبارت دي چې باید هغه د یو هیري شوي مسئله په شکل د نیوتن په میخانیک کې ور دننه کړه.

د همدې علت پریښت د میخانیک نوي او معاصره تیوري رامنځته شوه، د دې تیوري سره سم: رڼا څپیز خواص او هم دوه وي خواص لري.


څپیز او ذره وی طبیعت

لومړۍ سوري چې د معاصر څپیز میخانیک په اړه مثبت ګام کېښود، په ۱۹۲۴ م کال کې د دی-بروګلي (De - Broglie) په نوم عالم. په پخوانیو وختونو کې پوهانو نظر درلود چې الکترو مقناطیسی څپې بندې د مطلقو څپو څخه عبارت دي (سره د دې چې انشتاین ویلي دي) «په څپونو تجزیه کې الکترومقناطیسي څپې ذره وي یا فوتونې خاصیت هم له ځان څخه ښيي».

پام وکړئ

څپیزۍ څپې بندې د مایکرو ذرو کېږل او ننوتل دي، د دې دو پیدلو اغیزو له پوهېدلو لپاره لازمه ده چې هرې ذرې ته نسبت ورکول شوی د څپو اوږدوالی زده کړی شي.

(۱- ۱۰) شکل دسیستم تصویر د اهتزاز په حالت کې



د لومړي څپي نیم اوږدوالي

د دوهمي څپي نیم اوږدوالي

د درېيمې څپي نیم اوږدوالي

دی - بروگلی د انشتاین د انرژیکي معادلو په پام کې نیولو سره، د فوتونو د خپو اوږدوالی په لاندې ډول په لاس راوړ:

$$E = h \cdot \nu, \quad \nu = \frac{E}{h}, \quad \lambda \nu = C, \quad \nu = \frac{C}{\lambda}$$

د انشتاین د نسبت د تیوري له کبله کیدای شي چې د رڼا د حرکت مقدار، چټکتیا او انرژي تر منځ اړیکه د لاندې معادلو سره سم محاسبه کړی شي:

$$E = mC^2 \quad \frac{E}{C} = mc$$

خړنگه چې د حرکت د اندازې مومنټ د کتلې او چټکتیا د ضرب حاصل دی؛ یعنې:

$$P = mc$$

د دی کبله چې $P = \frac{E}{C}$ هم ده، کیدای شي ولیکل شي چې:

$$\frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c} = p$$

د یو ذرې د حرکت اندازه چې m کتله یې او چټکتیا یې ν وي؛ نو $p = m\nu$ کیدای شي:

$$\frac{h}{\lambda} = m\nu \quad \lambda = \frac{h}{m\nu}$$

وړوستی معادله د کتلو، خپو د اوږدوالي او چټکتیا په منځ کې اړیکه رابښی، ټولې ذرې د حرکت د اندازو مومنټ لرونکي ($p = m\nu$) دي او د خپو اوږدوالي یې $\lambda = \frac{h}{m\nu}$ فورمول په واسطه محاسبه کیدای شي.

فعالیت

په لاندې جدول کې د ذرو ځینې ځانګړتیاوې لیکل شوي دي، د دی ذرو د خپو اوږدوالي کوم چې ډیورټي فورمول پریښست لاس ته راغلي دي، هم په اړونده ستون کې لیکل شوی دی، تاسې هم د محاسبې په واسطه د هغوی خواږنه لاسته راوړی او د جدول له خواږنو سره یې پرتله کړي.

جدول (1-2) د بنسټيزو ذرو ځانګړتياوې.


د ذري	کبله په ګرام	چټکتيا $\frac{cm}{sec}$	د څښې اوږدوالي	د زده کوونکي پيدا کړي بېلي
الکترون 300k	$9,1 \cdot 10^{-28}$	$1,2 \cdot 10^7$	$61^\circ A$	
الکترون د 1ev	$9,1 \cdot 10^{-28}$	$5,9 \cdot 10^7$	$12^\circ A$	
انرژي الکترون 100ev	$9,1 \cdot 10^{-28}$	$5,9 \cdot 10^7$	$1,2^\circ A$	
انرژي سره د هيليم انوم 300k	$6,6 \cdot 10^{-24}$	$1,4 \cdot 10^5$	$0,1^\circ A$	
د هيليم انوم 300k	$2,2 \cdot 10^{-22}$	$2,4 \cdot 10^4$	$0,12^\circ A$	

په هره اندازه چې د ذرو کبله لويه او چټکتيا يې زياته وي ، په هماغه اندازه د څښې اوږدوالي يې لږه دي ، نو له دې کبله ده چې که چيرې ديو کرسټالي جسم سره د الکترونونو يو گډېلي ټکر وکړي ، کېږي او يا بيرته راګرځي.

پام وړي



د کوچنیو ذرو (فوتونونه، الکترونونه، نیوترونونه ... او نور) اغیزه دوه ګونې طبیعت لري ، په ځینې ازماينښتونو کې يې ذره وي خواص او په ځینو نورو ازماينښتونو کې د هغوی ځینې خواص لیدل کېږي نو کوچنی ذري د څښې او ذره وي (د دواړو) خواص لرونکي دي.



شکل (11 - 1) د الکترون څپه يې طبیعت

فعاليت



د لاندې شکلونو کوم یو د الکترون د پاره خاص مسیر ټاکي او کوم یو يې ځانګړی مسیر نه شي ټاکلی ؟

شکل (12 - 1) د الکترونونو خاص مسیر



خلوړواړه کوانتومي نمبرونه د یوې ریاضیکي پایلې په بڼه ځان ښکاره کوي او د اټومونو وضعیت او الکتروني انرژي ټاکي، داکوانتومي نمبرونه د بور د نظریې پرنسپټ ډیمګرټیاوې لرونکي دي، د نیمګرټیاوې په لرلو سره هم په اټوم کې د هستې په چاپېریال کې د الکترونونو د څرنګوالی او ځای نیولو په توضیح کې کومک کولای شي:

۱- اصلي کوانتوم نمبر (The Principal Quantum Number)

اصلي کوانتوم نمبر د الکتروني ورځني جسامت، د اټوم شعاع او دالکترونونو انرژي یعنې د الکترونونو انرژیکي سطحه د هستې له کبله ټاکي چې تام طبیعي ټاکلې عددی قیمتونه $(n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots)$ ځانته غوره کولای شي او د (n) په توری ښودل کېږي، هر څومره چې n قیمت کوچنی وي، په هماغه اندازه الکترون ډېره کمه انرژي لري او هستې ته نژدې وي، اصلي کوانتوم نمبر له نورو کوانتوم نمبرونو څخه مهم دي؛ ځکه د هایدروجن د اټوم د الکترون انرژي کمیت او د نور اټومونو د الکترون انرژي کمیت افاده کوي او د لاندې فورمول په واسطه محاسبه کیدای شي چې په هغه کې n هم شامل دي:

$$E = \frac{-2\pi^2 me^2 z^2}{n^2 h^2}$$

په دې فورمول کې m د الکترون کتله او e د الکترون چارج افاده کوي او دا فورمول د شروډینګر د معادلې د حل څخه حاصل شوی دي.

۲- فرعي کوانتوم نمبر یا زاویوي حرکت:

د بور د نظریې سره سم یو اصلي مدار یا الکتروني قشر عبارت د الکترون د ګرځیدلو حالت د هستې په چاپېریال کې په دایروي دورو کې دی او عمومي حالت یې د بیضوي څخه عبارت دي چې هسته د بیضوي په یوه محراق کې ځای لري. په یو بیضوي شکل ګڼه مدار کې، د الکترون چټکتیا ثابتې او ټاکلې نه ده، د هغه حرکتی انرژي بدلون مومي او د انرژي بدلونونو یې کوانتومي دی، پر دې بنسټ د الکترونونو لپاره یوازې ځینې ځانګړو بیضوي مدارونه مجاز دي، په دې ترتیب دویمي کوانتوم نمبر د زاویوي حرکت اندازه او یا زاویوي حرکت د اندازې مومنټ افاده کوي چې د ℓ په واسطه ښودل کېږي او د مدارو د بیضوي والي ضریب ټاکي. څرنګه چې الکترون دوراني حرکت هم لري؛ له دې کبله حرکتی انرژي هم لري چې د دوراني حرکت څخه لاس ته راځي؛ نو د حرکت د مقدار مومنټ $(p = mv)$ ټاکلې اندازه لري او د الکترون د انرژي د مجموعې سره مساوي دي؛ پر دې بنسټ د تعجب وړ به نه وي که چېرې د الکترون د زاویوي حرکت د مومنټ اندازې نظریه د ℓ د اوریټالو د حرکتو د اندازو مومنټ د n د اندازیو له لورې منحصر شي. نظري او تجربی تیوري ښکاره کوي چې ℓ کولای شي د نامو عددونو ټول قیمتونه د صفر او $1 - n$ ترمنځ

تام قیمتونه د صفر او $n-1$ په شمول ځانته غوره کړي:

$$\ell = 0 \text{-----} n-1$$

که $n=1$ وي، l یو قیمت ځانته غوره کوي چې هغه صفر دي. همدا رنگه که چېرې $n=2$ ، $l=0,1,2,3,4$ هم دوه قیمتونه لری چې 0 او 1 دي... او که $n=5$ وږو، 1 هم پنځه قیمتونه لري چې


۳- مقناطیسي کوانتوم نمبر

زاویوي حرکت یا د یو الکترون د دوراني حرکت د اندازې مومنټ په هر اټوم کې کېدای شي چې دایروي سیستم د برېښنا بهیر سره چې په هغه کې بهیر لري، تشبه شي. څرنگه چې د برېښنا بهیر په دننه دورې کې منځ ته راځي او مقناطیسي ساحه په دورې کې جوړوي؛ د دې کبله ویل شو چې د الکترون تحرېکېدل په یو دایروي مدار کې مقناطیسي ساحه هم تولیدولای شي چې مقناطیسي کوانتوم نمبر m_l یې ټاکي، د بل پلوه د زاویوي حرکت د مومنټ د اندازې څخه m_l حاصلېږي، نو د هغه اندازه د اوریټالي کوانتوم نمبر قیمت سره اړیکه لري. تیوري او عمل توضیح کوي چې m_l کولای شي ټول تام عددي قیمتونه د صفر او $+1$ او صفر، -1 تر منځ د صفر، $+1$ او -1 په شمول ځانته غوره کولای شي او د m_l قیمتونو تعداد عبارت د $m_l = 2l + 1$ دي، چې د m_l د قیمتونو د اندازه د اوریټالونو تعداد په فرعي سمبو کې هم ټاکي.

$$m_l = +l \text{-----} 0 \text{-----} -l$$

۴- دسپین کوانتوم نمبر

الکترون د خپل دوراني حرکت په بهیر کې د مقناطیسي ساحې له جوړولو څخه پرته کو چني مقناطیس په شان هم عمل کوي؛ نو ځکه ویلي شو چې الکترون د $Spin$ حرکت لري، د $Spin$ کلمه د تاویلدو په معنی ده، دا مقدار بنسټیزو ذرو لپاره پوره، ټاکلې او مشخصه ده، الکترون، پروتون او نیوترون دسپین قیمت $\pm \frac{1}{2}$ دی.



(13-1) شکل د الکترونو د سپین

پام وکړي

څرنگه چې د l قیمت د m_l په واسطه ټاکل کېږي؛ په دې اساس د m_l او n په منځ کې ځانګړې اړیکې باید شتون ولري؛ د بیلګې په ډول: په ثابت اویستیز حالت کې؛ یعنې: $n=1$ ، $m_l=0$ ، $l=0$ ، چې یو قیمت ځانته اخیستل شوي، همدا رنگه د l قیمتونه د m_l قیمتونو ټاکونکي دي چې مخکې ترې یا دونې شویدي، د $l+1 = m_l = 2$ دي، یعنې:

$$m\ell = 2l + 1$$

$$\ell = 0$$

$$m\ell = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$m\ell = +l \text{-----} 0 \text{-----} -l$$

$$m\ell = +0 \text{----} 0 \text{-----} -0$$

$$m\ell = 0$$

همدارنگه و $n, \ell, m\ell$ له هر قيمت سره د *Spin* قيمت عبارت له $+\frac{1}{2}$ او $-\frac{1}{2}$ دی.

$$S = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

که چیرې $\ell = 1$ وي $m\ell$ درې قيمتونو لرونکی دي چې هغه عبارت له $1, 0, -1$ دي.

$$\ell = 1$$

$$m\ell = 2\ell + 1$$

$$m\ell = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$m\ell = +1 \text{-----} 0 \text{-----} -1$$

$$m\ell = +1, 0, -1$$

$$m\ell = +1 \text{-----} 0 \text{-----} -1$$

ستاسې د زیاتې زده کړې لپاره




Orbital لاتیني کلمه ده او د خالی په معنی ده، په دې ځای کې هم په همدې مفهوم په کارورل شویده او د انوم د هستې له چاپیریال له هغې برخې څخه عبارت ده ، کوم چې په هغو کې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وي ، د دې احتمال هم شته دي چې الکترون د وخت په پوره شپږه کې د هستې د فضايي ساحې له حدودو څخه د باندې ځای ولري چې 5% یې احتوا کوي.

اصلي او فرعي قشرونه

د هر اصلي کوانتم نمبر سره یوه اصلي انرژیکي سويه سمون لری چې دا سويه د انګرېزي ژبې د الفبا په لویو تورو ښودل کیږي؛ لکه:

n =	1	2	3	4	5	6	7
	K	L	M	N	O	P	Q



ګڼه



د بور د موډل په نظر کې نیولو سره
سلسله رسم او توضیح کړئ.

له هر فرعي کوانتم نمبر سره د ټاکلي فرعي انرژي کې سیمه سمون لري چې دا فرعي سیمه د انګریز ژبې د الفبا په کوچنۍ تورو ښودل کېږي؛ لکه:

نمبر	فرعي کوانتم نمبر	فرعي سیمه
...	4	g
...	3	f
...	2	d
...	1	p
...	0	s

د هرې فرعي سیمې د اوربیتالونو شمېر د ml له اړوند قیمتونو سره سمون لري او په اعظمي توګه په هر اوربیتال کې یوازې دوه الکترونونه ځای لري چې د هغوی د سپین لوري سره مخالف دي.

که چېرې د الکترونونو تاویدل د خپل محور په چاپیریال کې د ساعت له عقربې سره سمون ولري، د هغه د سپین قیمت $\frac{1}{2}$ دی او که د ساعت د عقربې په مخالف لور کې تاو شوی وي، نو د هغه د سپین قیمت $-\frac{1}{2}$ دی.

اوربیتالونه پر صندوقچو $\square$ باندې ښودل کېږي. د اوربیتالونو شمېر په هره اصلي انرژيکې سیمه کې له n^2 سره سمون لري او د الکترونونو اعظمي شمېر په هره اصلي انرژيکې سیمه کې له $2n^2$ سره سمون لري.

ګڼه



د لاندې جدول تش ځایونه پوره او سم کړئ.

د الکترونو مجموعي تعداد	$2n^2$	اصلي کوانتم نمبر (n)	اصلي قشر
2	$2(1)^2$	$n=1$	K
.....		$n=2$	L
.....		$n=3$	M
.....		$n=4$	N
.....		$n=5$	O

د الکترونونو د انرژي حالت د اعدادو او تورو په واسطه ښودل کېږي، داسې چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر د عدد په واسطه او دا عددونه د هغې توري کینې خواته لیکل کېږي کوم چې د انرژي فرعي سیمې رانښتي او له یو ټاکلي فرعي کوانتم نمبر سره سمون لري؛ د بیلګې په ډول: $3p$ ښکاره کوي چې الکترونونه په دریمه اصلي سیمه کې د p په حالت کې دي او د الکتروني

ورينجي شکل نبي دمبل په شان دي . د s د اوربیتال د الکتروني ورينجي شکل کروي دی ، د d او f د اوربیتالونو د الکترونو ورينجو شکل پېچلي دي د سل پلني او يا مرسل د گلونو د پلنو په شان يو د بل له پاسه شتون لري.

لاندي جدول د خلور گوني کوانتوم نمبرونو ترتيب او د هغه اوربیتالونه ښيي .
 (3 - 1) جدول د خلورگونو کوانتوم نمبرونو ترتيب او د هغوی اوربیتالونه:

$n+l$	د الکترونو شمېر	د اوربیتالونو شمېر	انريژيکي حالت	خلورگوني کوانتوم نمبرونه	
				s	ml
1	2	1	s	$+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$	0
2	6	1	s	$+$	0
3	2	3	p	$+$	0 - 1
4	6	1	s	$+$	0
5	10	3	p	$+$	0 - 1
6	14	5	d	$+$	0 - 1, 0, -1, -2
7	18	7	f	$+$	0 - 1, 0, -1, -2, -3


گونه:

که $5 = n$ وي د s, ml, l اړونده قيمتونه، انريژيکي حالت، د اوربیتالونو تعداد، د الکترونونو تعداد د O د قشر $n+l$ پيدا او په يو جدول کې يې ترتيب کړئ.


۶-۱. د څو الکتروني اتومونو الکتروني جوړښت

د الکترونونو په واسطه د انريژيکي سمون د اوربیتالونو وکيدل
 الکترونونه په لومړي سر کې د انريژيکي سمون هغه اوربیتالونه نيسي کوم چې د انريژيکي په پټه سطحه کې ځای ولري . په دې هکله ډيرې قاعدې اوکړنې شته دي چې دا قاعدې او دهغوی اړوند گرافونه په لاندي ډول توضيح کيږي:






(1 - 7) شکل د اوربیتالونو د انرژی سیمې گراف
د لاندې سلسلې په بنسټ هم کولای شو د انرژی سیمو په اوربیتالونو کې د الکترونونو ویشل
عملی کړو:



د هوڼه قاعده (Hund Rule)

الکترونونه د عین فرعي سمبولو اوربیتالونه داسې اشغالوي چې د هغو د *Spin* عددې قیمتونو مجموعه لوړه وي ، یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سمبولې اوربیتالونه لومړی په طاقه شکل او هم جهته *Spin* سره ټکوي خو که چیرې زیاتې الکترونونه شتون ولري، د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف الجهته *Spin* سره پیل کېږي ؛ د بیلګې په ډول: په نایترجن او اکسیجن کې دا مطلب توضیح کېږي:



ګڼه

د لاندې عنصرونو الکتروني جوړښت د هغه د اوربیتالونو سره ولیکئ او د هغوی د سپین مجموعه را پیل کړئ.



د کلېچوفسکي قاعده (Klechkowsky's Rule)

د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سمبول وکېدل داسې عملي کېږي چې له مخکینو فرعي سمبولو اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه نه دی ټوک شوي ، خو الکترونونو د راتلونکو انرژیکي سمبولو اوربیتالونه نیولې دی، د بیلګې په ډول: د $4s$ اوربیتال هغه وخت د الکترونونو په واسطه وکېږي چې لاروسه پورې $3d$ اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه نه دي اشغال شوي. په همدې ترتیب $5s$ مخکې له $4d$ او $4f$ څخه او هم $6s$ مخکې د $4f$ او $5d$ الکترونونو په واسطه وکېږي ، په دې اړه کلېچوفسکي یوه قاعده وضع کړه چې په لاندې ډول ده :

الکترونونه لومړی د هغوی انرژیکي سمبول اوربیتالونو کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي کوانتم (n) او فرعي کوانتم نمبر (l) ($n + l$) قیمتونو مجموعه یې کوچنی وي ، که چیرې د دوو یا څو سمبولو ($n + l$) سره مساوي وي؛ په دې صورت کې الکترونونه لومړی د انرژیکي سمبول هغه اوربیتالونه ټوک وي چې د هغه د n عددی قیمت کوچنی وي ، یعنې $1 - n \leq l$ رعایت کېږي دا لاندې سلسله وګورئ:

1s	2s	2p	3s	3p	4s	3d	4p	5s	4d	5p	6s	4f	5d	6p	انرژیکي سوبه
1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	n+1

لوهری فعالیت

د لاندې عنصرونو د اټومونو الکتروني او اوربتيالي جوړښت د کلاچکونفسکي د قاعدې پرنسټي وليکئ او ترتيب يې کړئ:

${}_{90}Th$, ${}_3Li$, ${}_4Be$, ${}_5B$, ${}_{15}P$

دوهم فعالیت :

د لاندې جدول تش خاړونه په مناسبو عددونو ډک کړئ:

عنصر	د الکترونو شمير	الکتروني جوړښت		
		لوهری سويه	دويمه سويه	درېمه سويه
H		1		
He	2	2		
Li		2	1	
C	6	2	2	
Ne	10		8	
Mg	12	2	8	2
S	16	2	8	
Ar	18	2		8



د لومړۍ څپرکي لنډيز

- د ډيموکرآت په نوم يوه پوه په 400 ق، م کال داسې نظر ورکړ: مواد کيډاي شي چې په داسې کوچنيو ذرو ووېشل شي کوم چې نور د هغوی دوشلو امکان نه وي، نوموړی دا ذره د اټوم په نوم ياد کړه. اټوم يوناني کلمه ده چې د *tom* (ويشل) او *A* (نږې) څخه اخيستل شوي ده.
 - دالتن په 1808 م کال د اټومي تيورۍ بنسټ کيښود، د دې تيورۍ سره سم مواد د اټومونو په نوم له کوچنيو ذرو څخه جوړ شوي دي.
 - نوي اټومي تيوري وړاندي کوي دا چې!
اټومونه کوچني ذري دي چې د کيميا په ساده وسايلو نه تجزيه کيږي او د اټومونو مجموعه چې عين چارج ولري، د کيمياوي عنصر په نوم ياديږي.
 - اټومونه تل د حرکت په حال کې دي، د تودوخې په زياتوالي د هغوی د حرکت چټکتيا زياتيږي او دا حرکت يو د بل سره د هغوی د تعامل سبب گرځي.
 - د بيلابيلو عضرونو اټومونه د کتلې، حجم او خواصو له لحاظ يو له بل څخه توپير لري
 - د عنصرونو اټومونه د دوو برخو څخه جوړ شويدي، چې د هستې او الکتروني قشر څخه عبارت دي. نامسن د تجربونو پر بنسټ په اټوم کې الکترونونه کشف کړل.
 - رادرفورډ د څيړنو پر بنسټ د اټوم د هستې کتله او چارج نږې محاسبه کړ او پيلدا يې کړل چې د اټوم په هسته کې مثبت چارج لرونکي ذري شته دي، نوموړی دا ذري د پرترونو په نوم ياد کړي.
 - جادويک د اټوم په هسته کې نيوترونه کشف کړل، نوموړي له لاندي هستوي معادلې سره برابر، نيوترونونه پر لاس راوړل.
- د پرتونونو او نيوترونونو مجموعه د نوکليون په نوم ياديږي.
- د الکترونونو چټکتيا کيډاي شي د $\frac{m h k z e^2 \pi}{r}$ فورمول پر لاس راځي
- د الکترون د څپې اوږدوالی د دې -بروگلي د فورمول پر بنسټ په لاندي ډول پر لاس راوړي:

$$\lambda = \frac{h}{m v}$$



- د الکترونونو څرنگوالی او حالت کېدای شي چې د څلور کوانتومي نمبرونو په واسطه مشخص شي

1 - اصلی کوانتوم نمبر: دا کوانتوم نمبر د الکترونو ریځي جسامت، د اټوم شعاع او د الکترونونو انرژیکي سرونه د هستې په پرتله په بېلابېلو قشرونو کې رانښتي.

2 - فرعي کوانتوم نمبر: دا نمبر د الکترونونو وضعیت د اټوم د هستې په چاپېریال کې په کوارډیناتونو کې ټاکي او د نامو عددونو ټاکلی او پوره قیمتونه د صفر او $l - n$ ترمنځ $(l = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ ځانته غوره کوي.

3 - مقناطیسي کوانتوم نمبر: دا کوانتوم نمبر د الکترونونو وضعیت او مقناطیسي خاصیت د اټوم د هستې په چاپېریال کې ښکاره کوي او د قیمتونو شمېرکي $ml = 1, 2, \dots, l$ دی او د قیمتونه له نامو عددونو څخه عبارت دي چې $l = 0, 1, 2, \dots, -l, -l-1, \dots, -l-ml$ اخيستلي شي.

د الکترونونو تحریک په دایروي مدارونو کې مقناطیسي ساحه تولیدوي چې هغه مقناطیسي کوانتوم نمبر ټاکي.

4 - د سپین کوانتوم نمبر: سپین (*spin*) لاتیني کلمه ده چې د تاویدو په معنی ده، په دې ځای کې هم په همدې مفهوم په کارول شوي ده او د الکترونونو تاویدل د خپل محور په شاوخوا باندې چې د سپین کوانتوم نمبر په نوم یاد شوي او د میکرو ذرو قیمتونه $ms = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ ځانته ټاکلی شي.

- اوبیتال (*Orbital*): لاتیني کلمه ده او دځالی په معنی ده، چې په دې ځای کې هم په همدې مفهوم په کارول شوي ده چې اټوم د چاپېریال له هغې برخې څخه عبارت دی کوم چې د الکترون احتمالي شتون په کې 95% دي.

- د پاوټی قاعده: په یوه اټوم کې دوه الکترونونه نه شي کولای چې د یو شان څلور کوانتوم نمبرونو لرونکي وي.

- د هونډ قاعده: فرعي عین انرژیکي سرونو اوریټالونه د الکترونونو په واسطه داسې ډکېږي چې د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه یي اعظمی وي.

د کلیچکوفسکي قاعده: الکترونونه لومړی د هغې انرژیکي سرونو اوریټالونو کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي کوانتوم نمبرونو (n) او د فرعي کوانتوم نمبر (l) د هغه د عددی قیمتونو مجموعه $(n + l)$ یې کوچنی وي، که چېرې د دوی یا څو سرونو $(n + l)$ سره مساوي وي، په دې صورت کې د هغو سرونو اوریټالونه د الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د "قیمت یې کوچنی وي".



پوښتني: څلور ځوابه پوښتني:

- 1 - د یوې مادې کوچنۍ ذره د لومړۍ ځل لپاره کوم عالم د انوم په نوم یاده کړه؟
الف - دالټن ب - دیموکرات ج - ارسطو د - رادرفورډ
- 2 - د انوم کلمه له لاندې کومو کلمو څخه اخیستل شوېده؟
الف - tom (تقسیم) ب - A (نه) ج - الف او ب دواړه سم دي د - هیڅ یو
- 3 - د انومی تیوري بنسټ ایښودونکي له لاندې علماو څخه کوم یو دی.
الف - ارسطو ب - دیموکرات ج - رادرفورډ د - تامسن
- 4 - د انوم د هستې د ځانګړتیاوو کشف کونکي له لاندې علماو څخه کوم یو دی؟
الف - موزلی ب - چادویک ج - رادرفورډ د - سودي
- 5 - د کومو فورمولونو پر بنسټ کېدای شي چې د الکترون چټکتیا د انوم د هستې په چاپیریال باندې محاسبه شي.
الف - $\frac{h}{mv}$ ب - $\frac{h}{m\lambda}$ ج - $\frac{h}{m\lambda^2}$ د - هیڅ یو
- 6 - که چېرې $n=3$ وي، د l قیمتونه عبارت دي له:
الف - درې قیمتونه، ب - دوه قیمتونه، ج - یو قیمت، د - ټول ناسم دي.
- 7 - هغه عنصر چې د 26 انومی نمبر لرونکی دی د سپین د کومو عددي قیمتونو د مجموعو لرونکی دی.
الف - $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ب - $2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ج - 3 د - 1
- 8 - که $l=3$ وي، د ml قیمتونه عبارت دي له:
الف - درې قیمتونه، ب - دوه قیمتونه، ج - اوه قیمتونه، د - د ml قیمت په l اړه نه لري.
- 9 - د الکترون د څپې اوږدوالی د کومو لاندې فارمولونو په واسطه لاس ته راځي؟
الف - $\lambda = \frac{h}{mv}$ ب - $\lambda = \frac{h}{m\lambda}$ ج - $\lambda = \frac{h}{m\lambda^2}$ د - ټول
- 10 - پروتون د انوم کوم ډول ذره ده؟
الف - منفي ذره ب - مثبت ذره ج - خنثي ذره د - مثبته او منفي چارج لرونکي ذره

سمې او ناسمې پوښتني: لاندې سمې جملې په (س) او نا سمې جملې په (نا) نښانې کړئ

- 1 - مواد د انوم په نوم له ډیرو کورنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. ()



2 - تلمسن په خپلو څيړنو کې د موادو د چارج نسبت پر کتلې ($\frac{e}{m}$) پيدا کړ چې $1.76Cb/kg$ کميت يې په لاس راوړ.

3 - چادويک Chadwick په 1932 کال د هستوي تعاملونو په پايله کې پروتون کشف کړ
4 - په يو اټوم کې دوه الکترونونه کولای شي چې يو شان څلور کوانتوم نمبرونه ولري
5 - د کوانتوم له تيوري سره سم د فوټون انرژي عبارت د نور د کوانټ انرژي د h د فريکونسي لړسره ده چې $E = h\nu$ کېږي .

6 - د پلانک له تيوري سره سم انرژي کوانټايزيشن (quantization) کېږي.

7 - د بيلا بيلو عنصرونو اټومونه د کتلې، حجم او خواصو پر لحاظ يو له بل څخه توپير نه لري.

8 - د اټوم د شاوخوا فضا هغه برخه چې په هغې کې د الکترون د شتون احتمال 95% وي، د اوربیتال په نوم يادېږي.

9 - اصلي کوانتوم نمبر د اټوم د هستې په شاوخوا د الکترونونو د وضعيت په کوارډيناتونو کې ټاکي.


تشریحي سوالونه :

- 1 - ثبوت کړئ چې $\frac{h}{m\nu} = \lambda$ دي.
- 2 - اصلي کوانتوم نمبر په لنډ ډول توضیح کړئ.
- 3 - ثبوت کړئ چې $r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m k e^2}$ دي.
- 4 - که چيرې د يو عنصر اټومي نمبر 82 وي، د هغه الکتروني جوړښت وليکي او د عنصر موقعيت په پيربورد او گروپ کې وټاکئ .
- 5 - د هايډروجن د اټوم د الکترون د څپې اوږدوالی محاسبه کړئ، په هغه صورت کې چې چټکتيا $\nu = 2200 km / sec$ او $(n = 1)$ وي.



دوهم څپرکی

دعنصرونو الکتروني جوړښت اودوره يي خواص



- د هر عنصر د خواصو مطالعه، په جلا ډول به مشکل کار نه وي؟ ولې د عنصرونو دوره يي جدول ترتيب او منځته راغی؟ د منديلېف د جدول ترتيب د عنصرونو د اتومونو د کومو پارامترونو پربنسټ ترسره کيدلی شي؟ د عنصرونو الکتروني جوړښت د جدول په ترتيب کې څه رول لري؟ د منديلېف د جدول بلاگونه، گروپونه او پيريودونه د عنصرونو د اتومونو د کومو بنسټيزو فکتورونو پربنسټ ترتيب او تنظيم شوي دي؟
- د پورتنیو پوښتنو او هغې ته ورته پوښتنو د حل لپاره کولای شي په دې څپرکي کې معلومات لاسته راوړئ او د منديلېف جدول او د عنصرونو د پرله پسې خواصو په اړه مفصل معلومات به لاسته راوړئ.



۲- ۱: د پیریودیک سیستم د جوړښت تاریخچه

په طبیعت کې 90 عنصره په طبیعي ډول او نور پاتې په مصنوعي ډول کشف شوي دي، د عنصرونو په خواصو او مشخصاتو پوهیدل په جلا ډول ستونزمن کار دي، له دې امله کیمیا پوهانو کوشش وکړ ترڅو عنصرونه په یو جدول کې داسې تنظیم کړي چې د هغوی د یو د خواصو په هکله پوهه، د هغوی د یو شمیر نورو په خواصو هم پوه شي.

په 1865 م کال یو انګلیسي کیمیا پوه د نیولینډز (Newlands) په نوم د خپل وخت کشف شوي عنصرونه د هغوی د نسبتي کتلې د متناوبو زیاتوالو پر بنسټ په افقي قطارونو کې ترتیب کړل، دلته ولیدل شوه چې اتم نمبر عنصر د لومړي نمبر عنصر د لاندې چې له سره یو شان خواصو لري، ځای ونیو او په همدې ترتیب نهم نمبر د دوهم نمبر د لاندې او داسې نور ځای ونیوه، همدا رنگه یې دیو شان خواص لرونکي عنصرونه په یوه عمومي ستون کې ځای پر ځای کړ (چې نن ورځ دا سیستم د نیولینډز د اوکټا په نوم یادېږي). د نیولینډز جدول په لاندې ډول دی:

(2- 1) جدول د نیولینډز اوکټای

1	2	3	4	5	6	7
	H	Li	Be	B	C	N
	O					
	F	Na	Mg	Al	Si	P
	S					
	Cl	K	Ca	Cr	Ti	Mn
						Fe



نیولینډز خپل کیمیاوي اوکټای (octave) د موزیک له اوکتایډونو سره پرتله کړ او هغه یې د (octave) د قانون توضیح شوي قانونمندی په نوم یاد کړه، د نیولینډز پرتله کول یې دلیل او ناکامیابه وموندل شوه او دنوموړی عالم تیري له نظر څخه و غورځېده.

په 1869 م کال منډلیف (D.M. Mendeleev) روسی عالم ورته مفکوره پیشنهاد کړه¹، نوموړي هم د خپل وخت کشف شوی عنصرونه د هغوی د نسبتي اټومي کتلې د تناوب د زیاتوالي پر بنسټ په افقي قطارونو (Period) کې ترتیب او په عمومي ستونونو کې (Group) یو ځای کړه، نوموړي دا ډول ترتیب شوی جوړښت د عنصرونو د پیرویډیک سیستم په نوم یاد کړ. د منډلیف دا ترتیب شوي سیستم د نیولینډز د سیستم څخه بشپړ دی چې یوه برخه یې لاندې لیدل کېږي: (دا جدول 1871) م کال کې ترتیب شوی دی.

1 - د مایر L. motier په نوم جرمني عالم په 1864 کال کې 27 عنصره د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ ترتیب کړل او وروسته هغه یې د تناوب پر بنسټ په پنځه گروپونو تقسیم کړل چې هر یو گروپ یې درې عنصرونه درلودل او په 1870 کال کې یې ادعا وکړه چې

منډلیف ته ورته جدول یې ترتیب کړي دي.

(2-2) جدول د مندلیف پیرویونیک سیستم

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H 1							
2	Li 7	Ba 94	B 11	C 12	N 14	O 16	F 19	
3	Na 23	Mg 24	Al 27.3	Si 28	P 31	S 32	Cl 35.5	
4	K 39	Ca 40	-44	Ti 48	V 51	Cr 52	Mn 55	Fe 56, Co 59 Ni 59, Cu 63
5	(Cu 63)	Zn 65	-68	-72	As 75	Se 78	Br 80	Ru 104, Rh 104 Pd 105, Ag 108
6	Rb 85	Sr 87	Y 88	Zr 90	Nb 94	Mo 96	-100	
7	(Ag 108)	Cd 112	In 113	Sn 118	Sb 122	Te 125	1127	
8	Cs 133	Ba 137	Tl 138	Pb 140	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	Fe 176	Ta 180	Ta 182	W 184	-	Os 195, Ir 517 Pt 198, Au 199
11	(Au 199)	Hg 200	Tl 204	Pb 207	Bi 208	-	-	
12	-	-	-	Tl 231	-	U 240	-	

د دوره يي جدول په ترتيب کي د مندلیف نوبوالي

1 - مندلیف اوږدي سلسلې او یا لوی پیرویونونه په خپل جدول کي د عنصرونو لپاره وټاکل کوم چې نن ورځ د انتقالی (Transitional) عنصرونو په نوم یاد یږي، د هغو ډټاکلو لامل داو چې Fe, Mn, Ti په زیاتی ډول د غیر فلزونو S, P, Si د عنصرونو لاندې تنظیم کیدای نشي (د نیولیندز د اوکتای پورتنی شکل وگوري).

2 - مندلیف په خپل ترتیب شوی جدول کي تشی حجرې د نړۍ د نا کشفو عنصرونو لپاره پرايښتي وي، نو دلته يي پام و چې ارسنیک As په طبعي بڼه V گروپ ته وتړل شو. نوموړي عالم دوه حجرې د جست Zr او ارسنیک ترمنځ کي خالی پرايښتولي وي.

3 - کله چې د عنصرونو ځای په لومړي پیرویونیک سیستم کي د هغوی د انومي کتلې پرنسپت په گروپونو کي د یو گروپ عنصرونو د کتلې له خوا صو سره سمون نه درلود، دلته به مندلیف د همدا سې عنصرونو لپاره نوي نسبتي انومي کتله پیشنهاد کړه د (Cr, In, Pt, Au) عنصرونو ته نوي انومي کتله وړاندې شوي ده چې د مندلیف په جدول کي د دي عنصرونو اړونده ځای په ځای کیدل باید وي.

4 - مندلیف د عنصرونو د کشف وړاندیز کړی وه چې له کشف څخه وروسته د مندلیف د جدول په ځینی شوو ځایونو کي د هغوی کیمیاوي خواصو په پام کي نیولو سره ځای پر ځای شول په دي صورت کي د مندلیف په پیرویونیک جدول باندې باور خورا زیات او ترتیب ته يي صحیح بڼه ورکړل شوه.

فعالیت



خرنگه د عنصرونو درې بعدی جدول جوړولې شو؟
لومړۍ پړاو: په پیل کې د عنصرونو اصلي گروپونه د مقوا اکاغذ پر مخ ولیکئ او د عنصرونو هر گروپ له مقوا څخه جلا کړئ.

IA					VIIA				
1	H	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	He	
2	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	
3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	
4	K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
5	Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
6	Cs	Ba	Ti	Pb	Bi	Po	At	Rn	
7	Fr	Ra							

دوهمه پړاو: د لومړۍ گروپ د ځنډي برخه د اتم گروپ د ځنډۍ سره ونښلولی، یو اته ضلعي جوړښت په لاسته راوړی؛ حتی کولی شي چې د هر عنصر حجره په بیلابیلو رنگونو ونښتي. درېمه پړاو: د فرعي گروپونو عنصرونه هم یو مقوا کې په گروپونو او پېریودونو په ترتیب سره ولیکي او د دوهمې مرحلې په شان عمل وکړئ، دلته به دولس ضلعي پر لاس راوړي.

IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB			IB	IIIB
Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg

څلورمه پړاو: د لښتایدونو او اکتینایدونو د سلسلو عنصرونه د مقوا په مخ ولیکئ او د پوړتینو پر او لاس ته راخلي مواد په ترتیب سره یوه ښښنه یي تختي کې ونښلوئ، بیا لاس ته راخلي ترتیب را څرگنده کړئ.

د منډلیف له پېریودیک قانون سره سم: د عنصرونو خواص او د هغوی پرله پسې بدلون په پېریودونو کې له هغې د نسبتي اتومي کتلې سره اړیکې لري او دهغوی ځای په پېریود کې ټاکي. کله چې نښه گازونه (د VII اصلي گروپ عنصرونه) کشف شو، په دې وخت په پېریودیک سیستم کې د عنصرونو د ځای پر ځای کیدلو شخړه د هغوی د اتومي کتلې د متناوب زیاتوالي په پام کې نیول هم د مینځه ولاړل، نښه گازونه د نوو کشفونو د ډلې څخه او وروسته د منډلیف د جدول له ترتیب څخه وو، دا عنصرونه یي د هلوچنونو او فعالو فلزونو (الکلی فلزونو) د I اصلي گروپ ترمنځ ځای پرځای کړی دي.

د جدول ښي څوانه چې صفري (VIII) جلا گروپ زیات شوی دي، د دې گروپ یو عنصر چې



ارگون (Ar) دی، اټومي نسبتي کټله يې د هغه د وروستي عنصر څخه چې پړاښتم دی او I اصلي گروپ کې ځای لري، لویه ده ($amu, Ar = 40$) نو باید ارگون د پړاښتم په حجره کې ځای ولري؛ نو سرچپه باید په صفري گروپ کې له نجیبه گازونو سره ځای پرځای وي؛ خو دلته منډلیف د نسبتي اټومي کتلې د زیاتوالي څخه د خپل جدول په ترتیب کې گټه وانه څیستله؛ نو د هغوی د کیمیاوي او فزیکي خواصو تشابه یې په پام کې ونیوله او عنصرونه یې په عین گروپ کې ځای په ځای کړل چې K په اول اصلي گروپ کې او Ar په صفري ($VIII$ اصلی) گروپ کې له نجیبه گازونو سره ځای لري چې خپله هم په ترتیب سره فعال فلز او نجیبه گاز دي، د دې سلسلې د جوړېدو بله بیلگه د ایوډین او تلوریم له ځای څخه عبارت دي؛ که چېرې په پیرویوړیک سیستم کې د عنصرونو د ځای پر ځای کېدلو معیار د عنصرونو نسبتي اټومي کټله وي، نو باید تلوریم د برومین لاندې د هلو جنونو او ایوډین به د سلفر او سلیسیم لاندې ځای درلوده، خو د تلوریم او ایوډین کیمیاوي خواص د دوی ځای پر ځای کیدل په معکوس ډول حکم کوي.



پام وکړئ:

نوموړې پرېلمونه د منډلیف په جدول کې د موزلي (*Moseley*) په نوم عالم په 1916 کال کې حل کړه، نوموړی وینودله چې اټومي نمبر (د پروتونونو شمېر) د نسبتي اټومي کتلې څخه لورمفهوم د عنصرونو په پرله پسې ترتیب کې په دوره یې بڼه لري، نوموړی عالم د رونتگین د وړانگو د څپو د اوږدوالي دمریج جذر اوبنتی (معکوس) کمیت په پیرویوړیک سیستم کې د عنصرونو ترتیبي نمبر سره اړیکه یې د گراف په بڼه روښانه کړه او ویني وبل چې د عنصرونو ترتیبي نمبر د دوی مهمه ځانگړتیا ښکاره کوي، دا خاصیت د اټوم د هستې چارج د خپل ځانه څخه راښیي او هم دا ذری د یو عنصر خپل وروستي عنصر څخه د منډلیف د جدول په پیرویوړیک کې د یو واحد په اندازه په پرله پسې بڼه زیاتېږي. د موزلي دا کشف د منډلیف د جدول د ترتیب په ورسټو پړاو او د عنصرونو د پیرویوړیک سیستم په ټینګښت کې لوی خدمت کړی دی او عنصرونه یې په پیرویوړیک سیستم کې د هغوی د اټومي نمبر د پرله پسې زیاتوالي پرنسپ ځای په ځای کړل.

هغه عنصرونو چې په پیرویوړیک سیستم کې یو له بل لاندې په عمومي شکل په ستونونو کې ځای لري، دوی یوشان کیمیاوی خواص لري. د منډلیف د جدول عمومي ستونونه د گروپونو (*Groups*) په نوم او افقي قطارونه یې د پیرویوړیک (*Periods*) په نوم یادوي. د جدول په اوږدو پیرویوړیک کې انتقالي فلزونه (*Transitional Elements*) ځای پر ځای شوي دي.

د منډلیف جدول د عنصرونو په سلسله کې د عنصرونو د کیمیاوي خواصو ورته والی د څو

عنصرونو تر منځ وروسته بیرته نکر اړیږي؛ د بیلګې په ډول: له نجیبه گازونو اتومي نمبرونه 2, 10, 36, 54 او 86 دي؛ نو ورته کیمیاوي خواص د پرتیو لیکل شوو عددونو له منځونو څخه وروسته بیا لیدل کیږي. وروسته د نجیبه گازونو څخه، فعال کیمیاوي فلزونه (لومړی گروپ) ځای لري چې د M^+ ایونونه تشکیلوي او له القلي عنصرونو (Li, Na, K, Rb, Cs او Fr) څخه عبارت دي. مخکې له هر نجیبه غاز څخه فعاله غیر فلزي عنصرونه ځای لري چې د Y^- ایون جوړوي چې له هلو جنونو (I_2, Br_2, Cl_2, F_2) څخه عبارت دي، وروسته د فعالو القلي فلزونو څخه ځمکنی القلي فلزونه (Be, Mg, Ca, Sr, Ba او Ra) ځای لري چې د IIA گروپ یې تشکیل کړي دي، په همدې ترتیب له هلو جنونو (VII) څخه د مخه IVA عنصرونه (O, S, Se, Te او Po) ځای لري چې د هغوی ولانس (2) دي او د هغوی خواص له غیر فلزونو څخه تر فلزونو (د پورته څخه بېګنه خوا ته په متواله بڼه) بدلون مومي.

په III, IV, V او VI اصلي گروپونو کې هغه عنصرونه شامل دي کوم چې ټبر کم یو بل سره یو شان خواص لري، د دوی خواص خپل اړوند گروپ پورې اړه لري او له پورته خوا څخه بېګنه خوا ته یې فلزي خاصیت زیاتیږي، دوی ټاکلي ولاسونه ځانته غوره کوي. عنصرونه د کیمیاوي خواصو او د هغوی د بدلونونو په پام کې نیولو سره په اوو پیړیو دو ($Period$) یا سلسلو ویشل شوي دي، چې په لومړۍ پیړۍ کې دوه عنصره، په دوهم او دریم پیړۍ کې 8, 8 عنصره، په څلورم او پنځم پیړۍ کې 18, 18 عنصره، په شپږم پیړۍ کې 32 عنصره او په اووم پیړۍ کې 17 عنصره شتون لري چې اوم پیړۍ لا تر اوسه بشپړه شوی نه دي، د عنصرونو شمېر په پیړیوونو کې د نجیبه گازونو د اتومي نمبر د تفاوت پر بنسټ (وروستی له مخکې څخه منفي) او یا د لاندې فورمولونو په واسطه لاس ته راوړل کیږي:

$$\frac{(n+1)^2}{2} = \text{په طاق پیړۍ کې د عنصرونو شمېر}$$



$$\frac{(n+2)^2}{2} = \text{په جفت پیړۍ کې د عنصرونو شمېر}$$

په څلورم او پنځم پیړۍ کې د IIA او III گروپو په منځ کې پسه هریږود کې (د La او P بلاک د عنصرونو په منځ کې) لس فلزي عنصرونه ځای لري چې تقریباً یو بل ته د ورته خواص لري او د انتقالی ($Transational$) عنصرونو په نامه یادېږي، په شپږم او اووم پیړۍ کې له انتقالی فلزونو څخه پرته د f عنصرونه هم شتون لري چې خاصې سلسلې د $Lanthanides$ او $Actinoids$ په نوم یې تشکیل کېږي، د دې سلسلو عنصرونه یو بل ته فوق العاده ورته خواص لري او هره سلسله 14, 14 عنصرونه لري.

[illegible]



٢- ٢ : د عنصر و نو الکثروني جوړښت:

الالكتروني جورڻست په لاندې ډول دي:




انرژیکي د الکترونونو شمېر دھغوی په اوریٹالونو کې راښيي .

نوموړو وعصصرونو اکستروني جوړښت په لاندې ډول دی:




کاربن 6 الکترونونه لري چې پنځم او شپږم الکترونونه يې له هوند د قاعدې سره سم P دوه


اوربیتالونه په طاقه ډول د هم جهته سپین سره (د هغو د سپین مجموعه 1 ± 0) ځای نیولی دی چې الکتروني جوړښت یې په لاندې ډول دي:




په همدې ترتیب د اکسیجن الکتروني جوړښت $Z = 8$ فلورین $Z = 9$ او نیون $Z = 10$ په لاندې ډول دی:




د Ne عنصر د L مشبوع قشر ($L - shel$) لري، له نیون (Ne) څخه وروسته عنصر د Na عنصر دی، چې د منلیف د جدول د دریم پیړیو د لومړني عنصر دی، الکتروني جوړښت یې په لاندې ډول دی:



څرنگه چې لیدل کیږي، سوډیم دریمه د M سرونه په کاروبی ده او دهمې د $3S$ فرعي سرونه د الکترونو په واسطه په ډکیډو پیل کړی دی: له سوډیم نه وروسته عنصر Mg دی ($Z = 12$) چې د هغه الکتروني جوړښت په لاندې ډول دی:



د لاندې شپږ عنصرونو الکترونونه په $3P$ فرعي قشر کې ($3P = sub shel$) لیدل کیږي، د نوموړو عنصرونو الکتروني جوړښت په لاندې ډول دي:



څرنگه چې په پورتنیو الکتروني جوړښتونو کې لیدل کیږي، د $1S^2 2S^2 2P^6$ جوړښت د Ne د الکتروني جوړښت معادل دی، نو له دی امله د دې الکتروني جوړښت پر ځای د نیون سمبول (Ne) لیکل کیږي.



خلرم پیرود په K ($Z = 19$) Ca ($Z = 20$) باندې پیل او په Kr ($Z = 36$) ختم کیږي ، د K او Ca الکتروني جوړښت په لاندې ډول دي:

$$(Z = 19)K(Ar)4s^1$$

$$(Z = 20)Ca(Ar)4s^2$$

وروسته له هغې چې $4s$ فرعي سوبه ($sub\ she$) $4s$ د الکترونونو په واسطه ډکه شي ، د $3d$ فرعي سوبې ډکېدل پیل کیږي چې د Sc ($Z = 21$) د $3d$ فرعي سوبې څخه عبارت دي او د $3d$ د لسو عنصر واوریتالونه Sc (په شمول) د الکترونونو په واسطه ډک کیږي ، چې د هغه وروستی عنصر Zn ($Z = 30$) دی، کله چې د عنصرونو د $3d$ سوبو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حال وي ، د داسې عنصرونو کیمیاوي خواص په هغه اندازه چې د لیدلو وړ وي ، بدلون نه کوي. د لس عنصر نه چې د هغوی د $3d$ فرعي سوبو اوریتالونه د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حال دي ، یو بل ته د ورته کیمیاوي خواص لري او د انتقالي عنصرونو په نوم یادېږي. د شپږ عنصرونو سوبه گالیم ($Z = 31$) څخه تر Kr ($Z = 36$) پورې د P فرعي سوبې اوریتالونه یې د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حالت کې دي (د هغوی د M اصلي قشر د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حالت کې دي) .

پنځم پیرود له دوهم اوږد پیرود څخه عبارت دي چې په Rb ($Z = 37$) پیل او د زینون Xe ($Z = 45$) په واسطه پای ته رسیږي، د انتقالي عنصرونو دوهمه سلسله په دې پیرود کې ځای لري.

شپږم پیرود په Cs ($Z = 55$) پیل او د Rn ($Z = 86$) په عنصر پای ته رسیدلي دي چې په دې پیرود کې د f څوارلس (14) عنصرونه هم ځای لري، دا پیرود د Ce ($Z = 58$) څخه پیل او پر Lu ($Z = 71$) پای ته رسیږي. دا هغه عنصرونه دي چې د هغوی د f فرعي سوبو اوریتالونه یې د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حال کې دي او د ځمکې د نندرو فلرونو د ډلو څخه دي ، دا عنصرونه د کیمیاوي خواصو له کبله یو بل سره ډیر مشابه د d انتقالي عنصرونو څخه دي، څرنگه چې له Lan څخه وروسته په پیرود کې ځای لري؛ د دې امله دا سلسله د ($Lanthanoides$) په نوم یاد شوې ده، هغه عنصرونو چې د Lu ($Z = 71$) څخه تر Hg ($Z = 80$) پورې د انتقالي عنصرونو دریمه سلسله یې تشکیل کړي ده ، د هغوی د $5d$ فرعي سوبې اوریتالونه د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حال کې دي.

اووم پیرود چې تر اوسه پورې د منلیف جدول د عنصرونو وروستی پیرود دی ، په Fr ($Z = 87$) پیل کیږي، وروستی طبیعي عنصر (یورانیوم) هم په دې پیرود کې ځای لري، 14 فلزي عنصرونه د f هم په دې پیرود کې ځای لري چې د f فرعي سوبې اوریتالونه یې د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په حالت کې دي، دا عنصرونه Th ($Z = 90$) څخه پیل او د Lr ($Z = 103$) پر مصنوعی عنصر پای ته رسیږي؛ څرنگه چې دا عنصرونه په پیرود کې د Ac ($Z = 89$) عنصر په دوام ځای

لري ؛ له دي امله د دې سلسلې عنصرونه چې يو بل سره ورته ځانگړتياوي لري ،د (Actinoides) د سلسلې په نوم يادېږي.

نوټ: له يورانيم څخه وروسته عنصرونه مصنوعي او راډيو اکتيف دي.

۲- ۳: د عنصرونو خواص او په دوره يي جدول کې دهغوی متناوب بدلون

د عنصرونو د اټومونو ځينې مهم خواص په پېرېودونو او گروپونو کې يو بل په پرتله په متناوب ډول بدلون مومي ، چې د عنصرونو د خواصو متناوب بدلون د منډليف جدول کې په لاندې ډول توضيح کېږي:

۲- ۱: د ايونايژيشن انرژي او د هغې متناوب بدلون د منډليف په جدول کې

ايونايژيشن انرژي: هغه مقدار انرژۍ ده چې د يو اټوم - گرام څخه د يو الکترون د لرې کولو لپاره په لايتناهي فضا ته ضرورت ده، د ايونايژيشن د انرژي اندازه د جلا شوی الکترون او د آزاد شوي الکترون د انرژۍ له توپير سره مساوي ده ، (د آزاد الکترون انرژۍ صفر فرض شوي ده) په عمل کې د ايونايژيشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ ، دوهمې ، درېمې او نورو الکترونونو د پاره په کاروې ، داسې چې د لومړنۍ الکترون د ايونايژيشن انرژي عبارت له هغه انرژي څخه ده چې د لومړنۍ الکترون د جلا کولو لپاره ضروري وي ، نو دا الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله شتون لري. د اټوم لومړۍ الکترون دوهم څخه او دوهم له درېم اونور په پرتله په کمه انرژي جلا کېږي او د ايونايژيشن انرژي يې ډېره کمه ده ؛ يعنې: $E_1 < E_2 < E_3 < \dots$ لاندې جدول د لومړۍ ، دوهمې ، ... د ايونايژيشن انرژي وړ ښيي:

(2- 4) د لومړي اصلي گروپ د عنصرو د اټومونو د لومړني ، دوهمې د جوړېدلو د انرژي اندازه :

گروپ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
اصلي	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni
انرژي	5.1 eV	7.6 eV	6.0 eV	13.6 eV	15.0 eV	18.8 eV	21.5 eV	23.5 eV	4.2 eV	9.0 eV	19.3 eV	21.8 eV	23.8 eV	26.5 eV	28.5 eV	31.5 eV	34.0 eV	36.8 eV

د سويم لومړۍ الکترون، د Mg لومړنۍ او دوهم الکترون او د المونيم درېم الکترون په آساني جلا کېږي.

ضروري معلومات



د هايډروجن د اټوم د ايونايژيشن انرژي $13.6 eV$ ده او د انرژي په دې خاطر لږ څه زياته ده چې الکترون هستې ته نژدې دي او د هستې د کشش قوه په هغه باندې اغېزه کوي.

اضافي معلومات :

د گروپونو په حدود کې د ايونايژيشن انرژي له پورته څخه ښکته خواته کمېږي ، برعکس له ښکته څخه پورته خواته زياتېږي ، علت يې دا دي چې په عين گروپ کې د عنصرونو الکترونونه د هستې څخه لرې کېږي ، په لومړنۍ اصلي گروپ کې د ايونايژيشن انرژي له پورته څخه ښکته خواته کمېږي



او برعکس له ښکلتني خوا څخه پورتنی خواته زیاتېږي.


(2- 5) د تناوب جدول د لومړۍ گروپ د عناصرونو د ایونایزیشن انرژي

د ایونایزیشن انرژي	د سمبول عنصر
13.6 eV	1 H
5.4 eV	3 Li
5.1 eV	11 Na
4.3 eV	19 K
4.2 eV	37 Rb
3.9 eV	55 Cs

د بیرونونو په چاپیریال کې د ایونایزیشن انرژي د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتېږي، ځکه په بیرونونو کې د اټومي نمبر په زیاتوالي د قشرونو شمېر نه زیاتېږي؛ خو د هستې چارج لوړېږي چې هسته الکترونونه ځان خواته راکش کوي او پر خپل شاوخوا کې یې رټولوي، په پایله کې د اټوم حجم او شعاع کوچنی کیږي، د هستې د مثبت چارج اغېزه په الکترونونو باندې زیاتېږي او الکترونونه خپل خواته کش کوي، په دې بنسټ د ایونایزیشن د انرژي ضرورت زیات او په زیاتې انرژي کولای شو چې له هستې څخه الکترون جلا کړو:



(2- 6) جدول: د عناصرونو د اټومونو د ایونایزیشن انرژي




خړنگه چې په پورتنۍ جدول کې لیدل کیږي، هر خورمه چې د عنصر ونو د اټومونو الکتروني خارجي قشر ډیر زیات د الکترونونو په واسطه ونیول شي په همافه اندازه د عنصر د اټوم کلکوالي او ټینګښت زیاتېږي له دې امله دي چې نجیبه گازونه ډیر کم ایونایزیشن کيږي او د هغوی د ایونایزیشن انرژي ډیره زیاته ده.

کړنه

لاندې گراف وگورئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.

کوم عنصر د ایونایزیشن ډیره زیاته انرژي لري؟ کوم یو د ایونایزیشن ډیره لږه انرژي لري؟



ضروري معلومات

د الکتروني جوړښت وړاندیز او د اټومي نمبر لاس ته راوړل د عنصر د پرله پسې ایونایزیشن انرژي په ګټه اخیستلو سره کېدای شي.

په لاندې جدول کې د یو عنصر متوالي انرژي په کیلو ټول فی مول وړاندې شوي:

د (2 - 7) جدول د یو عنصر متوالي انرژي په کیلو ټول فی مول


E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
1402	2856	4578	7475	9444	53266	64359

خړنگه چې په جدول کې لیدل کیږي، د نوموړی عنصر د ایونایزیشن انرژي د E_5 څخه E_6 ته په ډیر زیات کیمیت ټوپ وهلې دي؛ نو:

1 لوی ټوپ د عنصر د اټوم د ایونایزیشن په ټوله انرژي کې = د عنصر پیریود x

$$1 + 1 = 2$$

خړنگه چې د عنصر د ایونایزیشن د زیاتوالي ټوپ په شپږمه پړاو کې لیدل کیږي، نو له دې امله عنصر په خپل باندني قشر کې یوازې پنځه الکترونه لري او د منډلیف د جدول په پنځم گروپ کې ځای لري. نو نوموړی عنصر نایټروجن دي او اټومي نمبر یې 7 او الکتروني جوړښت یې په لاندې ډول دی:



۲- ۳: دعنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوب یي

د عنصرونو د اټومونو نور خواص چې الکتروني جوړښت پورې اړه لري، هغه د الکترون اخیستلو میل دی. څرنگه چې وړاندی وویل شول، د یو الکترون جلا کول له اټوم څخه باید اټوم ته انرژي ورکول شي، ترڅو د هستې د جاذبې قواو څخه جلا شي، که چېرې یو الکترون اټوم ته ورزیات او په منفي ایون (*Anion*) تبدیل شي، زیات شوي الکترون د هستې د قوې په واسطه جذبېږي او له هغه څخه په ټاکلي اندازه انرژي ازاېږي، دا انرژي د الکترون غوښتلو (*Electron Affinity*) د انرژي په نوم یادېږي او له هغه انرژي سره معادله ده کوم چې وروسته له منفي ایون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبېږي.

څه ناڅه د ټولو عنصرونو لپاره د الکترون غوښتلو عملیه یو *Exothermic* تعامل دي، نو کله چې یو بل الکترون د اکسیجن ایون ته ورزیات شي، ترڅو چې د اکسیجن منفي ایون تشکیل شي، اړه ده چې یوه اندازه انرژي د اکسیجن اټوم ته ورکړل شي، چې په دې صورت کې الکترون له هغې سره یو ځای او د ورکړ شوي انرژي اندازه 6.5eV سره مساوي ده. او په تشکیل کې د ورکړ شوي انرژي مقدار 4eV دي. لاندې جدول د ځینو عنصرونو *Electron Affinity* انرژي مقدار راښيي:

(2- 8) جدول د ځینو عنصرونو د الکترون غوښتلو د انرژي مقدار

عنصر	Electron Affinity انرژي	محصولات
فلورین	-344 KJ/mol	$F + 1e^- \longrightarrow F^-$
کلورین	-349 KJ/mol	$Cl + 1e^- \longrightarrow Cl^-$
برومین	-325 KJ/mol	$Br + 1e^- \longrightarrow Br^-$
اکسیجن	-142 KJ/mol	$O + 1e^- \longrightarrow O^-$
ایون O^{1-}	+844 KJ/mol	$O^{1-} + 1e^- \longrightarrow O^{2-}$
هایدروجن	-72 KJ/mol	$H + 1e^- \longrightarrow H^-$
سودیم	-50 KJ/mol	$Na + 1e^- \longrightarrow Na^-$

د عنصرونو الکترون غوښتنه په بیرونوډونو او گروپونو کې په پرله پسې ډول بدلون مومي؛ داسې چې د یو گروپ په چاپیریال کې د عنصرونو *Electric Affinity* له پاسه څخه ښکته ځوانه کمیږي او د بیرونوډونو په چاپیریال کې انرژي او د الکترون اخیستلو میل له کینې خوا څخه ښي ځوانه زیاتېږي او د ایونایزیشن له انرژي سره نیغه اړیکه لري.



۲- ۳- Electronegativity او Elicto Positivity خاصیت

هغه عنصرونه چې د الکترون اخيستلو ميل لري او الکترانونه ځان ته جذبوي، د الکترونيگاتيويتي *Electro Negative* په نوم ياديږي او برعکس هغه عنصرونه چې د الکترون له لاسه ورکولو ميل لرونکي دي، الکترون ورکونکي عنصرونو (*Electro Positive*) په نوم ياديږي. د عنصرونو الکترونيگاتيويتي د هغوی د ايوناييزيشن په اثرې پورې اړه لري، که چېرې د عنصر د ايوناييزيشن اثرې کمه وي، دا عنصر الکترونيگاتيويتي دي او که چېرې د ايوناييزيشن اثرې ښايي زياته وي، برعکس د هغه الکترونيگاتيويتي کمه ده.

ډير پوه شي: (اضافي معلومات)



د يوپيريود په چاپيريال کې د عنصرونو الکترونيگاتيويتي له کيڼې خوا ښي خوا ته کمه کيږي؛ برعکس له ښي خوا څخه کيڼې خوا ته زياتيږي؛ په همدې ترتيب د يو گروپ په چاپيريال کې د عنصرونو الکترونيگاتيويتي له پورته څخه ښکته خوا ته زياته شوي؛ برعکس له ښکته خوا څخه پورته خوا ته کميږي. همدارنگه د عنصرونو الکترونيگاتيويتي خاصيت په گروپ او پيريود کې په متناوب شکل بدلون مومي؛ داسې چې د يوپيريود په چاپيريال کې د عنصرونو *EN* له کيڼې خوا څخه ښي خوا ته په متناوبې شکل زياتيږي، برعکس د ښي خوا څخه کيڼې خوا ته کميږي. د يو گروپ په چاپيريال کې د عنصرونو الکترونيگاتيويتي د پاس څخه ښکته په متناوب شکل کميږي او برعکس له ښکته څخه پورته خوا ته په متناوب شکل زياتيږي؛ له دې څخه معلومېږي چې د عنصرونو *EN* له اتومي شعاع سره معکوسه اړيکه لري؛ پر دې بنسټ فلورين د طبيعت ډير الکترونيگاتيويتي عنصر دي، *CS* او *Fr* د طبيعت ډير الکترونيگاتيويتي عنصرونه دي. په 1939 کال د پاولينگ (*Linus Cart Pauling*) په نوم عالم د عنصرونو الکترونيگاتيويتي لپاره نسبتې واحد وټاکه چې د *Fr* او *CS* الکترونيگاتيويتي 0.7ev او د فلورين 4.1ev ده (2-9) جدول د پاولينگ الکترونيگاتيويتي رانښي. دا جدول د عنصرونو هغه جدول دي کوم چې په کې د نجيبه عنصرونو گازونه شتون نه لري؛ ځکه د هغوی الکترونيگاتيويتي صفر ده، څرنگه چې له جدول څخه معلومېږي. هغه عنصرونه چې په ښي خوا او پورتي برخه کې ځای لري، الکترونيگاتيويتي دي او د هغوی الکترونيگاتيويتي تقريبا $E \geq 2ev$ ده، دا عنصرونه ډير فلزونو (*Nonmetals*) په نامه ياديږي او نور عنصرونه فلزونه او شبه فلزونه دي، د جدول په لاندیني او کيڼه برخه فلزونه ځای په ځای دي چې ډير الکترونيگاتيويتي دي.

(2- 9) جدول د عنصرونو الکترونیکیاتی

The image displays two periodic tables illustrating electronegativity trends. The left table, labeled 'Increasing electronegativity', shows values ranging from 0.7 (Francium) to 4.0 (Fluorine). The right table, labeled 'Decreasing electronegativity', shows values ranging from 0.7 (Francium) to 4.0 (Fluorine). Both tables include a color-coded legend for electronegativity ranges.

له ویلو دي پاتې نه شي دا چې دالکترونګاتیویتی عددونه په درې طریقو محاسبه شوي دي او په جدول کې د سمبول دلاندې عددونه د پاولینگ په طریقې لاس ته راغلي دي .

۲- ۴: د اټومي او ایوني شعاع (Atomic and Ionic Radius) متناوب بدلون

د عنصرونو اټومي شعاع د اټوم د هستې او باندې قشر د وروستۍ الکترون ترمینځ فاصله ده چې د اټوم له هندسي پارامترونو څخه ګڼل کېږي .


یور لومړی ځل لپاره د هایدروجن اټومي شعاع د الکترون د حرکت فرضول په دایره وي قشر کې په ریاضیکي معادلې کې محاسبه کړ ، چې کمیت یې

۵۲.۹ پیکامتر دی .

خرنګه چې د اټوم په جوړښت کې مولوسټل ، دالکترون ځای په اوربیتالونو (Orbitals) کې دي او اوربیتال هم د اټوم د شاوخوا فضا هغه برخه ده چې په هغه کې د الکترون د احتمالي شتون %۹۵ دي ، دا اوربیتالونه کېدای شي کروي (د S اوربیتال) د دمبل په شان (د P اوربیتال) وي ، نو کولای شو

چې په بیلابیلو طریقو اټومي شعاع پیدا کړو .

۱ - د واندروالس د شعاع پر بنسټ کېدای شي د مطلوب عنصر اټومي شعاع لاس ته راشي. د واندروالس شعاع نیمه فاصله د دوو مجاور اټومونو د دوو هستو ترمنځ ده.




د واندروالس شعاع = نیمه فاصله د دوو مجاور هستو ترمنځ

لومړی مثال: د اوسپني د دوو مجاورو اټومونو ترمنځ فاصله په فلزي شبکه کې $2.48 \text{ \AA}$ ده، پر دې بنسټ اوسپني اټومي شعاع $1.24 \text{ \AA}$ ده.

$$\frac{2.48 \text{ \AA}}{2} = 1.24 \text{ \AA}$$

2 - د دوو اټومي مالیکول د دوو هستو په منځ کې (کوولانسی شعاع) په دوو ویشل شي، د هغه کوولانسي شعاع یا اټومي شعاع پیدا کړئ.



دوهم مثال: د اټومونو فاصله $2.66 \text{ \AA}$

ده ، د اټومونو شعاع لاس ته راوړئ.

$$r_{co} = \frac{1}{2}d = \frac{2.66 \text{ \AA}}{2} = 1.33 \text{ \AA}$$

حل :

شعاع کوولانسی = د مالیکول د هستو د مالیکول د دوو هستو په منځ کې نیمه فاصله

د عنصرونو اټومي شعاع د هغوی د خاص الکتروني جوړښت د لرلو له امله یو له بل څخه توپیر لري چې دا تفاوتونه متناوب دي، داسې چې:

د عنصرونو د یو ګروپ په چاپیریال کې اټومي شعاع له پورته خوا څخه ښکته پورته او برعکس له ښکته خوا څخه پورته پورته او پرله پسې ډول کوچنی کیږي، لامل یې دا دي چې د عنصرونو اټومي نمبر په ټاکلو کمیتونو او د لیدو وړ له پورته خوا څخه ښکته پورته زیاتېږي او د الکتروني قشرونو شمیر هم د یو واحد په اندازه لوړېږي چې په پایله کې د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کې له پورته خوا څخه ښکته پورته لوړېږي او اټومي شعاع هم لویه کیږي.


د پیریودونو په چاپیریال کې د عنصرونو اټومي شعاع د کیچي خوا څخه ښکته پورته کوچنی او برعکس د ښکته خوا څخه پورته متناوب شکل لویه کیږي، د هغې لامل دا دي چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکتروني قشر باندې زیاته او الکترونونه یې د هستې په چاپیریال کې راټولېږي، پر دې بنسټ د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي. (2 - 10) په جدول کې وګورئ چې د عنصرونو د اټومي

شعاع کموالی او زیاتوالی په پیرویرونو او گروپونو کې په څه ډول بدلون کوي.

فعالیت

1 - د ${}_{11}Na$, ${}_{13}Al$ او ${}_{15}P$ عنصرونو الکتروني جوړښت ولیکئ او هم د هغوی اتومي شعاع د (10-2) جدول څخه پر لاس راوړئ او د هغوی د شعاع د زیاتوالي پرتسټ ترتیب کړئ.

2 - د لاندې څلور اتومونو الکتروني جوړښت ولیکئ او د هغوی اتومي شعاع د (2-10) جدول څخه پر لاس راوړئ او د زیاتوالي پرتسټ یې تنظیم کړئ.



(2-10) جدول د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو شعاع

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
H 0.37							He 0.5
Li 1.52	Be 1.11	B 0.88	C 0.77	N 0.70	O 0.66	F 0.64	Ne 0.70
Na 1.86	Mg 1.60	Al 1.43	Si 1.17	P 1.10	S 1.04	Cl 0.99	Ar 0.94
K 2.31	Ca 1.97	Ga 1.22	Ge 1.22	As 1.21	Se 1.17	Br 1.14	Kr 1.09
Rb 2.44	Sr 2.15	In 1.62	Sn 1.40	Sb 1.41	Te 1.37	I 1.33	Xe 1.30
Cs 2.62	Ba 2.17	Tl 1.71	Pb 1.75	Bi 1.46	Po 1.5	At 1.4	Ra 1.4

ایوني شعاع او د هغې بدلون د منډلیف په جدول کې

عنصرونه میل لري تر څو خپل اوکټیت تکمیل او خپل بانډېني مدارانو الکترونونو اتو اعدادونو ته ورسوي او د نېجیه گازونو ثابت الکتروني جوړښت ځانته غوره کړي؛ دهمدې امله فلزونه د خپل بانډېني قشر الکترونونه له لاسه ورکوي او غیر فلزونه الکترونونه اخلي او په ایونونو بانډې بللېږي. د آیونایزیشن عملیه د عنصرونو په اتومي شعاع کې مهم بدلونونه رامنځ ته کوي؛ څرنگه چې د عنصرونو د کټیون شعاع د هغوی له اتومي شعاع څخه کوچنی ده او دعنصرونو د ایونونو شعاع

د هغوی له اتومي شعاعو څخه ډیره لویه ده؛ خو د هغوی بدلونونه په پیرود یګ سیستم کې د اتومي شعاع د پرله پسې بدلونونو په شان د پیرودونو او ګروپونو په چاپیرال کې دي. لاندې جدول د عنصرونو د انیونونو او کتیونونو شعاع ورښيي:

(2-11) جدول د انیوني او کتیوني شعاع پرتله کول.

د اټوم شعاع	د انیون شعاع	د اټوم شعاع	د کټیون شعاع
Cl $1^0 A$	Cl^- $1,8^0 A$	Li $1,5^0 A$	Li^+ $0,8^0 A$
O $0,78^0 A$	O^{2-} $1,4^0 A$	Na $1,9^0 A$	Na^+ $1^0 A$
S $1,27^0 A$	S^{2-} $1,84^0 A$	K $2,3^0 A$	K^+ $1,3^0 A$
S $1,27^0 A$		Rb $2,4^0 A$	Rb^+ $1,5^0 A$
N $0,92^0 A$	N^{3-} $1,7^0 A$	Cs $2,6^0 A$	Cs^+ $1,6^0 A$
O $0,92^0 A$	N^{5+} $0,11^0 A$	Ca $1,7^0 A$	Ca^{2+} $1,0^0 A$
		Fe $1,2^0 A$	Fe^{2+} $0,7^0 A$
		Fe $1,2^0 A$	Fe^{3+} $0,6^0 A$

فعالیت



(2-11) جدول په څیر سره وڅیړئ او پر لاندې مطلبونو باندې په ګروپي شکل په ټولګي کې څیړنې وکړئ.

- ولې د عنصرونو اتومي شعاع د هغوی د انیونونو د اړینې شعاع په نسبت کوچنۍ ده؟
- ولې د عنصرونو اتومي شعاع د هغوی د اړوند کټیوني شعاع په نسبت لویه ده؟
- د عنصرونو د اتومي او اړینې شعاعو متناوب بدلونونه په ګروپونو او پیریودونو کې څه ډول دي؟
- هغه عنصرونه چې د منډلیف په جدول کې د ډیپګونال (زاوېي) په حالت کې قرار لري د هغوی اتومي او اړینې شعاع یو بل ته څه نسبت لري؟

زده یي کړئ!



هغه ذرې چې مساوي الکترونونه ولري، د ایزوالکټرونیک (*Iso electronic*) په نوم یادېږي. هغه عنصرونه چې د منډلیف په جدول کې د ډیپګونال په حالت کې سره شتون ولري، د هغوی اتومي او اړینې شعاع سره مشابه دي.



۲- ۴: د انتقالی عنصرونو (d-Elements) خواص

انتقالی عنصرونه اکثراً ډیر کلک فلزونه دي چې په ساختماني کارونو کې د استعمال زیات ځایونه لري. اوسپنه په فلزي بڼه مس، ونادیم، نیکل او منگنیز د الیاژونو په جوړولو کې بنسټیز رول لري، نوموړي فلزونه د انسانانو د نن ورځې د تمدن لامل ګرځېدلي دي. د انتقالی فلزي عنصرونو په منځ کې داسې فلزونه هم شتون لري چې د نن ورځې پر مخ تللو صنایعو کې بنسټیز رول لوبوی؛ د بیلګې په ډول: د تیتان (Ti) فلز د طیارو جوړولو په صنعت او ونادیم (V) د کلسټ په توګه په کیمیاوي تعاملونو کې په کارول کېږي او هم د دې عنصرونو په منځ کې قیمتي فلزونه چې د نړۍ د ډیرو هېوادونو د پیسو پېښپیاښه ده، هم شتون لري چې له پلاتین، سرورزو او سپینوزو څخه عبارت دي، دنوموړو فلزونو د سطحې د بڼایسته والي او د زنگ وهلو په مقابل کې مقاومت له امله د بڼایست فلزونو په توګه ترې ګټه اخیستل کېږي، ټول دا عنصرونه فلزي دي او د برېښنا تیرونکي دي، سپین زر په عادي شرایطو کې لومړۍ درجه د برېښنا تیرونکي دي، دا فلزونه ځلا لري، د څټک خوړلو او سیمو جوړولو قابلیت لري چې په نازکو پامو تبدیلېږي، د ډیرو انتقالی فلزونو زنگ سپین دي او د هغوی د ایشیدو درجه د لومړۍ او دوهم ګروپونو د فلزونو څخه لوړه ده؛ خو د هغوی په زنگونو کې استثنا هم موجوده ده؛ د بیلګې په ډول: د مس زنگ سور قهوه ته ورته، سره زر ټیټه او سیماب هم سپین او په STP شرایطو کې دمایح په حالت پیداکېږي.


۲- ۱: د انتقالی عنصرونو په خواصو کې د d اوربیتالونو اغیزه

څرنګه چې په لومړۍ څپر کې کې ولوسل شو، د اوربیتالونو ډک کیدل د الکترونونو په واسطه د نظري قانون سره سم د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ ترسره کېږي او الکترونونه لومړي د هغو انرژیکي سیمو اوربیتالونه ډک وي چې په ټیټه انرژیکي سیمو کې ځای ولري. د d اوربیتال انرژي د قاعدې پر بنسټ د s اوربیتال څخه لوړه ده یا نو له دې امله الکترونونه په لومړي سر کې د s په اوربیتالونو کې ځای نیسي او زياتي الکترونونه د d په اوربیتالونو کې ځای کېږي، نو باید د d په اوربیتال کې موجود الکترونونه د s څخه بې ثباته وي؛ خو په عمل کې داسې نه ده، په انتقالی عنصرونو کې د d الکترونونه د راتلونکو s اوربیتالونو د الکترونونو څخه ډیر ټینګ بنسټلی دي او د دې عنصرونو د اتومونو تبدیلیدل په کټیونو باندې، د نظري وړاندوینو پر خلاف د s الکترونونه په لومړۍ سر کې له لاسه ورکوي او د اړتیا په صورت کې خپل د d اوربیتالونو الکترونونه وروسته له s څخه د لاسه ورکوي؛ د بیلګې په ډول: د اوسپنې د اتوم الکتروني جوړښت $3d^6 4s^2 (Ar)$ دي، د Fe^{2+} کټیون $3d^6 4s^0 (Ar)$ او Fe^{3+} کټیون د الکتروني جوړښت $3d^5 4s^0 (Ar)$ دي.

د d د فلزونو ډیر زیات بیلابیل کیمیاوي خواص کیدای شي چې دهغوی د d اوربیتالو فضايي جوړښت د سمت درلودلو پر بنسټ درک کړي؛ ځکه الکترونونه د d په بیلابیلو اوربیتالونو کې د الکترونونو د اټوم د هستې په چاپیریال فضا کې ټاکلۍ ځایونه ځانته غوره کوي چې د هغوی ترمنځ



د دفعي قوۍ ډیر کمه وي، د الکترونو اغیزه په d اوربیتالونو کې د s او p اوربیتالونو څخه ډیره کمه ده. د دوو الکترونونو اغیزه چې په عین اوربیتال کې شتون لري. د d د اوربیتالونو فاصله 20 ځله د p د اوربیتالونو تر منځ فاصلي څخه زیاته ده. لاندې شکلونه دا مطلب په ښه توګه توضیح کوي:




(1-2) شکل د دوو اوربیتالونو الکترونونو امکان لري په دې ناحیه کې موجود وي
(1-2) شکل د d دوه اوربیتالونو په لازمه فاصله یو له بل څخه فاصله لري او د هغوی په منځ کې متقابل عمل ډیر کمه دي، په داسې حال کې چې د p د اوربیتالونو الکترونونه سره نژدې دي او د هغوی په منځ کې متقابل اغیزه ډیره زیاته ده.

فعالیت



د انتقالي عنصرونو فوق العاده بیلایل فعالیتونه د دې عنصرونو پر کوم جوړښت پوري اړه لري؟
د نوموړو عنصرو دا جوړښت د دلیلونو پر بنسټ په خپل منځ کې په ګروپي شکل توضیح کړئ او هغه توکي ته وړاندې کړئ.



(2-2) شکل د انتقالي عنصرونو د اټومي شعاع بدلونونه په څلورم، پنځم او شپږم پېړیو د کې.



د انتقالی عنصرونو له مهمو ځانګړتیاوو څخه د هغوی تمایل د مختلفو پیچلو (کامپلکس) مرکبونو جوړول دي، دا عنصرونه بیلابیل او متحول اکسیدیشن نمبرونه لري. لاندې جدول د ځینو انتقالی عنصرونو د اکسیدیشن نمبر راښيي:

(2 - 12) جدول د انتقالی عنصرونو اکسیدیشن نمبر

Group Number													
III	IV	VB	VIB	VIIA	VIII				IB	IIB			
					Fe	Co	Ni	Cu					
Sc	Ti	V	Cr	Mn						Zn			
+3	+2	+1	+2	+2	+2	+1	+2	+1		+2			
	+3	+2	+3	+3	+3	+2	+3	+2					
	+4	+3	+6	+6	+6								
		+5		+7									
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag		Cd			
+3	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+2	+1		+2			
	+3	+3	+3	+3	+3	+2	+3	+2					
	+4	+4	+4	+4	+4	+3	+4	+3					
	+5	+5	+5	+5	+5	+4							
		+6	+6	+6	+6								
		+7		+7									
					+8								
La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au		Hg			
+3	+3	+2	+2	+3	+2	+2	+2			+1			
	+4	+3	+3	+4	+3	+3	+3	+3					
		+5	+5	+5	+5	+4	+4						
		+6		+7									
					+8								

د اړوډ پير، يوه نو تر منځ عنصرونه متحول اکسيډيسن نمبرونه لري، چې له 1+ + 8+ پورې دي. د ډيلاکي په ډول: منگان د اکسيډيسن پياليل نمبرونه لري او همدا رنگه د پالين فرعي گروپ لري، ډيلاکي په ډول: Pt او Ir ، Os ، Pd (Ru ، Rh) عنصرونه. هغه پيرود چې d د عنصرونو د اکسيډيسن درجه يې لوړه وي، د هغه د ايون اکسيډي کوونکي لور تيا هم لويه ده؛ د Mn 7+ د اکسيډيسن نمبر په درلودلو سره ډير قوي اکسيډي کوونکي دي.



d عنصرونه ديياليلو اڪسيديشن نمبر په درلر دلو سرو بيلاليل اڪسيادونه جو رول شي ، كه چيري ددي عنصر ونود اڪسيديشن نمبر په اڪسيادونو كي ڦير ٿيتي وي ، اڪسياد بي دالقلي خاصيت لري ، كه دنو موږو عنصر ونو د اڪسيديشن نمبر منڃني ٻڻه ولري ، اړونده اڪسياد بي امفو ترڪي خاصيت او كه د اڪسيديشن نمبر بي ڦير لوږ وي ، اڪسياد بي تيزابي خاصيت ځانته غوره كوي ؛ دييلگي په ډول : ډگروميم دفرعي گروپ عنصر ونه پورتي خواصونه ځانته غوره كوي .

د کرومیم د اکسیدیشن نمبر په CrO کې 2، په Cr_2O_3 کې 3، او په CrO_3 کې 6 + دی، نو اکسایډونه یې په ترتیب سره القلي، امفوتریک او تیزابي خاصیتونه لري. d عنصرونه چې د جدول کښې خوا ته ځای لري د s د ګروپ له عنصرونو سره شباهت لري، ځینې د هغوی د زیاتې الکتروپوزیتیو لرونکي دي، دا عنصرونه زیات مرکبونه جوړولی شي او د هغو د کانونو څخه ایستل ګران کار دي.

لوهری فعالیت

لاندې سوالونو ته په ګروپي شکل په خپل منځ کې له بحث نه وروسته په ټولګي کې د ګروپ د نماینده په واسطه ځواب ورکړئ.

- 1- ولې د اوسپنې اټوم خپل د $4s$ د اوربیتالونو الکترونونه د $3d$ په نسبت لوهری له لاسه ورکوي؟ سره له دې چې د s اوربیتال د $3d$ اوربیتالونو په نسبت د انرژي په ټیټه سطحه کې ځای لري.
- 2- د d د عنصرونو بیلابیل خواص څرنگه کولای شي چې روښانه کړئ؟ په دې اړه په ګروپي شکل بحث وکړئ او د ګروپ نماینده په واسطه د سوالونو ځوابونه په ټولګي کې له قانع کوونکو دلیلونو سره وړاندې کړي.

دوهم فعالیت

MnO_2 ، MnO_3 ، Mn_2O_7 او MnO اکسایډونه د هغو د اکسیدیشن خواصو د زیاتوالي پر بنسټ په جدول کې ترتیب کړئ او د دلیلونو پر بنسټ د منګان د مرکبونو دا خاصیت توضیح کړئ.





د څپرکي لنډيز

- کيميا پوهانو کوشش وکړ چې د خپل وخت کشف شوي عنصرونه په يو واحد جدول کې داسې ترتيب کړي چې د هغوی د يو د خواصو په پوهېدلو د هغوی دځيني نورو په خواصو هم پوه شي.

- په (1865) کال کې انگلیسی کیمیا پوه نیولیندر (Newlands) د خپل وخت کشف شوي عنصرونه د هغوی د نسبتي اټومي کتلې د پرله پسې زیاتوالي پرنسټ په افقي قطارونو کې ترتیب کړی.

- په 1869 کال روسی عالم منلیف (D.M. Mendler) د خپل وخت کشف شوي عنصرونه د هغوی د نسبتي اټومي کتلې د پرله پسې زیاتوالي پرنسټ په افقي (Period) قطارونو کې ترتیب او په عمودي ستونزو کې ځای پر ځای کړل ، نوموړي خپل ترتیب شوی جوړښت د عنصرونو د پیرویډیک سیستم په نوم یاد کړ.

- د عنصرونو خواص او په پیرویډونو کې د هغوی د پرله پسې بدلون ، د هغوی له نسبتي اټومي کتلې سره سمون لري او د هغوی ځای په پیرویډونو کې ټاکي.

- په پیرویډونو کې د عنصرونو شمیر د نجیبه گازونو د اټومي نمبر د توپیر او یا د لاندې فورمولونو پرنسټ لاس ته راتلای شي:

$$\frac{(n+1)^2}{2} = \text{په طاقتو پیرویډو کې د عنصرونو شمیر}$$

$$\frac{(n+2)^2}{2} = \text{په جفتو پیرویډو کې د عنصرونو شمیر}$$

- **د ایونایزیشن انرژي:** له هغې انرژي څخه عبارت ده چې د یو الکترون د لرې کولو لپاره د یو اټوم - گرام څخه لایتېهای فضا ته ضرورت ده .

- د گرویونو په حدودو کې د ایونایزیشن انرژي له پورته څخه ښکته خواته کمه او برعکس له ښکته څخه پورتنی خواته زیاتېږي.

- د پیرویډونو په حدودو کې د ایونایزیشن انرژي د اټومي نمبر د زیاتوالي پرنسټ زیاتېږي؛ ځکه په پیرویډونو کې د اټومي نمبر د زیاتوالي سره قشرونه نه زیاتېږي؛ خو د هستې چارج زیاتېږي چې الکترونونه ځان ته کش کوي او خپل چاپیریال کې یې راټول او متراکم کوي ، په پایله کې د اټوم شعاع او حجم کوچنی کیږي ، د هستې د مثبت چارج اغیزه په الکترونونو باندې زیاتېږي او الکترونونه خپل ځانته کش کوي.

- که چیرې یو الکترون یو اټوم ته ورزیات شي ، ترڅو چې په منفي ایون (Anion) تبدیل شي ، نور زیات



شوي الکټرون د هستې د قوې په واسطه جذب او د هغه انرژي په ټاکلي اندازه ازادېږي ، همدا انرژي دالکټرون غوښتلو د انرژي (*Electron Affinity*) په نوم یادېږي.

- د یو پیړیو په چاپېریال کې د عنصرونو الکټروپوزیتیټي د کینې خوا ته ښي خوا ته کمېږي ، برعکس د ښي خوا ته کینې خوا ته زیاتیږي ، نو د دې څخه معلومېږي چې د عنصرونو *EN* له اتومي شعاع سره معکوسه اړیکه لري ، نو فلورین د ټولو عنصرونو ډیر الکټرونیګاتیف عنصر او *CS* او *Fr* طبیعت ډیر الکټروپوزیتیف عنصرونه دي.

- د عنصرونو اتومي شعاع د اټوم د هستې او د اټوم د باندې قشروروستي الکټرون ترمنځ فاصله ده چې د اټوم د هندسې پارامترونو څخه ده .

- د یو ګروپ په چاپېریال کې اتومي شعاع له پورتنۍ برخې څخه ښکتنی خوا ته لویه کېږي او برعکس له ښکتنۍ برخې څخه پورتنۍ خوا ته په پرله پسې ډول کوچنی کېږي.
- د پیړیودونو په چاپېریال کې د عنصرونو اتومي شعاع له کینې خوا څخه ښي خوا ته کوچنی او برعکس د ښي خوا څخه کینې خوا ته په پرله پسې ډول لویږي.
- *d* عنصرونه چې د جدول کینې خوا ته ځای لري ، د *s* ګروپ له عنصرونو سره یو شان خواص لري چې ځینې یې زیات الکټروپوزیتیف دي، ددې عنصرونو مرکونه هم زیات دي او د هغه را ایستل د کانونو څخه ستونزمن دي. د *d* ټول عنصرونه فلزي خاصیت لري او د بریښنا هادي دي . سینن زر په عادي شرایطو کې د بریښنا لومړۍ درجه هادي دی. دا فلزونه ځایلا لري او د خټک خوړلو وړ تیا هم لري چې په نړیو پالو تبدیلیدلای شي او له هغوی څخه سیمونه هم جوړېږي.

د څیرکي پوښتنې انتخابي پوښتنې:

- 1- هغه عنصر چې په څلورم پیړیو د او څلورم ګروپ کې ځای لري، د کومو لاندینو اتومي نمبر لرونکی دي ؟

الف - 31	ب - 32	ج - 33	د - 14
----------	--------	--------	--------
- 2- کوم لاندې اتومي نمبر پر هغه عنصر پورې اړه لري کوم چې د ډیورو الکټرونونو لرونکی دی ؟

الف - 13	ب - 14	ج - 10	د - 19
----------	--------	--------	--------
- 3- د تناروب د قانون سمه توضیح داده ، هر کله چې عنصرونه د زیاتوالي پرنسټ تنظیم شي ، د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص په متناوب ډول ؟

الف - اتومي کتله - تکرارېږي	ب - اتومي کتله - بدلون مومي
ج - اتومي نمبر - تکرارېږي	د - د اتومي نمبر - بدلون مومي
- 4- منلیف د عنصرونو د دوره یي جدول په تنظیم کې دوه اصولونه پام اړولي دي :

د عنصرونو ځای په ځای کیږي د پیل پرله پسې زیاتوالي د هغوی په هر پیړیو کې

..... يي يو له بل په څنگ او دعنصرونو د کيميايي خواصو ورته والي په پام کې نيول او په

هر.....

الف- اتومي کتله - گروپونه - پيريودونه ، ب- د اتوم کتله - دوره - گروپ

ج- اتومي نمبر - پيريود - گروپ ، د اتومي نمبر - گروپ - پيريود

ک- کوم يو د لاندې مواردو څخه د منډليف ابتکار نه دي؟

الف- د ځينو ډيرو درندو عنصرو ځای پر ځای کيدل مخکې له سپکو عنصرونو څخه

ب- په جدول کې د ځينو تشو ځايونو پريښودل

ج- د عنصرونو وېشل په فلزونو او غير فلزونو

د- د نه پېژندل شویو عنصرونو د خواصو وړاندوینه

6 - د منډليف د جدول په پيريود کې شامل عنصرونه د لاندې کومو ځانگړتياوې له مخې يو بل ته سره ورته دی.

الف- دلوړ اکسيدېشن نمبر ، ب- د ولاسي قشر الکتروني جوړښت

ج- د الکترونونو په واسطه د نيول شویو الکتروني سويو شمير ، د- د اصلي الکتروني سويو شمير

7 - د يو عنصر اتومي نمبر 21 دی، نوموړی عنصر ځای په ټاکلي پيريود او گروپ کې په لاندې ډول دی:

الف- دريم اصلي گروپ او څلور پيريود ، ب- دريم فرعي گروپ او څلورم پيريود

ج- لومړی اصلي گروپ د- دوهم اصلي گروپ او څلورم پيريود

8 - د يو عنصر د وروستي الکتروني قشر جوړښت $3d^2 4s^1$ دی، نوموړی عنصر په کوم پيريود کې ځای لري.

الف- دريم پيريود، ب- دويم پيريود ، ج- شپږم پيريود ، د- څلورم پيريود.

9 - د لاندې کوم عنصر اتومي شعاع لويه ده.

الف- سترانشيم ب- المونيم ج- روبېدیم د- سلفر.

10 - اکټينايدونه د منډليف د جدول په کومه حجرو کې ځای لري.

الف- 64 نمبر حجره ب- 57 نمبر حجره

ج- 89 نمبر حجره د- 72 نمبر حجره

11 - په دوره يي جدول کې د يو عنصر پر موقعيت پوهيدل، کوم مطلبونه د عنصرونو په اړه په دقيق ډول په واک کې ورکوي.


الف- کيمياوي خواص ، ب- فزيکي خواص

ج- الف او ب دواړه د- هېڅ يو.



تشریحي پوښتني

1. ولې د منډلیف جدول د پیرویونک جدول په نوم یادوي؟
2. د منډلیف قانون د منډلیف د جدول په اړه ولیکئ.
3. د منډلیف په جدول کې ډیر اوږد پیرویو او ډیر لنډ پیرویو د کوم دي؟ معلومات ورکړئ.
4. د M عنصر په لومړي اصلي گروپ او شپږم پیرویو کې ځای لري د هغې الکتروني جوړښت ولیکئ.
5. ولې د عین گروپ عنصرونه د یوشان خواصو لرونکي دي؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ. د عنصرونو دوره یي جدول د څو گروپونو او څو پیرویونو جوړشوي دي؟
6. د فلزي عنصرونو شمیر زیات دي او یا دا چې د غیر فلزي عنصرونو شمیر زیات دی؟
7. د ایونایزیشن انرژي څه شي او د هغه تناوب د منډلیف په جدول کې په څه ډول دی؟
8. اتومي شعاع څه شي دي؟ د هغې متناوب بدلون د منډلیف په جدول کې په څه ډول دي؟
9. د عنصرونو الکترون غوښتل او د هغې تناوب د منډلیف په جدول کې څه ډول دي؟
10. د منډلیف په جدول کې د عنصرونو ترتیب او تنظیم، فلزي او غیر فلزي خواصو له مخې په څه ډول دي؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.



کیمیاوي اړیکې Chemical Bonds


ایا کله هم دي مطلب ته متوجی شوي ېې ، چې ولې د موادو کوچنی ذرې سره تړل او لوی جسمونه تشکیلوي ؟ مالیکولونه څرنگه تشکیلېږي ؟ مواد څرنگه او د کومې قوۀ په واسطه یو په بل کې حل شوي دي ؟ په همدې ترتیب اړیکه څه شي ده ؟

کوم قوۀ یو بل سره د ذرو د وصل کیدو لامل ګرځي ؟ د اړیکو ډولونه کوم دي ؟ ولې د موادو د انومونو په منځ کې اړیکه تشکیلېږي ؟ د اړیکو د تشکیل لاره په څه ډول ده ؟ په دې څپرکي د اړیکو د ځانګړتیاوي په اړه ، د اړیکو د جوړېدو لاره ، د اړیکو ډولونه او د اړیکو د نورو خصوصیاتو په اړه معلومات وړاندې شوي او د موادو ټول فعل او انفعال چې د اړیکو د جوړېدو لامل ګرځي ، توضیح شوي دي.



د یو مالیکول د اټومونو په منځ کې د جاذبې قوه د کیمیاوي اړیکو (Chemical Bond) په نوم یادېږي . د خړ اټومونو لرونکو موادو شتون دا واقعیت څرگند کړ چې اټومونه یو په بل اغېزه اچوي ، مرکبونه منځ ته راوړي چې د هغوی د اټومونو په نسبت د ټیټې انرژیکې سطحې لرونکي دي ، که چېرې د انرژي د مقاومت اندازه د اړوند اټومونو او مالیکولونو په منځ کې $10 \text{ Calory} / \text{mol}$ اوسی ، اړیکه تشکیلېږي .

د کوانټ د تیوري له رامنځته کېلو څخه د معده د کیمیاوي اړیکو د تشکیل په اړه د لیویس نظریې حکم درلود. په 1916م کال د لیویس (*Lewis*) په نوم عالم د کیمیاوي اړیکو د جوړیدو نظریې ته انکشاف ورکړ چې له دې نظریې سره سم ((کیمیاوي اړیکه)) د دوو اتومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو د شریکو ایښودلو په پایله کې جوړېږي. دلته هر یو د اتومونو یو، یو الکترون یو له بل سره شریک وي چې دا ډول اړیکه د کوولانت اړیکې په نوم یادېږي، د لاندې اتومونو ترمنځ اړیکې په CH_4 ، NH_3 ، F_2 ، H_2 مالیکولونو کې وړاندې شوي دي چې د عنصرونو د اتومونو الکترونونه په





د مرکبو مالیکولز لږ په جوړښت کې د اتومونو تر منځ د اړیکو د جوړیدو په پایله کې اتومونه او مالیکولونه باثبات الکتروني جوړښت تر لاسه کوي او خپل باندني قشر 2 او 8 الکټرونونو ته رسوي.

د اوکټیت قاعده یا اته ییزه قاعده

يو له بل سره د اتومونو د جوړولو اړيکو شمير ، د هغوي د باندني قشر ډک کيدلو لامل په اتو
الکترونو په واسطه کيږي .

په پیل کې لیریس د اټومونو د اړیکو د جوړېدو د خړنگوالي د بنسټونو لپاره د اوکټیت د قاعدې پر بنسټ د هر اټوم ولانسی الکټرونونه یې د هر مکعب په راس کې خیال کاوه، د اټوم هسته د هغه په مرکز کې ځای لري او تر هغه وخته پورې چې د مکعب په دې راسونو کې الکټرونونه ځای و نه نیسي، هغه اټوم کولای شي چې اړیکه جوړه کړي. دا شکلونه په لاندي ډول دي:




(1 - 3) شکل د لیریس جوړښت

۲-۳ : د اوکټیت قانون او د لیریس جوړښت

د اټومونو او مالیکولونو د بنسټولو لاره چې په کې د ولانسی قشر الکټرونونه د ټکي او د اړیکې د شریکو الکټرونونو جوړی د ټکو او یا خطونو (-) به واسطه ښودل کېږي کوم چې د دوو اټومونو په منځ کې ځای لري، د ټکو د جوړښت او یا د لیریس د ساختمان په نوم یادېږي.

۲-۱: د الکتروني جوړښت د ټاکلو لاره - د مالیکولي ټکی :
الف - د امتحان او تیروتنې لاره
 په دې ټک لاره کې د هر اټوم طاقه الکترونونه د اړیکو د جوړونکو نقطه یي الکتروني جوړښت د دواړو اټومونو د سمبولونو په منځ کې لیکل کېږي ؛ د بیلګې په ډول:



(3-2) شکل نقطه یي الکتروني جوړښت

ب- سیستماتیکه لاره :

په دې لاره کې د الکترونونو سرچېنه په پام کې نه ده نیولې شوی؛ بلکې په اټومونو کې د الکترونونو دوشلو څرنگوالي په پام کې نیول شوي دي ، د دې لارې روش د CO_3^{2-} ایزونونو او NO_2 مالیکولونو لپاره په لاندې ډول دی :


لومړۍ پړاو: د ولانسي الکترونونو مجموعي محاسبه او د ساده اړیکو جوړیدل

د ټولسو ولانسي الکترونونو مجموعه په یوه مالیکول (NV) لاسته راوړي او د اټومونو ځای په مالیکول کې ټیټیږي. د دوه اټومونو په منځ کې یوه جوړه الکترونونه د ساده اړیکې په توګه ځای په ځای کوي ، د هرې اړیکې لامل دوه ولانسي الکترونونه له هر مالیکول څخه کمېږي ، د ایزونونو په اړه د منفي چارجونو شمیر په (N) باندې زیات او د مثبت چارج شمیر کمېږي، د عنصرونو ډیر زیات اټومونه چې د هغوی شمیر په مالیکول کې لږ دي، په مرکز کې ځای په ځای کېږي او د نورو عنصرونو اټومونه د هغوی په شاوخوا کې په مالیکولونو کې د دوو اټومونو تر منځ لومړنۍ اړیکه د سګما (σ) د اړیکې ډول ده او دوهمه اړیکه یې د پای (π) د اړیکې په نوم یادوي.





$$N(v) = 4e^- \text{ لپاره } C + 3 \cdot 6e^- (O) + 2e^- (\text{cation})$$

$$N(v) = 24e^-$$



دو همه پړاو: د پاتي الکترونونو توزیع د اوکټیت د قاعدې پر بنسټ

پاتي ولاسي الکترونونه په اټومونو باندې داسې ویشل کېږي چې د هر اټوم اوکټیت د هغه پر بنسټ تکمیل شي. لومړی د عنصرونو د هغو اټومونو اوکټیت پیدا کوو چې د لږو اړیکو لرونکي او د الکټرونیکایف عنصرونو له ډلې څخه وي:



(3-3) شکل په مالیکولونو کې الکټروني جوړښت

دریمه پړاو: د پای (π) د اړیکو جوړښت او د اکسیدیشن د نمبر محاسبه

که چېسری د مرکب په مالیکول کې د عنصرونو د اټومونو اوکټیت تکمیل شوي نه وي، د نږدی اټوم آزاد جوړه الکټرونونه داسې ځای پر ځای کېږي چې د دوی په منځ کې شریک واقع شي او

د پای (π) اړیکه تشکیل کړي، پردې بنسټ په مالیکول کې د هر اټوم د اکسیدیشن نمبر په لاندې ډول محاسبه کېږي:

(د اړیکو شمیر اټومونو تر منځ) = (د ازاو الکټرونونو شمیر) - (محکمې له اړیکې څخه د ولاسي الکټرونونو شمیر) دگروپ نمبر = د اټوم د اکسیدیشن نمبر


په دې بنسټ د مرکب د مالیکول د تشکیل کورنکو عنصرونو د اټومونو د اکسیدیشن نمبرونو الجبري مجموعه له صفر سره مساوي ده او په ایونونو کې د هغوی له چارج سره مساوي وی.

زیاتي معلومات!



ممکن ځینې د اټومونو (لکه نایټروجن په NO_2 کې) خپل اوکسیت بې نه وي، پوره کړي او دا یوه استثنا ده چې د NO_2 په مالیکول کې لیدل کېږي؛ په دې مالیکول کې د الکټرون د طاق والي په خاطر د ولاسي الکټرونونو په مجموعه کې د اټوم د اوکسیت د پوره کیدو لپاره هېڅ امکان دی.

د لیویس مفکوره ځینې رېښتیاوې د اړیکو په هکله وړاندې کوي، خو د اړیکو د تشکیل لامل یې نه شو روښانه کوی. د کووانټ میخانیک د نظریاتو له پراختیا سره سم د اړیکو د جوړېدو لامل روښانه شو: که چېرې الکټرون د دوه اټومونه الکټرونو وریځې د حالت لرونکي وي، نو د داسې اړیکو جوړېدل د جوړه الکټرونونو په واسطه د الکټروني وریځې د ننوتلو په پایله کې خیال کېدای شي:



(3- 4) شکل د دوو اټومو تر منځ د کیمیاوي اړیکو د تشکیل بڼه او د $S-S$ د الکټروني وریځې ننوتل

خړنگه چې په (3-4) شکل کې لیدل کېږي ، د الکتروني وریخي کثافت د هایدروجن د اتومونو د دوو هستو په منځ کې د هغوی په مالیکول کې زیات دي، لامل یې دا دي چې دا ساحه زیاته د هستو تر اغیزې لاندې ده او الکترونونه د دې دوو هستو په واسطه کش شوي او په دې ځای کې راټول شوي دي ، له دې ځایه ویلي شو، هغه قوه چې د کیمیاوي اړیکو د جوړېدو لامل ګرځېدلي ده ، د الکترو ستاتيکي خاصیت لرونکي ده.

د لیویس نظریات د دوو الکترونونو د شریک والي په اړه په اړیکه کې د میخانیک له نظره یو عمومي مفهوم دي، د پاولي د پرنسپ ېر بنسټ دا دواړه الکترونونه باید د یو کوانتوم نمبر په واسطه توپیر ولري . (د هغه د سپین نمبر) د هایدروجن د اتوم د سپین $Spin$ جهته یو له بل مخالف دي ، هغه لاره چې په هغه کې د دوو اتومونو په منځ کې الکترونونه په شریک ډول اېښودل کېږي او د اړیکې د جوړېدو لامل ګرځي د کیمیاوي اړیکو د ولانسي میتود (MTB) په نوم یادېږي په عمومي ډول کیمیاوي اړیکه د $(-)$ په واسطه ښودل کېږي ، د دې خط په سروني کې د یو ، یو الکترون خیال کېږي .

۳-۲-۲: ولانس $Valance$

ولانس د عنصرونو د اتومونو یو ډول خاصیت دي چې د نورو اتومونو یو ټاکلې شمیر ښلوي او یا یې تعویضوي یا په بل عبارت د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدلو قوه په تعاملونو کې د هماغه عنصر د اتوم د ولانس په نوم یادېږي.

د ولانس کلمه د لاتین اصطلاح ($Valantia$) څخه اخیستل شوې ده چې د ظرفیت معني ورکوي.

کوسیل ($Kossel$) په خپله لومړۍ علمي مقاله کې توضیح کړل چې اړیکې د الکترونونو د بشپړ انتقال د یو اتوم څخه بل اتوم ته په پایله کې تشکیلېږي چې د عنصرونو د اتومونو د باندني قشر د الکترونونو شمیراتو الکترونونو ته ورسیږي ، د هر اتوم اخیستل شوي او یا ورکړي شوي الکترونونه د هغه ولانس ټاکي.

۳-۳-۳: د کیمیاوي اړیکو ډولونه

۳-۳-۱: ایوني اړیکه: ($Electro Volant Bond$)

د اتوم د جوړښت مطالعه په خاص ډول د اتوم الکتروني جوړښت ښیي چې د ns^2np^6 جوړښت ، د نجیو گازونو له الکتروني جوړښت سره سمون لري ، دا گازونه عبارت له He ($1s^2$) ، Ne ($2s^2$) ، Ar ، Kr ، Xe ، Rn دي، د خپرونو په واسطه لاس ته راغله چې نوموړی گازونه په کیمیاوي تعاملونو کې برخه نه اخلي او یا ثباته دي. د نجیو گازونو ثبات د هغو د باندني قشر مشبوع کېدل د اتو الکترونو په واسطه دي.


په 1916م کال د فزیک پوهانو هریر کوسیل ($Kossel$) او لیویس ($Lives$) د خپل ځان سره د

کیمیاوي اړیکو تیوري وړاندې کړه، هغوی د کیمیاوي اړیکو تشکیل هماغه د اتومونو د الکترونونو بایلل اویا اخیستل اود وروستي مدار د اتو الکترونو پوره کیدل ويلي چې تر څو اړونده ثبات حاصل کړي.


په پیريودیک سیستم کې د عنصرونو تسلسل چې له نیون (Ne) څخه پیل شوي، گورو چې په قوس کې د عنصرونو د M او L, K د قشرونو الکترونونو شمیر ښودل شوي دي:



د Na اټوم کولای شي چې د یو الکترون د بیللو په پایله کې د Ne د نجیبه گاز الکتروني جوړښت ځانته غوره کړي او با ثباته الکتروني جوړښت حاصل کړي:



د سودیم په اټوم کې د 10 الکترونونو او 11 پروتونونو شتون د دې لامل گرځیدلي دي چې سودیم مثبت چارج ولري او په چارج لرونکي ذره Na^+ تبدیل شوي چې د کټیون (Cation) په نوم یادېږي.



هغه ذره چې د 10 الکترونو او 9 پروتونو څخه جوړه شوي ده د F^- د منفي چارج لرونکي ايون څخه عبارت ده، د (Na^+) مثبت چارج لرونکي ذرې او د (F^-) د منفي ايون د درو تر منځ الکتروستاتيکي جاذبي قوه عمل کوي او د دې جذب په پایله کې کیمیاوي اړیکه تشکیلېږي.

دا ډول اړیکه د ایزني یا برقي اړیکې (Electro Valente Bond) په نوم یادېږي.




ایوني اړیکه د کیمیاوي اړیکې یو ډول ده چې الکتروستاتيکي قوه د جذب په پایله کې د مخالف علامه چارج لرونکو ذرو په منځ کې جوړېږي.

په کووالنسي اړیکو کې ایوني خاصیت :

قطبي انستراکي اړیکه د پوره انستراکي (غیر قطبي) او ایزني اړیکې تر منځ سرحد تشکیلوي ؛ ځکه په دې اړیکه کې الکتروني ورځ لږ څه له یو اټوم څخه بل اټوم ته تیرېږي، که چېرې الکترونونه په پوره ډول له یو ايون څخه بل ايون ته ولېږل شي، ایوني اړیکه جوړېږي، د ایوني او انستراکي اړیکې د توپیر ځانګړتیاوي په لاندې ډول دي :

الف- په هره اندازه چې د عنصرونو د اتومونو تر منځ د الکترونیګاتیویتی توپیر زیات وي ، په هماغه اندازه د هغوی په منځ کې اړیکه قطبي ده ، لاندې گراف د ایوني اړیکې د خاصیت سلنه او د الکترونیګاتیویتی توپیر ښیي:





(5-3) شکل د آیوني اړیکې د خاصیت د سټی اوډ الکټرونېګاټیویتی توپیر اړوند گراف

د پورتنۍ گراف پر بنسټ ولې شو چې د دوو اټومونو په منځ کې اړیکه هغه وخت برقي یا الکټروو لانسټ ده چې د دوو اټومونو تر منځ د

الکټرونېګاټیویتی توپیر (1.7) او د هغه څخه پورته وي. آیوني مرکبونه او یا الکټروو لانسټ مرکبونه له اټومونو څخه تشکیل شوي، که چېرې د دوو اټومونو تر منځ الکټرونېګاټیویتی توپیر له I څخه تر (1.7) پورې وي ، د هغوي تر منځ اړیکه 50% آیوني او 50% قطبي اشنراکي ده .

ایوني مرکبونه او دهغوی خواص

مرکبونه چې د الکټروني اړیکې لرونکي وي ، کرستلونه تشکیلوي . ایا د خورو د مالګې په اړه معلومات لري؟ پوهیږئ چې د خورو مالګه له کومو عنصرونو څخه تشکیل شوي ده؟ د خورو مالګه له سوډیم کلوراید څخه عبارت ده ، چې په نړۍ کې موندل کېږي او فورمول یې $NaCl$ دی .


دا فورمول ښکاره کوي چې د خورو مالګه دسوډیم او کلورین له عنصرونو څخه جوړه شویده . سوډیم نرم او فعاله کیمیاوي فلز دی او کلورین گازی عنصر دی ، د دې دوه عنصرونو د تعامل په پایله کې له لاندې شکل سره سم د خورو مالګه تشکیلېږي چې د سپین رنگ لرونکي ده :




(3-6) شکل د کلورین د گاز تعامل له سوډیم سره

تولې مالګې د خورو له مالګې په شان آیوني مرکبونه او له مثبتو او منفي اټومونو څخه تشکیل شوي دي ، د سوډیم کلوراید په مالیکول کې د سوډیم او کلورین د اټومونو تر منځ آیوني اړیکه شتون لري ، څرنگه چې د سوډیم اټوم د یو الکټرون له لاسه ورکولو سره یو مثبت چارج او د کلورین اټوم د یو

الکترون په اخیستلو سره یو منفي چارج ځانته غوره کوي، دوي د الکتروستاتيکي قواو پرنستې یو بل جذبوي او د سودیم کلوراید مالیکول تشکیلوي. د خوړو مالګې خواص د همدې اړیکې په ماهیت پورې اړه لري. د خوړو د مالګې مکعبی بلورونه کلک او ماتیدونکي دي او په 801°C تودوخه کې ویلي کېږي او په 1413°C تودوخه کې په ایشیدو راځي، سودیم کلوراید مالګه په اوبو کې حل کېږي، د محلول او یا په ویلي شوي حالت د بریښنا تېرودونکې ده.




(3- 7) شکل د سودیم کلوراید د جوړیدو په وخت کې د الکترونونو د انتقال د سودیم کلوراید خواص د هغې په جوړونکو ذرو پورې اړه لري، په سودیم کلوراید کې د سودیم او کلورین ترمنځ د جاذبې قوي قوه شتون لري چې دوی یې یو له بل سره ټیټر کلک کړي دي او دا قوه د ایوني اړیکې په نوم یادوي، دا اړیکه په ټولو مالګو کې شته ده، دا ډول اړیکه یوازې د سودیم په یو کټیون او د کلورین په یو انیون پورې اړه نه لري؛ بلکې د ټولو خنګ تر خنګ انیونونو او کټیونونو ترمنځ جوړه شوې او د ذرو نظم یې منځ ته راوړی دي، هریو کټیون د خوړو انیونونو او یو انیون د خوړو کټیونونو په واسطه چاپیریږي. لاندې شکلونه وګورئ:



(3- 8) شکل د خوړو د مالګې په یو کرسټال کې د ایونونو جوړښت

پورتني شکل ښکاره کوي چې د سوديم هر ايون د کلورين د شپږو ايونونو په واسطه او د کلورين هر ايون د سوديم د شپږو ايونو په واسطه چاپير شوي دي او د ذرو نظم يې منځ ته راوړي دي. د کولمب د قانونو پر بنسټ د يو ډول چارجونو لرونکو ذرې يو بل دفعه او د مخالف ډول چارجونو لرونکو ذرې يو بل جذبي، د مخالف علامه چارج لرونکو ذرو تر منځ د جذب قوه د يو ډول علامه لرونکو د ذرو د دفع قواوې څخه زياته ده. په ايزوني مرکبونو کې د مثبتو او منفي چارجونو شمير يو له بل سره مساوي دي. نو له دې کبله دا ډول مرکبونه د برېښنايي چارج له کبله خنثي دي.

د ايزوني مرکبونو وړلي شوي بڼه يا اوبلن محلول يې د برېښنا هادي دي، ځکه په دې مرکبونو کې ايزونونه په ازادانه ډول حرکت کولای شي؛ خو په جامد حالت کې دا مرکبونه د برېښنا هادي نه دي؛ ځکه د مالګې ايزونونه په جامد حالت کې يوازې اهتزازي حرکت لري، خو نور حرکتونه نه لري. که د خوړو د مالګې خو بلوره په اوبو کې و اچول شي، د مالګې ايزونونه د اوبو د ماليکولونو په منځ کې خپرېږي او ازادانه حرکت کوي، د برېښنا بهير د ځانه تيري، لاندې شکل وگورئ:



(3- 9) شکل د برېښنا بهير د خوړو د مالګې په محلول کې

زيات زده کړئ:

ايونونه په مالګو کې د منظم تنظيم او جوړښت لرونکي دي. په کرسټالونو کې د ايونونو جوړېدل په مسلسل شکل دي او هر ايون د خپل چارج د مخالفو ايونونو په واسطه احاطه شوي چې نظم يې رامنځته کړي او اړيکې يې جوړې کړي دي. دايونونو تنظيمي جوړښت په کرسټلي شبکه کې د ايونونو او کټيونونو د نسبي جسامت له ترتيب څخه پيروي کوي او د ترتيب د کرسټالونو په ټولو برخو کې تکرارېږي. هغه جوړښت چې د جوړونکو ذرو د رټولېدو په اغيزه (کټيونونه او انيونونه) يو جسم د درې بعدي بڼې سره منځ ته راوړي، د بلوري شبکې په نوم ياديږي، (3- 8) شکل وگورئ.

د کرسټالي شبکو جوړیدل له انرژي د ازادیدلو سره یوځای دي .

د کرسټالي شبکې انرژي له هغه اندازې انرژي څخه عبارت ده چې له مثبت او منفي گازي ایونونو څخه د یو بلې کرسټلي مادې د جوړیدو په وخت کې د هغو څخه ازادیږي؛ دیلگي په ډول:



لاندې جدول د ځینو موادو د کرسټالي شبکو انرژي په kJ/mol کېږي:

(3 - 1) جدول د القلي فلزونو د هالیدونو د کرسټلونو د شبکو انرژي

آیونونه کتیونونه	F^-	Cl^-	Br^-	I^-
Li^+	1036	853	807	757
Na^+	923	787	747	704
K^+	821	715	682	649
Rb^+	785	689	660	630
Cr^+	740	659	631	604

(3 - 2) جدول د $2+$ او $3+$ چارج لرونکو مرکبونو د شبکې د انرژي برتنه

آیون کتیون	F^-	O^{2-}
Na^+	923	2481
Mg^{2+}	2957	3791
Al^{3+}	5492	15916






فعاليت

1 او 2) جدول ته په څير سره وگورئ،

الف - ستاسې په نظر لاندې کومې پايلې اخيستنې د کرسټالي شبکې د انرژي په اړه سمې دي ؟ اورلي ؟

- 1- هر خوځومره چې کټيوزنه کوچني وي ، د هغوی د کرسټالي شبکې انرژي ډېره ده.
- 2- هر خوځومره چې د انيون چارج لوی وي . د شبکې انرژي کمه ده.
- 3- هر خوځومره چې د انيونونو شعاع لويه وي، د شبکې انرژي زياته ده.
- 4- د شبکې انرژي د کټيوزنونو د چارج سره نېغ پر نېغ اړيکه او د هغې د شعاع سره معکوسه اړيکه لري .

ب- وړاندوينه وکړي چې لاندې کومو ايوني مرکبونو شبکې انرژي زياته ده ؟



خړنگه چې د ايوني مرکبونو د ذرو تر منځ د جذب قوه قوي ده، د همدې کبله د هغوی خواص سره ورته دي؛ د بيلگې په ډول: د هغوی د وييلې کيدو او ايشيد درجې سره ورته دي. لاندې جدول وگورئ:

(3 - 3) جدول د وييلې کيدو او ايشيدو درجه سره ورته

ايوني مرکب	د وييلې کيدونکي $^{\circ}C$	د ايشيدونکي $^{\circ}C$
$NaCl$	801	1413
$RbCl$	715	1390
KF	858	1505
KBr	734	1435

ج- اټاکيدای شي چې دشبکې د انرژي او د ايوني مرکبونو د وييلې کيدودرچې ترمنځ اړيکه پام کې ونېول شي.

۳-۲. اشتراکي اړيکه (Covalent Bond)

د کوولانت اړيکو تيوري: ايوني اړيکه د کيمياوي اړيکو يوازني شکل نه دي، په ماليکولونو کې بيلابيلې اړيکې شته دي؛ د بيلگې په ډول: د Cl_2 په ماليکول کې خاصه اړيکه موجود ده چې په دې اړه ليريس پيشهاد کړي: د کلورين هريو اتوم خپل د بانديني قشريو الکترون په خپل منځونو کې په شريک ډول ردي ، د اوربیتالونو د ننوتلو په غرض له کلورين د اتومونو څخه هريو د



امکان تر حمله یو بل سره نژدې کېږي او د شریکو الکترونونو جوړه د کوولانت اړیکه ټینګه کیږي، دا الکترونونه یوازې یو اوربیتال نیسي چې (Spin) یې مخالف سمت دي. لاندې شکل وګورئ:



(3- 10) شکل د کلورین په مالیکول کې د کیمیاوي اړیکو د وړاندې کولو لاره

د ولانسی اړیکو په میتود کې اټومي اوربیتالونو ننوتل کېږي او د جوړه الکترونونو یو ځای کېدل ترسره کېږي. نوموړي میتود مالیکول توصیف د ولانسی اړیکو د میتود په نوم یادېږي پر اټوم خپل کرکټر په مالیکول کې ساتي؛ خو د اټومونو د باندیني قشرونو یو یا څو الکترونونه له اټومونو څخه هریو د اوربیتالونو د ننوتلو لپاره د بل اټوم په باندیني قشر کې نفوذ کوي.

د الکتروني ریځې کثافت د الکترونونو د رڼمونو په واسطه د اټومي طول واحد په یو مکعب (د بور له نظر، د واحدو اټومو د طول د هایدروجن د اټوم د لومړۍ اوربیتال له شعاع سره مساوي دي) په لاس راوړي.

پام وکړئ




کوولانس په لغت کې د شریک ولانس په معني او د اړیکې یو ډول ته اشاره ده چې په هغه کې اټومونو یو له بل ولانسی قشر څخه یا په ټاکلي ډول یو له بل د ولانسی قشر د الکترونونو څخه په شریک ډول ګټه اخلي، هغه اړیکه چې په هغه کې د ولانسی قشر الکترونونه په شریک ډول کینودل شي، د اشتراکي اړیکې په نوم یادېږي.


څرنگه د کوولانس اړیکه جوړېږي؟

د دې پوښتنې د ځواب د وړاندې کولو لپاره، د کوولانس ساده اړیکه د هایدروجن د مالیکول د دوو اټومونو په منځ کې تر څیړنې لاندې نیسو. د هایدروجن دوه اټومونه یو بل ته نژدې شوي دي، د یو اټوم د الکترون او د بل اټوم د هستې ترمنځ د جذب قوې قواوې عمل کېږي دي، د بله طرفه د هایدروجن اټومونه اړونده الکترونو ترمنځ د دفعې قوه او په همدې ترتیب د اټومونو د هستو ترمنځ دفعې قواوې عمل کېږي چې په دې صورت کې دا قواوې باید یو بله خنثي کړي او له دې لامل ګرځي، ترڅو د هایدروجن اټومونه یو له بل څخه بیل وي؛ خو څرنگه چې لیدل کېږي، هایدروجن د

ماليکول په بڼه شتون لري. د اړيکې جوړېدو په وخت کې د جاذبې قوه له قواو څخه ډير زياته ده او د هايډروجن اټومونو يو له بل سره بې تړلې دي او ماليکول بې جوړې دی؛ نو د اړيکې له جوړېدو څخه وروسته د جاذبې او دافعي قواو دواړه سره مساوي کېږي:



(3 - 11) شکل د هايډروجن د ماليکول په جوړېدو کې د هايډروجن د اټومونو ترمنځ دافعه او جاذبه قوه د کورولانسې اړيکې کېدې شي چې د يو فز په شکل خيال شي، لاندې شکل وگورئ، کله چې د هايډروجن دوه اټومونه يو له بل څخه لرې شي، دهغوی د الکترونونو او هستې ترمنځ د جاذبې قوه د بيا دهغوی نژدې او لومړني حالت ته بې گرځوي او له بلې خوا دافعي قوه دهغوی د بيرته يو له بل څخه لرې کوي، په دې صورت کې د هايډروجن اټوم د اړيکو د محور په اوږدوالي کې د خپو په حالت کې وي، خو دا ځيې چې تل د دهغوی هستې يوه له بلې څخه په تعادلي فاصلو کې ساتي چې دا فاصله د اړيکې د اوږدوالي په نوم يادېږي:




د گلولې او ميلې موډل

(3 - 12) شکل فزري اړيکه

د کورولانسې شعاع

د اټومونو د هستو ترمنځ فاصله چې د کورولانسې اړيکو په واسطه وصل شوي دي، د دهغو اټومونو د ولانسې شعاعو له مجموعې سره مساوي ده، د کورولانسې شعاع د کورولانسې د تشکيل کوونکو اټومونو د شعاع له مجموعې څخه عبارت ده، د کلورين او هايډروجن د کورولانسې شعاع مجموعه د هايډروجن کلورايډ د کورولانسې اړيکو له فاصلې سره مساوي ده:



(3- 13) شکل د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې د لري کولو او نژدي کولو قوه

1 - د هستو او الکتروني ورېځو تر منځ د نژدي کولو قوه د هستو تر منځ فضا کې

2 - د دوو هستو تر منځ دفعي (لري کولو) قوه

۲- ۲: د کیمیاوي اړیکو اوږدوالي:

د اتومونو د هستو تر منځ فاصله چې یو له بل سره تړلي دي، د اړیکې له اوږدوالي څخه عبارت دي، د بیلابیلو مرکبونو د عنصرونو د اتومونو په منځ کې د اړیکو اوږدوالي عموماً $\frac{1}{10}$ برخه دیو نانومتر، ده، د مرکب په مالیکول کې د دوو اتومونو په منځ کې د اړیکو د شمیر زیاتوالي د اړیکې اوږدوالي کم او کوچنۍ کیږي.

د $N - N$ ، $N = N$ ، $N \equiv N$ په مالیکولونو کې د نایټروجن د اتومونو تر منځ د اړیکو اوږدوالي په ترتیب سره 0.145 nm ، 0.125 nm ، 0.109 nm دي او د اړیکو اوږدوالي به $C - C$ ، $C = C$ ، $C \equiv C$ په ترتیب سره 0.126 nm ، 0.134 nm ، 0.154 nm دي.

د اړیکې اډوالي له انرژي سره معکوس تناسب لري.

د اشتراکي اړیکو د مطالعې یوه لاره هم د اتومونو د انرژي څیړنه مخکې له اړیکې او وروسته له اړیکې څخه ده؛ په دې اړه د هایدروجن مالیکول څیړنې لاندې نیسو:

په لاندې گراف کې گورو چې د منځني په کومو ټکو کې د هایدروجن اتومونه یو له بل په څنګ کې شتون او ډیره کمه انرژي لري، دا ټکي د انرژي د ډیرې ټیټې سطحې ښودونکي ده او د هایدروجن د دوو اتومونو په منځ کې فاصله د اړیکې له جوړیدو څخه وروسته ښیي او دا فاصله هماغه تعادلي فاصله یا د اړیکې طول دي چې د هایدروجن اتومونه د تعادلي فاصلې څخه په لري فاصله کې د جاذبې په قواوو کې شتون له کبله، میل لري چې سره نژدې شي؛ خو د تعادلي قواوې څخه په ډیره لږ فاصله د دفعې قوه قوي شوې ده او میل لري چې تعادلي حالت ته وګرځي.

دوه وصل شوي اتومونه یو له بل سره په دايمي ډول د نوسان په حال کې دي؛ خو د انرژي د لږې سطحې د لرلو له کبله کوولانسي اړیکه په خپل منځ کې جوړه وي.

له دې څخه پایله اخیستل کیږي چې د هایدروجن وصل شوي اتومونه له جلا اتومونو په نسبت ټینګ او کلک دي یا په بل عبارت د هایدروجن مالیکول داتومي هایدروجن څخه د انرژي په ښکته سطحې کې شتون؛ نو له دې کبله چې د دوو اتومونو په منځ کې اړیکه جوړیږي، انرژي ازادیږي،


لاندې جدول د کورولانسې اړیکو اوږدوالي او انرژي بنسټې چې د اړیکې د پري کیدو او د اټومونو د منځ ته راتلو لپاره په هماغه اندازه انرژي ضروري ده کوم چې د هغه په جوړېدو کې ازاده شوي ده.

(3 - 14) جدول د کورولانسې اړیکې اوږدوالي او انرژي

اړیکه	اوږدوالي (pm)	انرژي kj/mol	اړیکه	اوږدوالي (pm)	انرژي kj/mol
H-H	75	436	H-I	161	298
H-C	109	412	C-Cl	177	338
H-Cl	127	432	H-Br	194	276
H-Br	142	366	Cl-Cl	199	243
C-O	143	360	Br-Br	229	193
C-C	154	348	I-I	266	151

قطبي اشتراکي، غیر قطبي اشتراکي اړیکې او الکترونیکیاتي


د دوو یو شان اټومونو د اړیکو په منځ کې د اړیکو (σ - Bonding) تشکیل کونکو اوربیتالونو الکتروني کثافت په نسبي منظر ډول د دې دوو اټومونو په منځ کې شتون لري، د بیلګې په ډول د H_2 په مالیکول کې چې په (3-14) شکل کې لیدل کیږي:



(3 - 14) شکل د هایدروجن د مالیکول د الکتروني کثافت بڼه

که چېرې د دې اړیکې لرونکي اټومونه د بیلابیلو عنصرونو څخه وي، اړیکې یې قطبي دي او

الکترونونو د دې اتومونو څخه د یوه لورته یي انحراف کړي دي؛ د بیلګې په ډول: د HF په مالیکول کې د الکتروني ورېځې کثافت د اړیکو په ساحه کې د هایدروجن د اټوم څخه نژدې دي؛ ځکه د فلورین د الکترونو ګاڼیو نښتې وړتیا د هایدروجن څخه ډیره ده (EN د کلورین 4 او د هایدروجن 2.1 ده)، نو په دې بنسټ د هایدروجن او فلورین په منځ کې اړیکه قطبي ده، د منفي چار جونو د ثقل مرکز د هستې د مثبتو چار جونو د ثقل په مرکز باندې نښتي نه دي، د مرکبو زیات مالیکولونه قطبي دي چې د اشتراکي او آیوني اړیکو ترمنځ د جلا کیدو سرحد ټاکل کېدای نه شي.



(3-15) شکل د کوولانت او واندر والس اړیکو شعاع

الف- r_v د H_2 واندر والس شعاع: $r_{co} = 0.017nm$ (د r_{co} طول له $2nm$) سره مساوي دي.

ب- د Cl_2 مالیکول: $r_{co} = 0.104nm$ ، $r_v = 0.1nm$

ج- د HCl په مالیکول کې: د اړیکې اوږدوالي $0.141nm$ دي.

زیات پوه شي



که چېرې د دوو اتومونو ترمنځ الکترونو ګاڼیو نښتې توپیر صفر او یا 0.5 څخه لږه وي، د دې دوو اتومونو ترمنځ اړیکه غیر قطبي ($Non\ Polar\ Bond$) ده او له 0.5 څخه لوړه تر یو پورې اړیکه قطبي ده، همدارنګه که چېرې د عنصرونو د دوو اتومونو ترمنځ د الکترونو ګاڼیو نښتې توپیر له 1 څخه تر 1.7 پورې وي، د هغوي ترمنځ اړیکه تقریباً 50% قطبي او 50% آیوني ده او که له 1.7 څخه لوړه وي، اړیکه آیوني ده؛ د بیلګې په ډول: که چېرې سیزیم فلوراید (CsF) په پام کې نیسو د سیزیم الکترونو ګاڼیو نښتې 0.7 او د فلورین 4.0 ده، نو د دوي ترمنځ د الکترونو ګاڼیو نښتې توپیر 3.3 دی، له دې کبله د دې اړیکې خواص له آیوني اړیکې سره ډیر سمون لري.

خیل ځان وازمائي

د اکسیجن الکترونو ګاڼیو نښتې 3.5 او د سلیکان الکترونو ګاڼیو نښتې 1.8 ده چې د هغوي ترمنځ الکترونو ګاڼیو نښتې توپیر 1.7 دی. د سلیکان او اکسیجن د اړیکې ډول په سلیکان ډای اکساید کې د منطقي د لیلونو پر بنسټ روښانه کړئ.




پام وکړي:

په ځينو مواردو کې که چېرې د دوو عناصرونو د اټومونو ترمنځ د الکترونو ګاڼيوتېټي توپیر 4, 0 څخه لږ وي ، غیر قطبي په نظر کې نیول کېږي؛ د بېلګې په ډول: د $C-H$ اړیکه په عضوي کیمیا کې یوه مهمه اړیکه ده چې غیر قطبي په پام کې نیول کېږي.

۳-۳: د کوارډینیشن اړیکه Coordination Bond

د کوارډینیشن اړیکه د کورلانت د اړیکې یو ډول ده چې په دې اړیکې کې د ګډو الکترونو جوړې یوازې د یو اټوم له خوا له ټولو اټومونو څخه چې په اړیکو کې برخه لري ، د بل اټوم په واک کې پریښودل کېږي ، له دې اټومونو څخه یو اټوم د ورکوونکي (Donar) په بڼه او د هغوی بل د اخیستونکي (Acceptor) په بڼه ځان ښکاره کوي چې دا ډول اړیکه د ډونار – اکسیټور (Donar – Acceptor) په نوم هم یادېږي. د ورکوونکو (Donar) عناصرونو اټومونه په خپل باندیني قشر کې یو جوړه آزاد الکترونونه لري:




اکسیټور په خپل باندیني قشر کې د یو تش اوربیتال لرونکي دي ، د انتقالي فلزونو کټیونونه کولای شي، د اکسیټور په توګه عمل وکړي ، د اوبو په مالیکول کې د اکسیجن اټوم د دوو جوړو ازاو الکترونونو لرونکي دي ، دا اټوم خپل ازاده جوړه الکترونونه د الکتروني خلا لرونکو ذرو په واک کې د هغوی د اوکټیت د بشپړېدو لپاره ورکوي ؛ د بېلګې په ډول: H^+ الکتروني خلا لري او د هغه د 8 اوربیتال تش دي چې دا تش اوربیتال د اکسیجن د جوړه ازاده الکترونونو په واسطه ډک او په پایله کې د کوارډینیت اشنتراکي اړیکه جوړېږي؛ نو ویلي شو چې (H_3O^+) د کوارډینیت اړیکې په پایله کې لاس ته راځي او د پروتون (H^+) چارج په ټول ایرن کې ویشل کېږي ، په همدې ترتیب اوبه د فلزونو په ایرنونو سره کوارډینیشن کېږي؛ د بېلګې په ډول: $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

د جیرو مالګو حلیدل د کوارډینیت اړیکو په جوړېدو د فلزونو د ایرنونو او اوبو د مالیکولونو په منځ کې دي . د کرسټلونو د شبکو د ایرنونو په منځ کې د اړیکو د پری کېدو لپاره انرژي په مصرف رسیدلې او په کرسټلونو کې د ایرنونو د اړیکو د جوړېدو په وخت کې انرژي ازادېږي ، که د کوارډینیشن د اړیکو جوړېدو په واسطه چې د فلزونو د اټومونو او اوبو په منځ کې شتون لري، انرژي ازاده شي، نو ممکن د حل کېدلو بهیر ادامه پیدا کړي او د فلزونو ایرنونونه به Hydration شي.



د امونیا په مالیکول کې $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{N} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ د نایټروجن اټوم خپله پوره جوره ازاد الکترونونه د المونیم اټوم

ته د AlF_3 په مالیکول کې ورکوي ، په پایله کې د نایټروجن او المونیم د اټوم ترمنځ د کوارډینیشن اړیکه جوړېږي ، په دې صورت کې د نایټروجن او المونیم الکتروني قشرونه اټه ، اټه الکترونه لري او د وروستي قشر له الکتروني ډک والي څخه برخمن دي :




د کوارډینیشن اړیکه د تیر خط $\longrightarrow$ په واسطه ښودل کېږي او $(\longrightarrow)$ د تیر سمت د ډولار څخه اکسپتور خوله توجه شوي دی.

فعالیت



لاندې شکل د نو شادر (المونیم کلوراید) مالیکول رښتې ، د ډگر شوي مالیکول شکل په پام کې نیولو سره په هغه کې د اړیکو ډولونه په گروپي شکل وښاکي او په ټولگي کې خپل ټولگي والونه وړاندې کړي.





پام وکړي

الکټروني دور اوريتالونو ننوتل يو په بل کې د اشتراکي اړيکې په نوم او د دوو الکټرونيو اوريتال ننوتل، په يو خالي اوريتال کې د کوارډينيشن اشتراکي اړيکې په نوم او يا د يو طرفه اړيکې په نوم يادوي.

۳-۴: فلزي اړيکه

د فلزونو د ايزوايزيشن انرژي او الکټرونيگاتيوتی ټيټه ده او د هغوي د باندني قشر د الکټرونونو تړون لږ څه سست دي، په فلزونو کې مثبت ايونونه تشکيلېږي او په بلوري شبکه کې ثابت ځای ځانته غوره کوي چې ازاد الکټرونونه د هغوی په چاپېريال کې په ازاد توگه حرکت کوي او بلوري ذرې يو له بل سره نښلوي.

په ياد ولري چې

د الکټرونونو تشکيل شوي الکټروني وړيچې او د فلزونو د مثبتو ايونونو ترمنځ د جذب قوه، د فلزي اړيکې په نوم يادوي.

د مثبتو ايونونو او د تشکيل شوي الکټروني وړيچې ترمنځ د جذب قوه په فلزونو کې په هغه اندازه قوې ده چې د هغو د ذرو د تراکم د وېر نږدې کيدو لامل گرځي او د همدې کبله ده چې فلزونه کلک دي، د خټک خوړلو او پانې کيدو وړتيا لري؛ د بيلگې په ډول: دمس، المونيم او نورو فلزونو څخه د سسيم او تختو د جوړېدل، په فلزي جسمونو کې د فلزي ذرې د کلکو اړيکو بڼو ډنګي دي.

۳-۵: د کيمياوي اړيکو فزيکي خواص

د ماليکولونو د اړيکو ډولونه د ماليکولونو څرنگوالي څرګندوي، د ايشيدو ټکي او د وييلې کيدو ټکي په ماليکولونو کې د اتومونو اړيکو سره نېغ پر نېغ تړون لري؛ د بيلگې په ډول: درې ماليکولونه (HF , F_2 او NaF) د ايشيدو او وييلې کيدلو له کبله سره پرتله کوو:

(3-4) جدول د درې ماليکولونو HF , F_2 او NaF د ايشيدو او وييلې کيدو د درجې پرتله کول

د وييلې کيدو درجه	د ايشيدو درجه	ماليکول
$-218^{\circ}C$	$-187^{\circ}C$	F_2
$-83^{\circ}C$	$+20^{\circ}C$	HF
$995^{\circ}C$	$1707^{\circ}C$	NaF

خړزنگه چې لیدل کیږي، NaF ایوني ماليکول دي، د ویلي کیدو او ایشیدو ټکی ېې لور دي، په داسې حال کې چې HF یو قطبي یا نیمه ایوني ماليکول دي چې د ایشیدو او ویلي کیدو درجه ېې ډیره ټیټه ده او همدارنگه F_2 یو غیر قطبي ماليکول دي چې د هغه د ویلي کیدو او ایشیدو ټکی خوځلي له دوو مخکښو ماليکولونو څخه ډیره ټیټ دی.

د یو ماليکول د ایشیدو او ویلي کیدو او تفکیک درجه، پرته له دې چې د هغو اټومونو د اړیکو خړنگوالي پورې اړه لري، د اړیکو او د هغوی د مالیکلونو په منځ کې توازو سره هم اړه لري.

۳-۶: د کیمیاوي اړیکو هومولیتیکي او هترولیتیکي پړي کیدل

د کیمیاوي اړیکو د قطع کیدو پړي کېدو لپاره په هماغه اندازه انرژي ضروري ده کوم چې د تشکیل پر وخت ېې ازاده شوي ده، کیمیاوي اړیکه په دوو میخانیکیتونو پورې کیږي چې د هومولیتیکي (*Hemolytic*) او د هترولیتیکي (*Heterolytic*) پړي کیدو څخه عبارت دي، په هومولیتیکي پړیکه کې د هر اټوم الکترون چې د اړیکې په جوړېدو کې په کاروي دي، بیرته یې اخلي، هر ذره د طاقت الکترون لرونکي ده، داسې ذرې د رادیکال (*Radical*) په نوم یادوي:



د اړیکې پریکیدل چې په هغې کې د اړیکې جوړه الکترون نه یو الکترونیوگانیف اټوم اخلي او د بیلابیلو چارو جوړو لرونکي ایونونه جوړیږي، د هترولیتیکي پړیکې په نامه یادېږي؛ د بیلگې په ډول: د HCl د مالیکول انفکاک:



نوټ: د اړیکې هومولیتیکي پریکیدل د رڼا، تودوخې او یا د روښنایي په اغیز ترسره کیږي.

۳-۷: د اړیکو ښې

په عمومي ډول اړیکه دوه شکله لري:


۱- **د سگما اړیکه:** کیمیاوي اړیکې د اوریتالونو د ننوتلو او پوښنې پر بنسټ تشکیلېږي، که چېرې د الکتروني ورځو پوښښ هغې لیکې په پیل کې چې د دوو اټومونو هستې سره ښلوي، ترسره شي؛ یعنې: د اوریتالونو ننوتنه نیغه او لوړه وي، اړیکه کلکه ده چې د سگما (σ) اړیکې په نوم یادېږي. دا اړیکه کیدای شي د دوه s اوریتالونو د مخامخ ننوتو او یا د یو s او یو p اوریتالونو او یا د دوو p اوریتالونو د ښخ ډول ننوتو په پایله کې تشکیل شي. (3-17) شکل

هغه کیمیاوي اړیکه چې د یو جوړې الکترونونو پر بنسټ د دوو اټومونو په منځ کې تړل شوي وي، د یو گونۍ اړیکې په نوم یادېږي. اوریتالونه د خپل د ښخ پر ښخ ننوتلو په پایله کې یوازې د سگما (σ) اړیکه جوړې وي.

۲- **د پای (π) اړیکه:** د مالیکلونو د دوو اټومونو په منځ کې اړیکه کیدای شي دوه گونۍ یا درې گونۍ وي. دا ډول اړیکه د یو جوړې څخه د زیاتو الکترونونو په واسطه تشکیلېږي؛ د بیلگې په ډول: د اکسیجن په مالیکول کې د اکسیجن د دوو اټومونو په منځ کې دوه گونۍ او د نایټروجن په مالیکول

کې ، د نایټروجن د دوو اتومونو په منځ کې درې گونې اړیکه شتون لري. که چېرې د اتومي اوربیتالونو ننوتل پر څنګ (جانبی) وي ؛ یعنې د P د اوربیتالونو پوښښن پر څنګ وي چې د (x) په محور باندې په عمودي بڼه شتون ولري ، تشکيل شوي اړیکه د π په نوم یادېږي.

د نایټروجن په مالیکول کې د نایټروجن د دوو اتومونو د Px اوربیتالونو نیغ پر نیغ نوتل کړی دي چې د (σ) اړیکه یې جوړه کړې ده ، هغه اړیکه چې د نایټروجن دوو اتومونو د Px اوربیتالونو د ننوتلو له امله تشکيلیږي، څرنګه چې د اوربیتالونو ننوتل څنګ پر څنګ دي او پوښښن دوساحې بې منځته راوړي دي چې دا دوي ساحې د x محور په پورته اوبښکته ساحې کې شتون لري ، دا تشکيل شوي اړیکه د π اړیکې په نوم یادېږي ، د نایټروجن د مالیکول د π دویمه اړیکه د نایټروجن د دوو اتومونو د Pz د اوربیتالونو د څنګ پر څنګ د ننوتلو څخه منځ ته راځي ، او څرنګه چې ورل شوی د π اړیکې په جوړېدو کې د اټوم د اوربیتالونو ننوتل څنګ پر څنګ او سست دي ؛ نو له دې امله اړیکه سسته (ضعیفه) او د (σ) د اړیکې په نسبت نامستحکمه ده. د P اوربیتالونه کولای شي چې د π اړیکه او هم (σ) اړیکه تشکيل کړي. په څوگونو اړیکو کې یوه د سګما (σ) اړیکه او بله د (π) اړیکه ده، لاندې شکلونه د اټوم د اوربیتالونو نوتل او پوښښن د مالیکول اړیکو په جوړېدو کې رابښي :



(3- 17) شکل د اوربیتالونو نوتل او دهغوی پوښښ د هایدروجن ، کلورین او هایدروجن کلوراید په مالیکولونو کې.

فعالیت

د مالیکولي جوړښت له رسمولو وروسته د مرکبونو د اتومونو تر منځ د اړیکو ډولونه د

لاندې مالیکولونو په جوړښت کې وټاکي :

الف- KNO_3 ب- H_2SO_4 ج- $NaCl$


۳- ۱ : هایبریدیزیشن (Hybridization) او د اړیکو تر منځ زاویه

(Hybridization) : د $Hybrid$ کلمه په یوناني ژبه کې دورنی د اختلاف په معنی ده؛ لکه هغه نسل چې د دوو بیلابیلو نسلونو څخه حاصل شوي دي چې د امتزاج او یا اختلاف مفهوم رسوي، په دې ځای کې د دوو یا څو بیلابیلو اتومي اوربیتالو له اختلاف څخه جوړښته ده چې د دوه او یا څو نوي هایبرید شوي اوربیتالونه مینځته راوړي.

د کیمیاوي عنصرونو د انومونو و لانسې الکترونونه کولای شي د f, d, p, s — په اوریټالونو کې شتون لري چې په دې صورت کې نوموړي ټول او ریټالونه د انرژي له کبله یو شان ارزښت نه لري او د هغوی اړیکې هم یو شان نه دي؛ خو تجربو په ثبوت رسولې ده، په هغو مالیکولونو کې چې مرکزي اټوم د f, d, p, s — د بیلابیلو و لانسې اوریټالونو لرونکي دي، د اړیکوله کبله یو شان ارزښت لري، دا مطلب د علماوو هریو *Cleyster* او *Pamling* په واسطه توضیح شوی دي، نوموړو علماو داسې نظر وړاندې کړي دي، هغه اوریټالونه چې د انرژي له کبله زیات توپیر نه لري او په عین اصلي قشر او د اټوم په وروستي قشر کې ځای پرځای شوي دي، د لومړني تعداد په اندازه هلیبریدیزیشن *Hybridization* کېږي او په خپل لومړنی شمیر سره سم هلیبرید شوي اوریټالونه جوړوي چې د انرژي په عین سطح کې دي، الکتروني ورېځې ېې یو شان جوړښت لري، دا اوریټالونه د اړیکې د جوړیدو په خوا راکش کېږي او دهغوی ننوتل په یو بل کې لورېږي چې دلته د اړیکو د جوړیدو زمینه برابریږي.

د اټومي اوریټالونو د هلیبریدیزیشن په بهیر کې لږ څه انرژي په مصرف رسیدلې، نو ددې اوریټالونو پایښت به لږ وي؛ خو د اړیکو د جوړیدو په وخت کې انرژي له لاسه ورکوي او اړونده ثبات لاس ته راوړي.


د SP هلیبرید: په دې ډول هلیبرید کې یو د s اوریټال او یو د p اوریټال سره مزویج شوي دي او په پایله کې ېې sp هلیبرید شوي اوریټال ($sp - hybrid$) جوړکړي دي چې د اړیکو و لانسې زاویه ېې 180° درجې ده، د sp هلیبرید بیلگه کولای شو د Hg, Cd, Zn, Be عنصرونو په هلوچنډي مرکبونو کې وړاندې کړو؛ د تجربې پایلې ښکاره کوي چې په هلوچنډونو کې Hg, Cd, Zn, Be د $sp - hybrid$ او د هغوی مرکبونه خطي هندسې جوړښت لري، په $sp - hybrid$ او د p او s د هر یو برخه $\frac{1}{2}$ ده:



(3-18) شکل د SP هلیبرید


د SP^2 هلیبریدیزیشن: په دې ډول هلیبرید کې یو د s اوریټال او دوه د p اوریټالونه سره گډه یا

یوځلی شسوي او په پایله کې د SP^2 درې هایبرید شسوي اوربیتالونه پې جوړکړي دي ، دا اوربیتالونه په یوه سطح کې په 120° درجې زاویو یو له بل سره شتون لري ، د SP^2 -هایبرید په هر اوربیتال کې د s برخه $\frac{1}{3}$ او د p برخه $\frac{2}{3}$ ده.




(3- 19) شکل د SP^2 هایبرید

د کاربن اتومونه په غیر مشبوع هایدروکاربنونو د ایتیلین په کورنۍ کې SP^2 هایبرید لري . د BF_3 په مالیکول کې بورون د SP^2 هایبرید لرونکي دي:




(3- 20) د SP^2 هایبرید په BF_3


د SP^3 هایبریدیزیشن: دا ډول هایبریدیزیشن د کاربن اتومونه په مشبوع هایدروکاربنونو کې لرونکي دي ، پر دې ډول چې یو S اوربیتال د درې P اوربیتالونو سره د انرژۍ د جذب په پایله کې یوځلی شسوي او د SP^3 څلور هایبرید شسوي اوربیتالونه پې تشکیل کړي دي چې د څلورمخیز رآسونو ته توجه او د هغوی د منځ زاویه 109.5° درجې ده او دا هایبریدیزیشن په CH_4 ، CF_4 او نورو مالیکولونو کې لیدلې شی. په SP^3 هایبرید کې د s برخه $\frac{1}{4}$ او د p برخه $\frac{3}{4}$ ده.



په هایدريدیزیشن کې نیم
چک شوي اوربیتالونه او یا
پوره چک شوي اوربیتالونه
برخه لري چې مالیکول
اوربیتال جوړوي؛ دیلګې
په ډول: د نایټروجن په اټوم



کې د $2P$ اوربیتالونه د یو
الکترون په لرلو او $2S$
د دوه الکترونونو په لرلو
برخه اخلي:



(3 - 21) شکل د SP^3 هایدريد

په هایدريدیزیشن کې
نه یوازې د S او P
اوربیتالونه برخه اخلي؛
بلکې د d او f اوربیتالونه
هم برخه اخېستی شي،

په لاندې جدول کې د مالیکولونو او ایونونو بیلابیل شکلو په څېر له خالصو اوربیتالونو او هایدريد
شوو اوربیتالونو څخه تشکیل شوي دي، وړاندې شوي دي:

(3-5) جدول د مالیکورنو او ایونونو فضایی جوړښت

په مخ د الکټرونونو د جوړو شمیر	د کوړدیناسیون لیس	هیبریدی جوړښت	لاریک ټي NLA ایرک ټي	فارمول	د مالیکول شکل	د مالیکول هښي شکل	پلگه
2	sp خطي	2	2L	AX_2	خطي		$HgCl_2, CdI_2, Ag(CN)_2^-$
3 (+Electron) لپاره (NO_2)	په صفحه کې واقع مثلث	3	3L	AX_3	مستو الاضلاع مثلث		
		2	2L-1NL	AX_2	د په شکل		
4 (+Electron) لپاره (ClO_2)	منظمه خلور و جهتي	4	4L	AX_4	خلور و جهتي		
		3	2L-2NL	AX_3	مثلث هرم		
		2	2L-2NL	AX_2	د په شکل		
		5	5L	AX_5	مثنی دوه هرمي		
5	دوه هرمي منظم مثلث sp ³ d on dsp ³	4	4L-1NL	AX_4	نا منظمه خلور و جهتي		$SF_4, TeCl_4$
		3	3L-2NL	AX_3	د په شکل		ICl_2, I_2
		2	2L-3NL	AX_2	خطي		
		6	6L	AX_6	اته و جهتي		
		5	5L-1NL	AX_5	د مربع په قاعده هرم		CH_5^+, BrF_5, IF_5
4	منظمه اته و جهتي sp ³ d ² on d ² sp ³	4	4L-2NL	AX_4	په سطح کې مربع		ICl_4, BrF_4^-





فعالیت:

د مرکبونو د مالیکولې جوړښت په نظر کې نیول او د هغوی رسم کیدل، د اوبو په مالیکول کې د اکسیجن هایدروجنیشن او د کاربن د اټومونو هایدروجنیشن د $1 - 4$ کاربن شمیر پورې په $CH_2 = C = CH - CH_3$ وټاکي.

د دریمه څپرکي لنډیز

- په یو مالیکول کې د اټومونو د جاذبې قوه د کیمیاوي اړیکې (Chemical Bond) په نوم یادوي.
- ولانس د عنصرونو د اټومونو هغه خاصیت دی چې پر شمېر ټاکلي اټومونه په کیمیاوي تعاملونو کې خلی پرځای او یا تعویض وي، په بل عبارت د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو د اتحاد قوه په کیمیاوي تعاملونو کې د هماغه عنصر د اټوم د ولانس په نوم یادېږي.
- دیوري کیمیاوي اړیکې انرژي د هماغه مقدار انرژي څخه جلا کېږي.
- کي له دوو اټومونو څخه جلا کېږي.
- د الکتروني جوړو د الکتروني ورځې د کش کولو وړتیا د اټوم په واسطه د الکترونیګاتیوټي په نوم یادوي چې په EN باندې ښودل کېږي.
- د مالیکولونو د اړیکو چلولونه، د مالیکولونو څرنګوالی ټاکي. د ایشیدو او ویلې کیدو ټکی نیغ پر نیغ په مالیکولونو کې د اټومونو له اړیکو سره اړه لري.
- په هومولینیکي پریکړلو کې هر اټوم خپل الکترون چې د اړیکې په تشکیل کې یې برخه درلودله، بیرته اخلی او هر ذره د طاقه الکترون لرونکي وي چې داسې ذرې د رایکال (Radical) په نوم یادېږي.
- که د الکتروني ورځې پوښښن د لیک په اوږدوالي چې د دوو اټومونو هستې سره ښکاري ترسره شي؛ یعنې د اړیتالونو ننوتل نیغ پر نیغ او اعظمی وی، اړیکه کلکه ده چې د سګما (σ) اړیکې په نامه یادېږي.
- که د اټومي اړیتالونو ننوتل څنګ پر څنګ وي؛ یعنې د P د اړیتالونو د الکتروني ورځو پوښښ څنګ پر څنګ وي او د X د محور د پاسه عمود وي، دا تشکیل شوي اړیکه د پای π اړیکې په نوم یادېږي.
- هایدروجنیشن (Hybridization): د دوو یا څو بیلابیلو اټومي اړیتالونو د اختلاط څخه عبارت دی چې دوه او یا څو نوي هایدري اړیتالونه منځته راوړي.
- ایوني اړیکه: اړیکه د کیمیاوي اړیکې یو ډول ده چې د مخالف علامه چارج لرونکو ذرو په منځ کې د الکتروستاتیکي قوې د جذب په پایله کې جوړېږي. د دوو اټومونو په منځ کې اړیکه هغه وخت برقي یا الکتروولانت ده چې د دې دوه اټومونه تر منځ د الکترونیګاتیوټي توپیر (1.7) او



یا دهغی څخه لوړه وي. ایوني مرکبونه او یا الکتروولانت مرکبونه د ایونونو څخه تشکیل شوي دي. که چېرې د دوو اتومونو په منځ کې د الکترونیګاتیویتی توپیر صفر او یا د 0.5 څخه لږ وي، د دې دوو اتومونو په منځ کې اړیکه غیر قطبي (Non Polar Bond) ده او د 0.5 څخه تر 1.7 پورې اړیکه قطبي ده، که چېرې د عنصرونو د اتومونو په منځ کې د الکترونیګاتیویتی توپیر د 1 څخه 1.7 پورې وي، د دوي په منځ کې اړیکه تقریبا 50% قطبي او 50% ایوني ده او که له 1.7 څخه لوړه وي اړیکه ایوني ده.

د دریم څپرکي تمرین

- 1 - کیمیاوي اړیکې د اتومونو د کومو فکتورونو پر بنسټ تشکیلېږي؟
 - الف- د واندروالس قوه
 - ب- ولانسی قوه
 - ج- د د نښو الکتروونو په واسطه
 - د- یو هم نه
- 2 - په یو مالیکول کې د اتومونو د جذب قوه د په نوم یادوي.
 - الف- ولانس
 - ب- اړیکه
 - ج- الکترونیګاتیویتی
 - د- سمبول
- 3 - د اړیکې د جوړېدو پر وخت کې انرژي..... کېږي.
 - الف- جذب
 - ب- ازاد
 - ج- تشکیل
 - د- اړیکه انرژي ته اړتیا نه لري.
- 4 - د s د یو اوربیتال او د p دوه اوربیتالونه د اختلاف څخه کوم یو لاندې هیلیرد تشکیلېږي؟
 - الف- sp^3
 - ب- sp
 - ج- sp^2
 - د- sdp^2
- 5 - د اړیکې پرې کېدو پر وخت په هورمولیتکي شکل کې کومې لاندې ذرې تشکیلېږي؟
 - الف- کټیون
 - ب- انیون
 - ج- رادیکال
 - د- الف او ب دواړه
- 6 - که د دوو اتومونو تر منځ د الکترونیګاتیویتی توپیر 1.4 وي، اړیکه..... ده.
 - الف- 50% قطبي، 50%
 - ب- ایوني
 - ج- اشتراکي
 - د- غیر قطبي
- 7 - که چېرې د الکتروونو شریکې جوړې یوازې د یو اټوم له خوا چې په اړیکه کې برخه اخلي، ورکړ شوي وي، دا اړیکه د په نوم یادېږي.
 - الف- کواردینیشن
 - ب- یو طرفه اشتراکي
 - ج- ټول سم دي
- 8 - که چېرې د اتومي اوربیتالونو ننوتل څنګ پر څنګ وي یعنې p د اوربیتالونو د الکتروني ورځو پوښښن جانی وي او د X د محور له پاسه عمود وي، دا تشکیل شوی اړیکه د.....
 - الف- سګما
 - ب- پای
 - ج- یوه گوني
 - د- دوگوني او یا څلورگوني
- 9 - که د دوو اتومونو په منځ کې د الکترونیګاتیویتی توپیر صفر او یا 0.5 څخه ډیر لږ وي، د دوو اتومونو تر منځ اړیکه..... ده.
 - الف- غیر قطبي
 - ب- Non Polar Bond
 - ج- ایوني
 - د- الف او ب

- 10 - د کیمیاوي اړیکو زاویه عبارت له دوو خطو د پریکېدلو منځنۍ زاویه ده چې د مرکزي اټوم له هستې سره د دوو نور وصل شو هستو - - - - رسم کېږي .
- الف- دوه اټوم ب- مرکزي اټوم ج- د اټومونو په منځ کې د- د دوو اېونونو په منځ کې
- 11 - کوم یو د لاندې علماو څخه یوازې او یو له بل څخه جلا د کیمیاوي اړیکو تیوري وړاندې کړه؟

الف- کوسیل (Kocell) او لویس (Lives) ، ب- سونډي او فاینس
ج- نیوټن او فارادي ، د- هاینزبرگ او ایوانسکه

تشریحي پوښتنې

- 1 - د اړیکو جوړېدل دتودوخې تولیدونکې بهیر او یا د تودوخې جنېبوزونکې بهیر دی؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.
- 2 - په یوه اشتراکي اړیکه کې کوم عوامل د دوو هستو د نژدې کېدو لامل ګرځي؟
- 3 - ولې دوه غیر فلزي عنصرونه آیوني اړیکه نشي جوړولای؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.
- 4 - د اوکټیت د قاعدې په پام کې نیولو سره، له لاندې عنصرونو څخه د جوړېدو مرکبونو فورمول ولیکئ:


الف- دهایدروجن او سلفر ب- دهایدروجن او فاسفورس
ج- دسلفر او فلورین

- 5 - ولې د دوهم پیریود عنصرونه نه شي کولای چې د څلورو څخه زیاتې اړیکې تشکیل کړي؟
- 6 - سګما او پای د اړیکو تر منځ توپیر روښانه کړئ .
- 7 - کوم یو له لاندې مرکبونو څخه په اوبو کې د زیات انحلاېت لرونکي دي؟
- الف- MgF_2 او یا BaF_2 ب- $MgCl_2$ او یا MgF_2
- 8 - د لاندې مرکبونو څخه کوم یو مرکب اړیکه ډیره قطبي ده؟ له قانع کونکو دلیلونو سره معلومات وړاندې کړي.

الف- $Mg-N$ د- $Si-F$ ج- $P-Cl$ ب- $Hg-I$
9 - لاندې تعامل وګورئ:



- الف- په تعامل کونکو موادو او د تعامل په محصول کې هایدريد پيدا کړئ.
- ب- په $[H_2F]^+$ کې د فلورین هایدريد روښانه کړي.
- 10 - د کوآرډینېشن اړیکه توضیح کړي.
- 11 - د SP^2 هایدريد له یو مثال سره توضیح کړي.
- 12 - المونیم کلوراید په ګازي حالت Al_2Cl_6 په شکل موجود دي، د هغه لامل څه شي دي؟



د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبيت

آیا پوهیږئ چې مالیکولونه څرنگه جوړېږي؟ د عنصرونو د اټومونو له اتحاد څخه د هغوی د ولانسي قوۀ پرنسست کومې ذرې تشکیلېږي؟ ولې اټومونه کولای شي چې مالیکولونه جوړکړي؟ ولانسي الکترونونه څه شي دي؟ آیا اټومونه او د هغوی تشکیل شوي مالیکولونه د انرژي له کبله یو له بل څخه توپیر لري که نه؟ د مالیکولونو هندسي شکلونه او جوړښت څرنگه کولای شو چې توضیح یې کړو؟ څه وخت مالیکولونه قطبي دي او د کومو موادو مالیکولونه قطبي کېدای شي؟ د دې فصل د موضوعاتو په مطالعه به وتوانیږو چې پورتنۍ پوښتنو ته ځواب وړاندې کړو او د مالیکولونو د جوړېدو په اړه او د هغوی هندسي شکل او جوړښت په اړه کافي معلومات پر لاس راوړو، د مالیکولونو د تشکیل کونکو عواملو څرنگوالي د هغه له تشکیل کونکو اټومونو څخه پوه شئ.







۴- ۱. د مالیکولونو د مرکزي اتوم و لانسې قشر

څه فکر کوي؟ په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه څه ډول اتومونه دي؟

په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه عبارت له هماغه اتومونو څخه دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیدیشن چارج لور نمبر او و لانس لري. دا اتومونه کولای شي ایزوني، اشتراکي او یا یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو د اتومونو سره جوړې کړي، د همدارنگه اړیکو جوړېدل د و لانسې قشر د جوړښت، یعنی د دې عنصرونو پر اتومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې و لانسې الکترونونه شتون لري. په مالیکولونو کې د اتومونو په منځ کې اړیکه کېدای شي ایزوني اویا اشتراکي وي. د ایزوني اړیکې په تشکیل کې د مخالف علامه چارج لرونکو ایزونونو په منځ کې د جذب الکتروستاتيکي قوه شته ده او د بریښنا هغه ساحه چې ایزونونه تشکیلوي، د کړوی تناظر لري. نو له دې کبله ایزوني اړیکه پرته له جهت څخه ده. کله چې اتومونه یو له بل سره نژدې شي، د هغوی د اتومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکول اوربیتال تشکیل کوي. که چېرې د اړیکو د جوړه الکترونونو مالیکولي اوربیتال د ښکته انرژي سطح ولري، په دې صورت کې د کوولانت اړیکه تشکیلېږي. د پاولي د قاعدې پریښود د دې دوو الکترونونو سپینونه حتماً مخالف جهتونه دي. هر څومره چې د اتومونو د اوربیتالونو تړل ښخ پر ښخ او کلک وي، پر هماغه اندازه د هغه د مالیکول اوربیتالونو ځانګړتیا او کرکټر لوړ دي، د دوو اتومونو په منځ کې هغه وخت اړیکه کلکه ده چې د اتومي اوربیتالونو تداخل ښخ او داتومي اوربیتالونو پوښښ په خپل منځ کې لوړ وي، په دې صورت کې د کوولانت اړیکې فضايي سمت پیدا کول لوړ دي. د کوولانت اړیکې لرونکو مالیکولونو شکل د هغو د تشکیل کونکو اتومونو د اړیکو تر منځ زاوې په واسطه ټاکل کېږي. BCl_3 او NH_3 مالیکولونه د مالیکولي بیلابیلو جوړښتي شکلونو لرونکي دي.

څه علت موجود دي چې بیرېلیم کلراید $BeCl_2$ مالیکول خطي او دهغه ډای پول مونډ له صفر سره مساوي دي؟ په داسې حال کې چې د NH_3 مالیکول د مسطح زاویوی مالیکولي جوړښت لرونکي دي او دهغه ډای پول مونډ خلاف د صفر دي. کوم علت به موجود وي چې څلور اتومه په یوه سطح کې ځای ولري او په همدې ترتیب د نایټروجن اتوم په اموڼیا کې د هرم په رأس او هایډروجن درې اتومه د هرم په کنجونو کې ځای لري. لاندې شکلونه وگورئ:






(1 - 4) شکل د بیرلیم کلوراید، بورون کلوراید او امونیا د مرکبزو مالیکولي بڼه

فعالیت

د SO_3 د مالیکول فضايي شکل وليکئ او لاندې پوښتنوته ځواب ورکړئ.

- 1 - څو الکتروني جوړو د سلفر اټوم احاطه کړېدی ؟
- 2 - د اړیکو فضايي تنظیم رسم کړئ.

د ساده اولر دقیقو مالیکولونو د هندسي جوړښت تیوري په 1940 کال کې د سټرویک او پاولي په واسطه پیشنهاد شو، دا تیوري د ولاسي جوړه الکترونونو د دفع د تیوري په شان ښکاره شوي. دهمدی تیوري طرح کوونکو پوهانو دساده مالیکولونو او ایرونونو هندسی جوړښت وڅیړل شو چې بیلگي یې $BeCl_2$ ، BCl_3 ، NH_3 او CH_4 دي، نوموړو علماو پیدا کړ چې د مرکزي اټومونو په چاپیریال کې د ازادو الکتروني جوړو شتون د مرکبونو په مالیکولونو کې د مخامخ شویو الکتروني جوړې د دفعې لامل ګرځیدلي دي او دهغوی په منځ کې د دفع الکتروستاتيکې قوه شته ده، دی قواوو مالیکولي اوربیتالونه تریو ټاکلې حد پورې یو له بل څخه لرې کړي دي او د مرکزي اټوم هر جوړه شوي الکترونونه د خپل اوربیتال په مالیکول کې نیسي او دا الکترونونه هم نور جوړه الکترونونه د خانه څخه لرې کوي او په عمومي ډول د مالیکولونو په جوړښت کې خپله اغیزه څرګندوي. CH_4 مالیکول او NH_4^+ ایون فضايي شکلونه په لاندې ډول دي:



(4 - 2) شکل د امونیم د ایون او د میتان د مالیکول د فضايي جوړښت رسم

فعالیت


- 1 - د زینون اټوم څو الکترونونه د XeF_4 په مالیکول کې د اړیکو د جوړېدو لپاره په کار وړي؟ او څو جوړې الکترونونه د زینون د اټوم د پاسه په نوموړي مالیکول کې به موجود اوسي؟ د XeF_4 مالیکول به د کوم هندسي شکل لرونکي وي؟
- 2 - د XeF_2 ، XeF_3 ، XeF_6 او XeF_4 په مالیکولو کې د اړیکو څرنگوالي د شکل په واسطه توضیح او ولیکئ.

۴- ۲: خطي ماليکولونه (يوه جوړه ازاد الکترونونه)

کوم ډول ماليکولونه د خطي ماليکولونو په نوم يادوي؟ خطي ماليکولونه څه مفهوم ارايه کوي؟ د بيريليم کلورايد $BeCl_2$ د گاز ماليکول خطي دي. بيريليم په II اصلي گروپ کې شتون لري او د هغه په ولاړنسي قشر کې دوه الکترونه شته دي چې کولاي شي دوه د کوولانت اړيکې تشکيل کړي چې په ماليکولونو کې د اتومونو د خطي تنظيم د دوه جوړه الکترونو جلاکول يو له بل څخه تايمين وي.



(4 - 3) شکل د بيريليم کلورايد د ماليکول خطي جوړښت د خطي ماليکولونو نورې بيلگې د اسيتلين، کاربن ډاي اکسايډ او نورو ماليکولونو څخه عبارت دي چې شکله يې په لاندې ډول دي:



(4 - 4) شکل د ماليکولونو خطي جوړښت

د سټروک او پاولي په تيوري کې ليکل شويدي چې الکتروني جوړو د اړيکو مضروبوونه (ازادي اړيکې) هم د فضا يوه برخه نيسي؛ داسې چې دا ډول فضا د کيمياوي اړيکو جوړه الکترونونو هم نيولى ده. پورتنې شکله ونه وگورئ.

فعاليت

1 - درې پوقانې له هوا څخه ډکې کړئ، هغه په خطي شکل سره کېږدي او په پورتنۍ برخه د لومړي او لاندني کروي پوقانو باندې فشار وراچوي، کروي تنظيم وگورئ، خپل د سټروگو ليدني حال په کتابچو کې وليکئ.

2- که چیري څلورمه پوځانه پر هغوی ورزانه شي، په دي صورت کې به د هغوی نظم څرنگه وي؟

۴- ۳: سطح مالیکولونه (د الکترونونو دري جوړې):

څه فکر کوي؟ ایا د مرکبونو د سطح شکل لرونکي مالیکولونه به هم موجود وي؟
په دي ډول مالیکولونو کې د الکترونونو دري جوړې په یوه سطحه کې واقع دي او د مثب راسونو ته توجه شوي دي.

پام وکړئ



که چیري د مرکبونو د مالیکول د مرکزي اټوم په چاپیریال کې دري جوړې الکترونونه ځای پر ځای شوي وي؛ په دي صورت کې اړیکې په یوه سطح کې شتون لري او د هغوی ترمنځ زاویه (120) درجې ده او دري اټومه د مثب په راس کې د مرکزي اټوم په چاپیریال کې شتون لري، داسې ډول مالیکولي جوړښت د مثبالي مستوي په نوم یادېږي، د دي ډول مالیکولونو بیلگې کېدای شي د BF_3 د مالیکول جوړښت ورکړل شي، لاندې شکلونه وگورئ:



(4 - 5) شکل د بورون فلوراید د مالیکول مثلي جوړښت

بورون هغه عنصر دي چې د پریودیك جدول په درېم (III) اصلي گروپ کې ځای لري، دا عنصر د دري ولانسي الکترونونو لرونکي دي او دري اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړوي د $SnCl_2$ د مرکب ډای پول مومنت خلاف د صفر دي چې د هغه مالیکول د نه خطي والي باندې دلالت کوي، لامل یې دا دي چې قلعي (د قلعي عنصر د پریودیك سیستم په IV اصلي گروپ کې ځای لري) د څلورو الکترونونو څخه دو الکترونونه د اړیکې جوړولو لپاره په کاروړي دي، د اړیکو جوړه شوي الکترونونه او جوړه ازاد الکترونونه یو له بل څخه لرې شوي او دري

کنجی مسطح جوړښت لرونکي مالیکول تشکیل وي، د الکترونونو داسې تنظیم د الکتروني جوړو په منځ کې زاویه اعظمی کړي اود هغوی تر منځ کې د دفعې قوه کوچنی ده. لاندې شکل وگورئ:



فعالیت

د BrF_3 د مالیکول هندسي جوړښت رسم کړئ او دهغه پریښست لاندې پوښتنوته ځواب ورکړئ.

- 1- د برومین اټوم څو الکترونه په پورتنۍ مرکب کې د اړیکو په تشکیل کې په کاروړي دي؟
- 2- څو جوړې ازاد الکترونونه د برومین په اټوم کې شتون لري؟
- 3- د برومین د اټوم د جوړه الکترونونو ټول تعداد به څومره وي؟
- 4- په پورتنۍ مالیکول کې د اړیکو تنظیم رسم کړئ او ددې جوړښت نوم ووايي.

۴- ۴: څلور سطحي مالیکولونه (څلور جوړې الکترونونه)

د خطي او مسطح مالیکولونو په باره کې معلومات حاصل کړي دي، څه فکر کوي چې آیا څلور سطحي مالیکولونه به هم موجود وي؟ په دې ډول مالیکولونو کې مرکزي اټوم د کوم ډول الکتروني جوړښت لرونکې دي؟

په څلور وجهی مالیکولونو کې، څلور جوړې الکترونونه د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي.

CH_4 , NH_3 , H_2O مالیکولونه او د NH_4^+ ایون د څلور الکتروني جوړې د خپل مرکزي اټوم په چاپیریال کې لري، دا الکتروني جوړې یو له بل څخه په ازاد شکل یا د ازادو جوړو په شکل او







یاد الکتروني جوړو په شکل د اړیکو په جوړېدو کې موجودې دي. د دې جوړو په منځ کې د دفعې قوه موجود ده؛ د دې لپاره چې دا قوه کمه شي، د هغوی مالیکولي اوریتالونه داسې تنظیمېږي کوم چې د هغوی په منځ کې زاویه لویه وي او له مرکزي اتم سره تړل شوي اټومونه یو له بل څخه لرې ځای ولري، د اړیکو تشکیل کوونکي الکتروني جوړې او ازادي الکتروني جوړې د څلور سطحې په راسونو کې مخامخ شوي دي، (4 - 6) شکل وګورئ.

په ټولو مالیکولونو کې، اټومونه د څلور سطحې په راسونو کې ځای نه نیسي، په CH_4 او NH_4^+ کې د مالیکول اټومونه څلور سطحې تشکیل کړي دي؛ خو د NH_3 مالیکول د تړلي گونال پیرامید شکل لرونکې دي، د اوبو مالیکول د زاویوي جوړښت لرونکې دي، د CH_4 په مالیکول او NH_4^+ په ایون کې ټولې اړیکې د اټومونو په منځ کې یو شان دي.

دکوولانسي اړیکو سره بیره د مالیکولونو د اټومونو په منځ کې نورې اړیکې هم شتون لري چې د کواردینیشن د اړیکو په نوم یادېږي، دا اړیکه د کوولانسي اړیکو سره څه توپیر نه لري او یو شان ارزښت لري. په هغه مالیکولونو کې چې د اټومونو په منځ کې د کواردینیشن اړیکې موجود وي، دا شکل مالیکولونه د څلور سطحې جوړښت لرونکې دي او د اټومونو د اړیکو زاویه په دې مالیکولونو کې 109.5° درجې د تتراهیدرال ولانسي زاویه ده. په امونیا کې د اړیکو په منځ کې زاویه له 107° درجو سره مساوي او په اوبو کې 104.5° درجې ده. د دې ټول تیروتنو لپاره د ولانسي زاویو د نظریه د انتظار څخه د باندې، علماو هر یو ژیلیسپی (*jillesspi*) او نایهولم (*niholm*) د ولانس د الکتروني جوړو د دفعې تیوري بې وړاندې کړه، څرنگه چې د اټومونو الکتروني ازادي جوړې د اړیکې د تشکیل کونکو الکترونو جوړو په نسبت هستې ته نژدې دي؛ له دې کبله دا الکتروني جوړې په قوي بڼه له نورو جوړو څخه دفع کېږي. د الکتروني جوړو په منځ کې دفعې د لاندې سلسلې پر بنسټ بدلون مومي.

د اړیکې جوړه/د اړیکې جوړه/ازاده جوړه > ازاده جوړه /ازاده جوړه
د الکتروني ازادي جوړې او د اړیکو الکتروني جوړو په منځ کې د دفعې قوه په امونیا NH_3 کې له دې لامل کېږي چې د α زاویه د څلور سطحې زاوې په نسبت (109.5° درجې) لویه او د β زاویه له څلور سطحې زاوې څخه ډیره کوچنۍ ده، لاندې شکلونه وګورئ:






(7-4) شکل د CH_4 , NH_3 , H_2O په مالیکولونو او NH_4^+ یون کې کیمیاوي اړیکې

د ولانسي الکتروني جوړو ترتیب په خلور سطحي کې له پورتنیو توضیحاتو سره سم د اوبو په مالیکول کې زاوې ۷ او د $109,5^\circ$ درجو په پرتله ډیرې لږې دي او په اوبو کې ($\text{H}-\text{O}-\text{H}$) د α زاویه د اړیکو تر منځ کې مساوي $104,5^\circ$ سره ده.

د SO_4^{2-} , SO_3^{2-} د ایونونو د مالیکول جوړښت هم تراهیدرال (Tetrahedral) دي چې په لاندې شکل کې لیدل کېږي:



(8-4) شکل د SO_4^{2-} او SO_3^{2-} د ایونونو جوړښت





فعالیت

په لاندې مرکبونو کې د اړیکو تنظیم د شکلونو د رسمونو له توضیحاتو سره سم عملي کړئ:

الف - XeF_2 ب - XeF_6 ج - SeO_3




زیاتي معلومات

د داسې مالیکولونو جوړښت چې په کې خو (5,6,7) ولانسي الکتروني جوړې هم شتون لري، دا ډول جوړښت هغه مالیکولونه لري کوم چې د هغوی مرکزي اټوم د دوهم او درېم لښو پریودونو د عنصرونو څخه دي چې په دې مورد کې د اوکټیت د پراختیا په اړه خبرې کېږي. د PCl_5 مرکب مالیکول د پنځه الکتروني اړیکو جوړښت دی چې د تریاگونل پیرامید جوړښت لري. د اړیکو ترمنځ کې یې زاویه 90° او 120° درجې ده او په مالیکول کې د کلورین دوه اټومه د پیرامید په میانه (منځنۍ) برخه کې ځای نیسي او د هغوی نور درې اټومونه د پیرامید استوایي موقعیت نیولي دي.





په همدې ترتیب د SF_6 الکتروني جوړه هم تنظیم شویده چې (4 - 9) شکل کې یې گورئ. سلفر هغه عنصر دی چې په VI اصلي گروپ کې ځای لري، د شپږو ولانسي الکترونونو له ډلې څخه څلور الکترونونه یې د اړیکو د تشکیل لپاره په کارېږي دي او له هغو څخه یوه الکتروني جوړه ازاد پاتې ده چې دا ازاده الکتروني جوړه په میانه کې عمود موقعیت لري او یا دا چې استوایي موقعیت یې نیولي دي. د هغوی ځای پر ځای کېدل په استوایي موقعیت کې د ټیلیپي (Jiltepi) او نیپولم (Niholm) له تیوري سره سمون لري چې د ازادو الکترونونو د جوړو اوریټال د اړیکو اوریټالونو په نسبت هستې ته ډیر نژدې راټول شوي دي.

الکتروني جوړې په دې تنظیم کې 120° زاویه له دوو اوریټالو سره او له دوو نورو سره د 90° درجو لاندې ځای لري.



(4 - 9) شکل Trigonal Bipyramid ولانسي الکتروني جوړې په ځینو مرکبونو کې






(10 - 4) شکل د اته مخي د سمت پيدا کولو الکتروني جوړې په ICl_6 او IF_6 کې د ClF_6 مالیکول جوړښت چې په (4 - 10) شکل کې ښودل شويدي، اړیکې او ازادي الکتروني جوړې د Trigonal Bipyramid جوړښت يې تشکیل کړي دي.

د ایوډین مرکزي اټوم (VI گروهه) د I_3^- د ایون د اړیکو جوړېدو لپاره له ټولو الکترونونو څخه یوازې دوه الکترونونه په کار وړي دي (ایوډین 7 الکترونه په خپل بانډیني مدار کې لري) د پنځو پاتې الکترونو له ډلې څخه او هم یوځای شوي الکترون په هغه بانډي چې دا ایون جوړوي ، د درې جوړو ازادو الکترونونو د جهت ورکولو لامل ګرځي. د پنځو الکتروني جوړو د تنظیم پرخوالي د ترای گونال منشور له جوړښتونو سره سمون پیدا کوي.

د SF_6 ، IF_3 مرکب او ICl_4^- ایون د مرکزي اټوم په چاپیریال کې د شپږو الکتروني جوړو

جوړښتونه نېي بيلگي دي او د ماليکولونو جوړښت يې اته مخيزه دي. د IF_6 ماليکول د مربع هرم شکل لرونکې دي؛ خو ازاى الکتروني جوړه شپږم موقعيت په اته مخيزه کې نيسي. د کلورين اټومونه په ICl_4 د مربع په راس کې تنظيم شويدي؛ خو ازاى الکتروني جوړې استوايي موقعيت په تکميل شوي اته مخيزه کې نيسي.


د IF_7 ماليکولونه د مرکزي اټوم په چاپېريال کې د اوو اوربیتالونو لرونکي دي او د اړيکو تنظيم يې د پېنځگونال پيراميد په بڼه دي، لاندې شکل وگورئ:



شکل د پنځه کونجې – منشوري جوړښت

فعاليت

لاندې شکله په څير سره وگورئ او لاندې ليکل شوو پوښتنو ته ځوابونه وړاندې کړئ:





(4 - 12) شکل د پنتافلورو فاسفیت فضايي جوړښت او فورمول

- 1 - د نوموړي مرکب ماليکولي جوړښت له کوم هندسي جوړښت سره سمون لري؟
- 2 - په دې مرکب کې فاسفورس هليريد کوم دي؟
- 3 - د فلورين د اړيکو په منځ کې ولانسي زاويه په کومه اندازه ده؟ فلورين د اړيکو په جوړېدو کې کوم ډول اوربیتالونه په کاروي دي.

۴-۵: د اوبو مالیکولي جوړښت د اوبو مالیکول غیر خطي دي

د اوبو مالیکول ډای پړل مومنټ لرونکي دي، که چیرې د اوبو مالیکول خطي وای، په دې صورت کې به د $O-H$ ډای پړل مومنټ به یو له بل سره متقابل جبران او د اوسو د مالیکول ډای پړل مومنټ به صفر وي چې مالیکول به یې قطبي نه وای. د ډای پړل مومنټ پدیده د اټومي اوربیتال په واسطه ټاکل کېږي چې د اړیکو په تشکیل کې برخه لري. که چیرې اکسیجن د اړیکو د جوړېدو لپاره P دوه اوربیتالونه په کار وړي وي، باید د اوبو په مالیکول کې د هغه د اړیکو زاویه له هایډروجن سره 90° درجې وي، مطالعې او علمي تجربې ښيي چې عملاً نوموړي زاویه 104.5° درجې ده، د اوبو په مالیکول کې د اکسیجن اټوم د sp^3 هایلبرید حالت لري چې په هغه کې دوه جوړې د اړیکو الکترونونه او دوه جوړې ازاد الکترونونه شتون لري. (4 - 13) شکل وگورئ:




(4 - 13) شکل sp^3 - hybridization اوربیتال د اوبو په مالیکول کې د تیریدري د زاوې (109.5°) او د اوبو د ولایسي زاوې (104.5°) د کمیت ترمنځ کې توپیر داسې روښانه کېږي چې د ازادو الکتروني جوړو د دفع قوه د اوربیتالونو د اړیکو الکتروني جوړو په نسبت لویه ده؛ له دې کبله دا زاوې یو له بل څخه توپیر لري.

لوپری فعالیت :

د اړیکو تنظیم او د مالیکولونو جوړښت په لاندې مرکبونو کې توضیح کړئ او د مالیکولونو هندسي شکل یې ولیکئ.

الف- F_2O ب- $SeCl_4$ ج- ICl_3 د- $COCl_2$ **دوهم فعالیت:**

لاندې شکل وگورئ او لاندې پوښتنو ته ځواب وړاندې کړئ:



(4 - 14) شکل د سلفر او هایدروجن اوریټالي شکلونه په H_2S کې

1 - په نوموړو مرکبونو کې د سلفر اټوم کوم هلیږد لري ؟


2 - د نوموړي مرکب د اړیکو زاویه ولې د اوبو د مالیکول د اړیکو د زاوې په نسبت ډیره ده ؟

3 - د نوموړي مرکب هندسي جوړښت توضیح کړئ.

۴-۶ : د امونیا د مالیکول جوړښت :

نایټروجن د اړیکو د جوړېدو په غرض د $2P$ د اوریټالونو درې طاقه الکترونه یې په کاروي چې په عمودي سطحې باندې شتون لري.

څېړنو ښودلې ده چې د امونیا په مالیکول کې د اړیکو تر منځ زاویه 107° درجې ده او د نایټروجن اټوم د $3P^3$ هلیږد حالت لرونکې دي ، د $3P^3$ له څلورو اوریټالونو څخه د هغه یو اوریټال د آزادو الکترونو جوړو په واسطه نیول شوی دی ؛ خو د هغه درې نور اوریټالونه د اړیکو الکترونو جوړو په واسطه ډک شوي دي.



(4 - 15) شکل د امونیا د مالیکول جوړښت

د امونیا د مالیکول د اړیکو په منځ کې د ولاسې زاویو قیمت (107° درجې) د تتراهایدریدال له حالت څخه (109.5° درجې) توپیر لري؛ ځکه د ازادو الکتروني جوړو د دفعې قوه د اړیکو د الکتروني جوړو د دفعې قواوې د اوربیتالي دوه گوني جوړو څخه قوي دي. (4 - 15) شکل وگورئ.

فعالیت :

د NF_3 په مرکب کې کوم ډول اړیکې د فلورین اتومونو د مرکزي اتوم (نايټروجن) تر منځ جوړې شوي دي؟ د غي مالیکول هندسي جوړښت له امونیا سره سمون لري که نه؟ د منطقي دلیلونو پر بنسټ په دې اړه توضیحات وړاندې کړئ.

۴ - ۷ : د مالیکولونو ډولونه (قطبي، غیر قطبي او ایوني) :

قطبي مالیکولونه کوم ډول مالیکولونو ته ویل کېږي؟ کوم عوامل د مرکبونو د مالیکولونو د قطبيت لامل گرځیدلي دي؟ د قطب (Polar) اصطلاح څه مفهوم لري؟ د مرکبونو د مالیکولونو قطبيت د تشکیل کوونکو اتومونو د اړیکو په څرنگوالي او دهمدی اتومونو پر الکترونیکیاتي خاصیت پورې اړه لري. د عنصرونو د اتومونو الکترونیکیاتي د قطبي اړیکو د جوړېدو لامل په مالیکولونو کې کېږي، کله چې د مالیکول یوه برخه قسمي منفي چارج او د هغه بله برخه یې قسمي مثبت چارج حاصل کړی، قطبي مالیکول جوړېږي. کله چې د عین عنصر دوه اتومونه یوه کووالنسي اړیکه تشکیلوي؛ د بیلګې په ډول (Cl_2 , H_2) د اتومونو هر یو یو شان الکتروني سهم د اړیکې په تشکیل کې لري. د الکتروني وریځې کثافت د دې اړیکې په دوو اتومونو کې یو شان دي، ځکه الکترونونه په مساوي ډول د دواړو اتومونو د هستو په واسطه جذب کېږي. دا ډول اړیکه غیر قطبي (NonPolar) ده او مالیکول غیر قطبي دي. کله چې د بیلابیلو عنصرونو دوه اتومونه یو له بل سره اړیکه وټري او مالیکول جوړ کړئ (د بیلګې په ډول: په HCl)؛ په دې صورت کې د دواړو هستو د جاذبې قوه یو شان نه ده، یو هسته مثبت



چارج په لرلو سره الکترونونه ځان ته کش کوي چې د الکتروني وړيځي کثافت په هغې باندې زیاتېږي، په پایله کې قسمي منفي چارج (δ^-) حاصلوي همدارنگه بل اټوم چې د هغه الکترونونه کش شويدي، باالمقابل قسمي مثبت چارج (δ^+) ځانته غوره کوي؛ د بېلگې په ډول، د HCl په مالیکول کې هایدروجن قسمي مثبت چارج او کلورین قسمي منفي چارج لرونکي دي چې د $H^{\delta+}Cl^{\delta-}$ په شکل لیکل کېږي.

هغه اړیکه چې د هغې په دواړو څنډو کې مثبت او منفي قسمي چارجونه شتون لري د قطبي اړیکې ($Polar\ Bond$) په نوم یادېږي او مالیکولونه د قطبي اړیکو لرونکي د دوه قطبي مالیکول ($Dipole$) په نوم یادېږي؛ څرنگه چې مخکې وویل شو: قسمي چارج په (δ) او فاصله په L سره ښیي، د بېلگې په ډول: $H^{\delta+}Cl^{\delta-}$



(4 - 16) شکل د الکتروني وړيځي کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبيت

د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج ($ParticleCharges$) $0.17 +$ دي او د کلورین اټوم قسمي منفي چارج -0.17 دي.

په عمومي ډول قطبي ډای پول مومنټ په μ ښودل کېږي نو دوه قطبي ډای پول مومنټ عبارت له قسمي چارجونو او د قسمي چارجونو د فاصلې حاصل ضرب څخه دی:

$$\mu = q \cdot l \quad \text{یا} \quad \mu = \delta \cdot L$$

په حقيقت کې د یو مالیکول ډای پول مومنټ د چارجونو نه تشابه کمیت اندازه په هغه مالیکول کې ده. دوه مخالف چارجونه چې د $\delta = 4.81010^{10} esu$ یا $\delta = 1.6 \cdot 10^{-19} Cb$ د کمیت لرونکي چې د $1A^\circ$ په فاصله یو له بل څخه شتون لري، لاندې ډای پول مومنټ لري:


$$\mu = 9.1 \cdot 10^{-18} esu.cm = 4.8 \cdot 10^{-8} esu \cdot 10^{-10} cm$$

$10^{-18} esu.Cm$ یو د ډبای ($Debye$) تعریف کړي دي؛ د بېلگې په ډول: د HCl په مالیکول کې د اړیکې اوږدوالي له $1.27A^\circ$ سره مساوي دي، د هغه ډای پول مومنټ $1.03D$ دی، د ویلو دي

پاتې نه وي چې $m.Cb = 0.33 \cdot 10^{-29} \text{ Debye}$ هم دي.

د HCl ماليکول يوه اړيکه لري او دا اړيکه قطبي ده، نو ماليکول به يې د يوې قطبي اړيکې لرونکې دی. هغه ماليکولونه چې مشابه دي او د يوې خطي اړيکې څخه زياتې اړيکې لري، دا اړيکې د يو او بل قطبي عمل خنثی کوي. سره د دې چې اړيکې قطبي دي؛ خو په کلي ډول ماليکول غیر قطبي دي چې بيلگې يې کولای شو CO_2 ، BCl_3 ، CCl_4 ورته ماليکولونه وړاندې کړو.

لاندې شکلونه پورتنی ماليکولونه ښيي، دهغوی د خطي اړيکو ډای پړل مومنت خنثی شويدي او د ماليکول عمومي ډای پړل مومنت صفر دي، دا ډای پړل مومنتونه په $\rightarrow$ افاده شويدي چې د تير لوري د ډای پړل په منفي سر پورې مخامخ شوي دي.




(4 - 17) شکل د ایستل شوو اړیکو ډای پړل مومنت او ماليکولونه په غیر قطبي ډول

ضروري معلومات



د ماليکول فضايي شکل د هغوی په قطبي والی باندې ډیر ه اغیزه لري؛ د بیلگې په ډول: په عمومي صورت د MX_3 ماليکول په نظر کې نیسو چې په هغه M مرکزي اټوم او X اټوم او یا د اټومونو د ګروپ څخه عبارت دي چې د هغه سره اړيکه لري؛ که چېرې د X اټومونه ټول یو شان وي (د بیلگې په ډول CO_2 ، BCl_3 ، CCl_4 ماليکول) او د M مرکزي اټوم د ازادو الکتروني جوړو لرونکې نه وي، حاصل شوي ماليکول غیر قطبي دي په هغه صورت کې چې مرکزي اټوم د ازادو الکتروني جوړو لرونکي وي، په معمول ډول اړیکو ډای پړلونه ایستل شوي نه وي او ماليکول قطبي اوسي، سره د دې چې پورتنی مطلب عمومي نه دي، دا پلیده د اوبو او امونیا ماليکولونه چې هغوی دواړه قطبي دي. په لاندې شکل کې وړاندې شوي دي.





4- 18) شکل د ایستل شوو اړیکو ډلی پول او مالیکولونه په غیر قطبي ډول

د بیلګې په ډول: د HF په مالیکول کې د الکتروني وړېځې کثافت د اړیکو په ساحه کې د فلورین اټوم ته ډیر نژدې او د هایدروجن له اټوم څخه لرې دي. ځکه د فلورین د اټوم الکترونګانیتي د هایدروجن د اټوم په نسبت زیاته ده، په دې مالیکول کې د منفي چارج د ثقل مرکز (چې له الکترونونو سره اړیکه لري) د مثبت چارج د ثقل مرکز (چې د هستې پورې تړلی دي) سره سمون نه لري.

فعالیت :



- 1- په پوریتینو فارمولونو کې د کاربن او کلورین په منځ کې اړیکه او د کاربن او اکسیجن په منځ کې اړیکې د اړیکو له کومو ډولونو څخه ده.
- 2- آیا مالیکولونه قطبي دي که نه؟ او د اړیکو په منځ کې زاویه څومره ده؟
د هغوی فضايي جوړښت رسم کړئ او د خپلو ټولګیوالو سره بحث وکړئ.



د څلورم څپرکي لنډيز

* په ماليکولونو کې مرکزي اټومونه عبارت له هغه اټومونو څخه دي چې د مرکبونو په ماليکولونو

کې د لوړ اکسیديشن شمېر يا ولاس لرونکي وي.

* د اړيکو جوړېدل د ولاسي قشر په جوړښت پورې اړه لري؛ يعنې د عنصرونو د اټومونو باندیني

قشر دي، چې په هغه کې ولاسي الکترونونه ځای لري.

* کله چې اټومونه يو بل ته نژدې کېږي، د هغوی د اټومو اورښتالونه سره تداخل کوی چې ماليکول اورښتالونه جوړوي. که چېرې د اړيکو الکتروني جوړې په هغوی ماليکولي اورښتالونو کې ځای ونيسي چې د ټیټې انرژي لرونکي وي، په دې صورت کې د کوولانت اړيکه تشکیلوي.

* (خطي) ماليکولونه: په ماليکولونو کې د اټومونو خطي تنظيم د الکتروني دوي جوړې يو له بل څخه اعظمی جلاوالی ټاکنوي.

* مسطح ماليکولونه: که چېرې د مرکبونو د ماليکولو په مرکزي اټوم کې درې جوړې الکترونونه ځای ولري؛ په دې صورت کې اړيکې په يوه سطحه کې قرار لري او د هغوی په منځ کې زاویه 120° درجې ده چې د مثلث په راسونو کې درې اټومه د مرکزي اټوم په چاپېريال کې شتون لري.

* د څلورو جهې په ماليکولونو کې د الکترونونو څلور جوړې څلور سطحي راسونو ته محاصره شوي دي.

* د اوبو ماليکول ډای پل مومنت لري، که چېرې د اوبو ماليکول خط بڼه درلودلی وای، په دې صورت کې $O-H$ د اړيکو ډای پل مومنت به يو پرل تالافې شوي وي او د اوبو د ماليکول ډای پل مومنت به صفر او ماليکول به قطبي نه وي. د ډای پل مومنت پدیده د اټوم د هغو اورښتالونو په واسطه ټاکل کېږي کوم چې د اړيکو په جوړېدو کې برخه لري.

* څېړنو ښودلي ده چې د امونيا په ماليکول کې د اړيکو ترمنځ زاویه 107° درجې ده او ډایټروجن د SP^3 هايبريد حالت لرونکې دي چې د SP^3 د څلورو اورښتالو له ډلې څخه د هغه يوه اورښتال د ازاد الکترونونو د جوړې په واسطه نیول شوي دي؛ خو د هغه درې نور اورښتالونه د اړيکو الکترونونو د جوړو په واسطه نیول شوي دي.

* هغه اړيکه چې د هغوی په دواړو خوا کې مثبت او منفي قسمي چارجونه شتون ولري، د قطبي

اړيکې (Polar Bond) په نوم يادېږي او هغه مالیکولونه چې د قطبي اړيکو لرونکي وي، د دوه قطبي (Dipole) په نوم يادېږي.

* د دوه قطبي ډلې پول مومنت د قسمي چارج او يو له بل څخه د هغوی فاصلي د ضرب له حاصل

$$\mu = q.L$$

څخه عبارت دي: $\mu = q.L$

د څلورم څپرکی پوښتي

څلور ځوابه پوښتي

1 - د مرکبونو په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه عبارت له هغه اټومونو څخه دي چې لرونکي وي.

الف- د اکسیدیشن منفي نمبر ب- د اکسیدیشن لوي مثبت نمبر

ج- د اکسیدیشن لوی منفي نمبر د- هېڅ يو

2 - د اړيکو جوړښت د اټوم په کوم جوړښت پورې اړه لري؟

الف- هسته ب- بانديني الکتروني قشر ج- ټول قشرونه د- ټول ځوابونه سم دي

3 - که چيرې ډايرکټ الکتروني جوړې د اوربیتالونو د مالیکولو د ټيټې انرژۍ په لږلو ځاي ونيسي

په دې صورت کې جوړوي.

الف- عنصر ب- کولانت ج- اړيکه د- ډکوارډینیشن اړيکه

4 - د څلور وجهی په مالیکولونو کې د څلور سطحي راسونو ته لوری ورکول

شوي دي.

الف- څلور الکتروني جوړې ب- دوه الکتروني جوړې

ج- درې الکتروني جوړې د- يوه الکتروني جوړه


5 - کله چې اټومونه يو بل ته نژدې کېږي، د هغوی اټومی اوربیتالونه يو بل کې ننوزي او

..... تشکیلوي.

الف- اړيکي مرکبونه ب- غیر عضوي مرکبونه

ج- اټومي اوربیتال د- مالیکول اوربیتال

6 - کوم يو لاندې شکل قطبي اړيکې رانښتي؟



الف - $CP^{\delta-} - C^{\delta+}$ ب - $O^{\delta-} - C^{\delta+}$ د- هېڅ يو

ج- الف او ب د واړه 7 - يو دبی (Debie)(D) داسې.....تعریف کړئ دي.

الف - $10^{-18} \text{esu} \cdot \text{cmL}$ ب - $10^{-18} \text{esu} \cdot \text{cmL}$ د- هېڅ يو ج - $10^{-20} \text{esu} \cdot \text{cm}$

8 - دلی پول مومنت پدیده د..... په واسطه ټاکل کېږي چې د اړیکې په جوړېدو کې برخه لري.

الف - د دافعه قوه ب - د جاذبه قواوي ج- انومي اوریتال د- مالیکولي جوړښت

9 - هغه اړیکه چې په دواړو خواو کې یې مثبت او منفي قسمي چار جوړښتونه لري د..... په نوم یادېږي.

الف - قطبي رابطه ب- $Polar\ Bond$ ج- الف او ب دواړه د- هېڅ يو

10 - PCl_3 د مرکب مالیکول د اړیکو دینځو الکټروني جوړو په لرلو د..... د جوړښت لرونکې دي.

الف - سطح ب - خطي ج - تراهلیدرال د- ترای گونال پیرامید

11 - د اومینا په مالیکول کې د اړیکو تر منځ زاویه د..... درجو سره مساوي ده او د نایټروجن اټوم..... هلیبرد حالت لرونکې دي.

الف - SP^2 او 120 ب- SP^3 او 107 ج- SP او 180 د- P او 90

تشریحي پوښتنې

1 - د هغه اټومونو مالیکولي فورمول ولیکئ کوم چې لاندې هندسي جوړښت یې تشکیل کړېدي.

الف - خطي ب - مثالی سطح



د- انه مخيره

ج- خلود و جهی

2 - د لاندې مطلبونو د پاره کوم لامل شتون لري؟

الف- دوه بيلايل مرکبونه د يو شان ماليکولي فورمول سره.

ب- د اتومونو فضايي موقعيت په BF_3 او NH_3 کې دي.

ج- ولې د NH_3 زاويه اوبو د ماليکول څخه لويه ده؟

3 - د اړيکو طبيعت او د هغوي فضايي موقعيت په لاندې مرکبونو کې وليکئ.

الف- CO_2 ب- HCN ج- NO_3^-

4 - د لاندې مرکبونو هندسي ماليکولي جوړښت وښايي.

الف- CO_3^{2-} ب- PCl_6^- ج- NO_2

5 - د ماليکولونو ډولونه توضيح کړئ.





د ماليکولونو ترمنځ قواوې

د کيمياوي مرکبونو د ماليکولونو په باره کې مو په تېرو درسونو کې معلومات حاصل کړي دي، ايا پوهېږي چې د مرکبونو د ماليکولونو ترمنځ کومې قواوې شتون لري، کوم چې هغوی يې يو له بل سره يوځای کړي دي؟ د والډر والس قوه څه شې ده؟ هلايدروجنې اړيکه څه ډول اړيکه ده؟ د قطبي ماليکولونو ترمنځ څه ډول اړيکې شته دي؟ که مرکبونه د مایع حالت لري، د هغوی د ماليکولونو ترمنځ کوم ډول قوه موجوده ده؟ او دا قوه د هغوی په فزيکي خواصو باندې څه اغېزه لري؟

هغه معلومات چې په دې څپرکي کې وړاندې کېږي، پورتنیو پوښتنو ته د قناعت وړځوابونه ورکوي او هم ماليکولونه د ټولو ځانگړتيا د اړيکو، ساختماني او فزيکي خواصو له کبله روښانه کوي.



۵- ۱: د کیمیاوي اړیکو ترمنځ توپیرونه او د مالیکولونو ترمنځ قوه

اتومونه د ایوني اړیکو او یا کووالانسي اړیکو پر بنسټ وصل کېږي او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه تشکیلوي. د ایوني اړیکو لرونکي ډیر مرکبونه په اوبو کې منحل دي او د هغوی محلولونه د اډو الکترولیتونو لرونکي دي چې الکترولیز کېږي، د کووالانسي مرکبونو مالیکولونه ډیر زیات په اوبو کې نه حل کېږي او که چیرې حل هم شي دمالیکولو په بڼه له د لوی کتلې څخه جلا کېږي، چې په محلول کې د هغوی مالیکولونه لیدل کېږي. کووالانټ مرکبونه په عضوي محلولونو، لکه: پریانون او کاربن تتراکلرایډ کې منحل دي.

څرنگه چې د کیمیاوي اړیکو په څېر کې چې مولو ستل: اتومونو د کیمیاوي مرکبونو د مالیکولونو په جوړښت کې ایوني، کووالانسي او یا د کواردینیشن اړیکو یې تشکیل کړي دي چې پردی بنسټ د مرکبونو مالیکولونه د خواصو له کبله سره توپیر لري؛ ځکه د اتومونو اړیکو په بیلابیلو مرکبونو مالیکولونه چې د بیلابیل جوړښتو او خواصو سره او بیلابیل جسمونه د بیلابیلو شکلونو سره جوړ کړي دي، په دې ډول جسمونو کې مالیکونه د یوې قوې په واسطه سره یو ځای او هغه جسمونه چې د بیلابیلو حالتونو لرونکي دي، تشکیلوي، د کیمیاوي اړیکو ترمنځ عمده توپیرونه او د مالیکولونو ترمنځ قوه کولای شو په لاندې ډول توضیح کړو: کیمیاوي اړیکې د ولانسي الکترولیتونو په بنسټ جوړېږي او د اړیکې د اتومونو ترمنځ کیدای شي، ایوني اوسې، مالیکولونه په ایوني اوقطبي شکل شته دي او د جذب د قوې په بنسټ د دې چې مالیکولونو په واسطه لوی کرستالي جسمونه تشکیلېږي. که چیرې دمالیکولونو د اتومونو په منځ کې اړیکه کووالانسي اوسې، دا ډول مالیکولونه د دای پړل مومنت، واندر والس قوه او دهایډروجنې اړیکو په واسطه سره یو ځای او مالیکولي جسمونه او یا مایکرو مالیکولي جسمونه جوړوي.

لاندي عبارت ته پام وکړئ.

په کیمیاوي اړیکو کې د اتومونو ولانسي الکترولیتونه برخه اخلي، مالیکولونه ایونونه او یا رادیکالونه جوړوي، خو مالیکولونه د بیلابیلو قوو پر بنسټ یو ځای شوي دي، لوی جسمونه جوړوي، دا قوای لاندي مطالعه کېږي.

۵- ۲: د مالیکولونو ترمنځ د جذب د قوو او ډولونه


په څلورم څپر کې کیمیاوي اړیکې (د کووالانټ اړیکو په بحث کې) د کووالانټ اړیکو لرونکو مالیکولونو د جذب قوې په اړه بحث وشو، د مالیکولونو ترمنځ د جذب د قو او بیلابیل ډولونه شته دي چې دا قوای لاندي مطالعه کوو. د اتومونو او مالیکولونو ترمنځ متقابل عمل بیلابیلو شکلونه



ليدل کيږي، چي د هغوی د اړيکو د جوړېدو لامل گرځي، د دوی له ډلي څخه د ډای پول- ډای پول متقابل عمل، د واندروالس قوه او هايډروجنې اړيکې دي.

۵- ۲- ۱: ډای پول متقابل عمل

په جامدو جسمونو کې د قطبي مالیکولونو د منظمو جوړښتونو د جوړېدو په غرض متقابل عمل سرته رسولی او د مالیکولونو ترمنځ د ډای پول متقابل عمل هغه وخت لیدل کیږي چې مالیکولونه یو بل ته نژدې شي؛ په دې صورت کې دا مالیکولونه مثبت او منفي قسمی چارجونه ځانته غوره کوي چې یو بل جذب او جامد جسمونه تشکیلوی. قطبي کرسټلونه په قطبي محلولونو کې په ښه توګه حلېږي، په کرسټالي شبکه کې د اړیکو د جلاکولو لپاره د اړتیا وړ انرژي له هغې اندازې انرژي په واسطه تامین کیږي کوم چې دا انرژي د منجمله مادې د قطبي مالیکولونو او د قطبي محلول د مالیکولونو ترمنځ د متقابل عمل په پایله کې ازادېږي.



(5 - 1) شکل د حلیلو بهیر

- 1 - په کرسټال کې پولار مالیکولونه
- 2 - د منجمله مادې پولار مالیکول
- 3 - د محلول پولار مالیکول


د کرسټالي شبکې د مایندو لپاره ضروري انرژي

$E_{\text{Solution}} = E_{\text{Solvation}}$ (انرژي)

دا ډول متقابل عمل $Solvation$ په نوم یادېږي، که چېرې محلول اوبه وي نو $Hydrations$ په نوم یادېږي.

فعالیت

- لاندې شکلونه په څیر سره وگورئ او د هغوی اړوند پوښتنو ته ځواب وړاندې کړئ:
- 1 - کوم مواد دا شکلونه لري؟ د دې ډول مواد سیت د ښوونکو په مرسته ترتیب کړئ.
 - 2 - د دافعې او جاذبې قواوې په نوموړو شکلونو کې وگورئ او د هغوی لامل روښانه کړئ.



۲-۲: د واندروالس او لندن قواوې


د مالیکولونو نژدې کیدل یا دملع یا جامد حالت له منځ ته راوړلو لپاره د هغوی ترمنځ تل د جذب قواوې عمل کوي. د گازونو د خواصو مطالعه په (1873) کال کې واندروالس یې دې پایلې ته ورسولې چې دغیر ایوني او غیر کووالنسي خواصو په پام کې نیولو سره د مالیکولونو ترمنځ د جذب او دفعې قوه شتون لری چې له دې قواو څخه کولې شو بیا پیل مفهومونه تر لاسه کړو خو په عمومي ډول دا قواوې د واندروالس د قوې بنسټ جوړوي .

د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د جاذبې قوه موجود ده. د لندن د تیوري په مطابق دا قواوې د مالیکولونو پر شپږه یز پو لاریزیشن پورې اړه لري چې د جذب قواوې د ثابت متقابل عمل لامل ګرځي. د واندروالس قواوې شکلونو د قطبي مالیکولونو ترمنځ د ډای پول - ډای پول متقابل عمل دي. د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د جذب قواوې هم شتون لري ، حنا د نجیبو گازونو اتومونو تر منځ هم ډیره ضعیفه د جذب قوه لیدل کېږي ، په ټاکلې ډول هغوی کولای شي ، ملع حالت ځانته غوره کړئ.

د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ واندروالس ځانګړې قوه عمل کوي چې هغه عبارت د نسېسیون (Nesersion) د قواو او یا د لندن (London) قوه ده، د دې قواو د منځته راتګ په (1930) م کال کې د فرېک پوه د لندن په نامه د تیوري په واسطه په لاندې ډول توضیح شوي ده :

د دوه غیر قطبي مالیکولونو ځای پر ځای کیدل د یو بل تر څنګه ګورو: څرنگه چې دا مالیکولونه

غیر قطبي دي، د الکتروني وریخي کثافت ویشل کیدل د دوي ترمنځ په مناسطه ډول دي؛ خو په ټاکلي لحظوي (شیشیز) مومنت کې د الکترونو ویش په مالیکولونو کې امکان لري غیر مناسطه وي؛ د بیلګې په ډول: په یو شیشه کې دا ډول مالیکولونه د ډای پړل مومنت ښکاره کوي. څرنگه چې په (2-5) شکل کې لیدل کېږي دا ډول شیشیز ډای پړل مومنت د دوو مالیکولونو ترمنځ هغه وخت منځته راځي چې ډیو مالیکول (A) د الکتروني وریخي کثافت د نږدی مالیکول (B) په واسطه جذب شي؛ په دې صورت کې دا دواړه مالیکولونه ډای پړلي مومنت تر لاسه کوي چې مالیکولونه یو بل جذب وي، څرنگه چې الکترونونه په ډیر چټکۍ حرکت کوي. دا جذب موقتي دي.




- 1 - د ټاکلي مومنت الکتروني وریخ کین لورته ځای په ځای شوي.
 - 2 - د الکتروني وریخ جذب رابښي چې کین خواته حرکت کوي.
 - 3 - د شیشیز ډای پړل لوري.
 - 4 - د قیاس شوي ډای پړل لوري.
- او همدا راز ځکه د A مالیکول وروستی ډای پړل مومنت کیدای شي مخالف لورته ولېږل شي او قیاس شوی مومنت ډای پړل د B په مالیکول کې داسې ځای په ځای کېږي چې د مالیکولونو ترمنځ جذب منځ ته راځي او خپله ډای پړل مومنت په یو شیشه کې لیدل کېږي؛ خو د هغوی مجموعي تاثیر متقابل عمل لري چې هغه د دایمي عمل کوونکي د جذب قواوو څخه عبارت دي.

فعالیت



- 1- لاندې شکلونه وگورئ او لاندې پوښتنو ته په گروهی ډول ځواب ورکړئ.
- 2- کله چې د دې ډای پول مومنت د منځته راتلو له پیل وروسته د منځ ته راښکته شوې ، نو هغه عامل چې د دې ډای پول مومنت منځته راتلو لامل ګرځي ، کوم دي ؟
- 3- د لاندې الف او ب شکل سره سم د مالیکولونو د A او B د اټومونو ترمنځ کوم مناسبات لیدل کېږي ؟ په دې اړه په گروهی شکل معلومات وړاندې کړئ.



(5-3) شکل د شیبیز د دوو قطبونو د منځته راتلو څرنگوالي د دوو مالیکولونو اودو اټومونو ترمنځ

د لندن د قواو په قوت باندې اغیزناکه عوامل

څرنگه چې د لندن قوه د ډای پول مومنت د منځته راتلو په پایله کې پیدا کېږي او هر هغه عامل چې په مالیکولونو کې د الکتروني ورځې ګډوډي زیاتوي ، دا ډای پول زیاتوي چې دا عامل عبارت دي له:

الف- د مالیکولونو حجم :

په مالیکولونو کې د الکترونونو د شمېر زیاتوالي او د هر اټوم په چاپېریال کې الکتروني فشارونو شمېر زیاتوالي او یا په یوه مالیکول کې د اټومونو زیاتوالي د مالیکول د حجم او د الکتروني ورځې


زیاتوالي لامل گرځي. هر څومره چې د الکتروني وړیځي اندازه زیاته اوله هستی څخه لرې واقع وي، د الکترونونو گډوډي زیاته او د لندن قوه هم منځ ته راځي، د لندن د قوه د قوت زیاتوالي د مالیکولونو د حجم په زیاتوالي کېدای شي چې د ویلي کېدو او د ایشیدو د ټکو په ځینې د دي مالیکولونو پرتله کولو پر بنسټ دلاندې فعالیت دگراف سره سم پیدا کړی.

فعالیت



لاندې گراف په څیر سره وگورئ او لاندې پوښتنو ته ځواب وړاندې کړئ.

- 1- د هلو جن د کوم عنصر د مالیکولونو د ایشیدو ټکی لوړ دي؟ د هغه لامل روښانه کړئ.
- 2- د هلو جن د کوم عنصر د مالیکولونو د ویلي کېدو ټکی لوړ دي؟ د هغه علت توضیح کړئ.



ب- د مالیکول کتله

د عادي هایدروجن (H)، د ډیتریم (D)، او تریشیم (T) مالیکولونه درې واړه غیر قطبي دي، د هایدروجن په دي درې واړو ایزوټوپونو کې د مالیکول حجم او په مالیکولونو کې د اړیکو اوږدوالی یو شان دي؛ خو درې واړو کتلی یو له بل څخه توپیر لري؛ نو له دی امله د هغوی د ایشیدو او ویلي کېدو ټکی توپیر لري؛ پایله اخيستل کېږي چې د مالیکولونو کتله هم د لندن د قواوو په قوت کې اغیزه لري (لاندې جدول وگورئ)



(5-1) جدول د هایدروجن د ایزوتوپونو ځنګ تیاوی

فرمول	د اړیکې اوږدوالی (pm)	مالیکولي کتله (g)	کیدو وېلي ټکی (K)	د ایشیدو ټکی (K)
(^1H)	74.14	2.00	13.957	20.39
(^2D)	74.14	4.03	18.73	23.67
(^3T)	74.14	6.03	20.62	25.04

ج- د مالیکول شکل او د تماس سطح

د ډبرو تماسو لرونکو سطحو مالیکولونه یو له بل سره نژدې او د لندن قوه چیره قوي ده، مسطح او خطي مالیکولونه د هر مې او کړو مالیکولونو په پرتله او زنځیري مالیکولونه د منځنیو او ښاخ لرونکو مالیکولونو په پرتله د سطحو تماسو ډبرو ټکو لرونکي دي؛ نو له دې امله د لندن قوه زیاته ده. لاندې جدول وگورئ:

(5-2) جدول د مالیکولونو د شکل اغیزه د لندن پر قوه باندې

لیکو ل فورمول	ساختماني فورمول	د وېلي کیدو ټکی ($^{\circ}C$)	($^{\circ}C$) د ایشیدو ټکی
C_4H_{10}	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$	-138	0
C_4H_{10}	$CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{ }}{CH} - CH_3$	-159	-12

فعالیت

په لاندې جدول کې د ځینو سپکو او درندو اویو ځینې فزیکي خواص درکړئ شوي دي تاسې د نوموړو اویو د خواصو تویسر پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې یې یادداشت او د دې تویرونو لامل روښانه کړئ.

(5-3) جدول د اوبو د ډولونو خواص

د ایشیدو درجه ($^{\circ}C$)	د ویلي کیدو ($^{\circ}C$)	مالیکول کتله	μ بالابر از ($^{\circ}C$) (D)	مالیکول فورمول
100	0	18.0151	1.84	H_2O
		20,0276	1,84	D_2O

زیاتي معلومات



د لندسڼ قوه نه یوازې په غیږي قطبي مالیکولونو کې، بلکې په قطبي مالیکولونو کې هم شتون لري اودا قوه خو ځله له ډای پول- ډای پول له اغیزې څخه لږه ده.

۲-۳: هایډروجنې اړیکه (Hydrogen Bond)


هایډروجنې اړیکه یو ډول ځانګړې کیمیاوي اړیکه ده چې د هایډروجن او الکټرونګانو عنصرونو (N, O, F) ترمنځ په هغه صورت کې جوړېږي چې د هایډروجن اټوم د همدې الکټرونګانيف عنصرونو سره اړیکه ولري. دا اړیکه د مالیکولونو ترمنځ هم تشکیلېږي، یا دا چې د هایډروجن د اټومونو او الکټرونګانيف عنصرونو د اټومونو ترمنځ په عین مالیکولونو کې (داخلی مالیکولي اړیکه) جوړېږي. څرنگه چې معلومه ده، هایډروجن لرونکي مرکبونه چې د هغوی په مالیکولي ترکیب کې غیږی فلزي الکټرونګانيف عنصرونه شتون ولري (F, N, O) د تیر ایستونکو خواصو لرونکي او د ایشیدو ټکی یې لوړ دي.

(0-۴) جدول د اګسیجن، نایتروجن او فلورین عنصرونو لرونکو دسلسلو مرکبونو د ایشیدو ټکي

د ایشیدو درجه	مرکبونه	د ایشیدو درجه	مرکبونه
$19^{\circ}C$	HF	$100^{\circ}C$	H_2O
$-84^{\circ}C$	HCl	$-60^{\circ}C$	H_2S
$-57^{\circ}C$	HBr	$-41^{\circ}C$	H_2Se
$-53^{\circ}C$	HI	$-2^{\circ}C$	H_2Te



خړنگه چې د پورتيټيو سلسلو په مرکبونو کې ليدل کېږي، د اوبو د ايشيدو درجه 100°C ده او اکسيجن دگروپ د نورو عناصرونو دمرکبونو د ايشيدو درجه ټيټه ده، د مرکبونو په بله سلسله کې د HF د ايشيدو درجه لوړه او د F_2 گروپ د نورو عناصرونو دمرکبونو ايشيدو ټکي ښکته دي، لامل يې دا دی چې د اوبو په ماليکولونو کې د اکسيجن او هايډروجن ترمنځ متقابل عمل شتون لري او همدارنگه په HF کې د هايډروجن د اټوم او د هايډروجن فلورايد HF د يو ماليکول د بل ماليکول د فلورين د اټوم ترمنځ متقابل عمل شته دی. د ماليکولونو ترمنځ دي متقابل عمل له امله، د دي مرکبونو د ايشيدو درجه لوړه تللی ده او مفريت يې ټيټ دی، د اټومونو د ډيبري الکترونيگاتيوي په پايله کې د $\text{H}-\text{N}, \text{H}-\text{O}, \text{H}-\text{F}$ اټومونو ترمنځ اړيکې ډيبري قطبي دي؛ نو له دی امله د هايډروجن اټومونه لږڅه مثبت چارج او د فلورين، اکسيجن او نايټروجن اټومونه لږڅه منفي چارج خان ته غوره کوی چې د کولمب قوه د مخالفو چارجونو ترمنځ عمل کوي، داسې چې د يو ماليکول د هايډروجن اټوم چې لږڅه مثبت چارج لري، د بل ماليکول د الکترونيگاتيف اټوم په واسطه کش کېږي، نوي اړيکه جوړېږي او ماليکولونه يو له بل سره اړيکه پيدا کوي.



هايډروجن اړيکه

(5-5) شکل هايډروجنې اړيکه الف - HF ، ب - امونيا، ج - يخ

۳-۲-۱ د هايډروجنې اړيکې ماهيت:

که څه هم دهايډروجنې اړيکې د ماهيت په اړه يو نظر شتون نه لري؛ خو په دي ځای کې د هغوی ځينی ځانگړتياوي د څيړنی لاندی نيسو چې ځانگړي بيلا بيلی ځانگړتياوي ددی قواو په هلاکله

وینیزنسی، په لاندې جدول کې د بیلابیلو مرکبونو د شو مالیکولونو او خواص یې چې هایدروجنې اړیکې لري، د هغوی ترمنځ د قواوې په ځانګړتیا سره په پرتلیزه توګه وړاندې شوي دي:


(5-5) د ځینو مالیکولونو فزیکي خواص

مالیکول	د مالیکول ترمنځ اړیکه	دهایدروجنې اړیکو اوږدوالي Pm	په مالیکول د اټومونو د اړیکو اوږدوالي Pm	دهایدروجنې اړیکې انرژي	د مالیکول دای پوړل مومنت μ	د اړیکې دای مومنت μ
HF	$F-H...F$	120	120	-19 kJ/mol	1.8D	1.9D
H ₂ O	$O-H...O$	170	100	-22 kJ/mol	1.82D	1.5D
H	$N-H...N$	220	90	-17 kJ/mol	1.47D	1.4D


د اړیکو د ډای پوړل مومنت دقو او پرتله رابنسې چې د اړیکو دقطبیت په زیاتوالي او په هر اټوم باندې د لږڅه چار جونو زیاتوالي د هایدروجنې اړیکو وړتیا زیاتوي، پردی بنسټ کېدای شي چې هایدروجنې اړیکه د ډای پوړل- ډای پوړل سره ورته دالکتروستاتیکي اهمیت لرونکې موندل شي.

د هایدروجنې اړیکې خاصه ځانګړتیا په دې کې ده چې درې اټومونه ($X-H...Y$) په یوه نېغ خط کې ځای نیول د اړیکې قوت زیات وي او هایدروجنې اړیکه جهټ (لوری) پیدا کوي، د دې اړیکې جهټ دهغې له کوولانسي اړیکې سره تړون لري؛ خو ایوني اړیکه د دې خاصیت لرونکې نه ده؛ ځکه د ایونونو ترمنځ قوه په ټولو جهټونو کې یو شان ده؛ خو بیا هم هایدروجنې اړیکه نه شو کولای، چې کوولانسي یا ایوني فرض کړو؛ ځکه په لومړي سترګې دهایدروجن اټوم د S اوربیتال لرونکې په خپل لومړي ولاړنسي قشر کې دي چې نشي کولای د یوې کوولانسي اړیکې څخه زیاتي اړیکې جوړې کړي او دبله طرفه د کوولانسي او ایوني اړیکې انرژي د $100 \text{ kJ} / \text{mol}$ څخه زیاته ده، په پایله کې هایدروجنې اړیکه سره له دې چې د ډای پوړل- ډای پوړل او کیمیاوي اړیکو سره ورته والی لري؛ خو د هغوی د هیڅ یو سره یو شان نه ده.

د هایدروجنې اړیکې انرژي $29 \text{ kJ} / \text{mol}$ - 21 ده او 10 تر 20 مرتبې پورې د کوولانټې اړیکو په پرتله ضعیفه ده خو څومرټې د واندروالس د قوې په تناسب ډیره قوې ده. هایدروجنې اړیکه د ډایمیرنونو₂ (HF) او (H₂O)₂ د جوړېدو لامل د براس په حالت کې کیږي، همدارنګه په فارمیک اسید کې هم ډای میر په لاندې ډول دي:



هائڊروجنې اړيکه په(---) افاده کوي هائڊروجنې اړيکه د عیني مالیکول په دننه کې تشکيلېږي؛ د بيلگې په ډول: د هائډروکسي بنزالدهياد په مالیکول د OH - د گروپ او کاربونيل گروپ ترمنځ اړيکه شته ده.



له دې امله د اورټوهائډروکسي بنزالدهياد د ايشيلو درجه د پارا هائډروکسي بنزالدهياد په پرتله $1,6^\circ\text{C}$ اندازه کمه ده؛ ځکه د پارا هائډروکسي بنزالدهياد د مالیکولونو ترمنځ هائډروجنې اړيکه شته ده.


لومړۍ فعاليت :

د (4 - 5) جدول په نظر کې نيولو سره ووايي چې د هائډروجنې اړيکې اوږدوالي زيات دي او يا دا چې د کوولانسي اړيکې اوږدوالي زيات دي؟ ايا د اړيکو اوږدوالي ترمنځ د $(X-H\cdots Y)$ شکل سره د Y او X د الکترونيگاتيويټي ترمنځ کوم ارتباط شتون لري که نه؟

دويم فعاليت :

د هائډروجن، فلورين، اکسيجن او نائيتروجن د اتومونو ترمنځ د واندروالس شعاع په ترتيب سره $155\text{ pm}, 120\text{ pm}, 10\text{ pm}$ ده، د واندروالس شعاعو مجموعه د اتومونو ترمنځ په $F\cdots F$ ، $H\cdots O$ ، $H\cdots N$ ، $H\cdots H$ اړيکو کې محاسبه کړئ او هم يې د هائډروجنې اړيکې له واقعي اوږدوالي سره پرتله کړئ، توپيرونه يې به څرنگه روښانه کړي؟

هائډروجنې اړيکه نه يوازې په کيميا کې بنسټيز رول لوبولی دي؛ بلکې په بيولوژي کې هم دا شان رول لرونکي ده؛ د بيلگې په ډول: هائډروجنې اړيکه د نوکليک اسيد د دوه گوڼي فز د جوړېدو لامل شوی او د ارثي معلوماتو انتقال په ژونديو اورگانيزمونو کې هم نامونوی.



(5-7) شکل د DNA مالیکول او هایډروجنی اړیکه

۵-۳: د موادو په فزیکي خواصو باندې د قواو اغیزې

د موادو د ذرو ترمنځ قوه (مالیکولونو، اټومونو او ایونونو ترمنځ قوه) د هغو په فزیکي خواصو باندې ښکاره اغیزه لري، چې لاندې د دې قواو اغیزه پر ځینې فزیکي خواصو باندې ځیرو.

۵-۳-۱: د مالیکولونو ترمنځ د جذب قواو اغیز د موادو دوولې کیدو او ګڼل کیدو په ټکي باندې:

د مسلولو د ایشیدو او ویلې کیدو عملیه عبارت د تودوخې او انرژي ورکول د موادو بلورونو ته ده ترڅو د موادو د پوښتنیالي انرژي چې هغوی یې یو له بل سره ښلولي دي؛ مغلوبه کړي.

د یادولو وړ ده دا چې د بلورۍ موادو ویلې کیدل او د براسو عملیه د موادو په تجزیې باندې په اټومونو او یا ایونونو او د کیمیاوي ټولو قواو د پوره له منځه وړلو لامل نه ګرځي، د کیمیاوي قواو او د موادو د فزیکي خواصو ترمنځ د اړیکو د پوهیدلو په اړه؛ د بیلګې په ډول: د ویلې کیدو او ایشیدو د ټکو لپاره لازمه ده چې د موادو د تشکیل کوونکو اجزاو دښلولو انرژي د موادو په درې ګونو حالتونو کې پرته شي.

د یو جامد جسم د براس کیدلو لپاره یوازې باید د معادلې انرژي مقدار، یعنې د دې دوو حالتونو د اختلاف انرژي دي جسم ته ورکړ شي.

بلوري مواد چې صرف د لندن قوه په واسطه سره کلک او راپورل شوي دي، په ټیټه تودوخه ویلې کېږي

دا چې د لندن قوه د ماليکولونو د قطبیت د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیري، زیاتره مواد چې د لوړو مالیکولونو لري، د لندن د قواوو په واسطه یوځای شویږي، په عادي تودوخه کې د مایع حالت لرونکي دي چې بېلګه یې کیدای شي $Ni(CO)_4$ ایشیدو ټکی CCl_4 ، ایشیدو ټکی N_3H_6 ټکی د ایشیدو له درجې سره وړاندې کیدای شي $77^\circ C$ په قطبي مایعاتو کې مالیکولونه د ډای پول او د هایدروجنې اړیکو د متقابل عمل په واسطه تړون لري او راټول شوي دي چې دا ډول اړیکې د لندن او اندروالس قواوو د اړیکو په پرتله ډیرې ټینګې دي؛ له دې کبله د دې ډول موادو د ایشیدو ټکی ډیر لوړ دي؛ د بېلګې په ډول: اوبه، مایع امونیا، سلفوریک اسید کلوروفارم د ډای پول – ډای پول او هایدروجنې اړیکو د لرلو له کبله یې د ایشیدو درجه لوړه ده.

ایوني مرکبونه د الکتروستاتیکي ډیري قوي توارو په واسطه چې د هغوی د مخالف چارج ایونونو ترمنځ شتون لري ، سره زیات متراکم شویږي. له دې امله نه شي کېدای چې د لږي انرژي په واسطه ایونونه یو له بل څخه لرې شي ، پر دی بنسټ د دې موادو د ولې کېدو او ایشیدو درجې لوړی دی. کله چې دې موادو ته توخه ورکړل شي ، د هغوی د کرسټل شبکې اړیکې د پری کېدلو په پایله کې ویلې او په پای کې په ایشیدو راځي.


د بلورۍ موادو د تشکیل کونکو ایونونو د برېښنايي چارج زیاتوالي د کرسټلي شبکې د انرژي زیاتوالي لامل ګرځي، چې په پایله کې دهغوی دوولې کیدو او ایشیدو درجې زیاتیري؛ دیلګې په ډول:

د NaF د ایشیدو درجه مساوي د $997^{\circ}C$ او له MgO د $2800^{\circ}C$ سره مساوي ده. هغه جسمونه چې په جامد حالت کې کوولانسي اړیکې ټینګې وي؛ خو د گاز په حالت کې کوولانسي ضعیفه اړیکې ولري، د هغوی د ویلي کیدو او ایشیدو درجې کیدای شي لوړی اوسي؛ دیبلګې په ډول: کاربن د الماس او ګرافیت په بڼه چې په $2200^{\circ}C$ څخه په لوړه تودوخه کې په ایشیدو راځي. ویلي کيږي له $1710^{\circ}C$ د الماس او ګرافیت په بڼه چې په $3700^{\circ}C$ کې تصعید کوي، سیلیکان ډلی اکسید چې په $1710^{\circ}C$ کې ویلي کیږي له $2200^{\circ}C$ څخه په لوړه تودوخه کې په ایشیدو راځي. په جامد حالت کې د کاربن د اټومونو څلور ګوني اړیکې په الماس کې د اړیکو له ډولو څخه دي، که چیرې د گاز حالت ځانته غوره کړي، د هغه د π په اړیکه چې یوه ضعیفه اړیکه ده، بدلون مومي.


(5 - 6) جدول د القلي فلزونو د هلاکیدونو د تفکیک انرژي په جامد، مایع او گاز فازونو کې په KJ/mol

مرکب	$M-X(g)$ $M^{+}(g) + X^{-}(g)$	$M-X(s)$ $M^{+}(g) + X^{-}(g)$	تصعید	نسبت
LiF	766	1033	268	
$LiCl$	636	845	209	
$LiBr$	615	799	184	
LiI	573	741	167	
$NaCl$	644	916	272	
$NaBr$	556	778	222	
NaI	536	741	205	
KF	506	690	184	
KBr	582	812	230	
KI	494	707	213	
RbF	477	678	201	
$RbCl$	498	686	192	
$RbBr$	463	661	213	

که چیرې د کوولانسي اړیکو تعداد په مایکولونو کې چې د گاز په فاز کې وي، د هغوی د جامد



حالت د اړیکو د تعداد سره مساوي وي او د هغوی سره عین ثبات ولري، د هغوی د براس عمل چټک او ساده ترسره کېږي، بیلګې یې کیدای شي د پولې میرونو اړیکې چې د تودوخې په سلاو درجو کې جوړېږي، وړاندې شي؛ د بیلګې په ډول: سور فاسفورس تصعید کوي، بیا بیرته په سپین فاسفورس ګڼګل کېږي:



(5-7) جدول د پوتاشیم او سینو زرو د هلایدنو دولي کیدو درجه

مرکب	دولې کیدو درجه	مرکب	دولې کیدو درجه
KF	880°C	AgF	435°C
KCl	776°C	AgCl	455°C
KBr	730°C	AgBr	434°C

فعالیت:



(5-8) جدول په څیر سره مطالعه کړئ، د لیکل شوو مرکبونو دولي کیدو درجه یو له بل سره پرتله کړئ، د هغوی ولې کیدو او ایشیدو تودوخې درجو کموالي او زیاتوالي لامل توضیح کړئ اوهم د هغوی د توپیر خرنګوالي د دلیلونو پرنسټه وړاندې کړئ.

(5-8) جدول د القلي او ځمکنی القلي د هلایدنو د ولیدکیدو او ایشیدو درجې

مرکب	دولې کیدو درجه	مرکب	د ایشیدو درجه	دولې کیدو درجه
KBr	730°C	CaBr ₂	1380°C	765°C
CsF	684°C	BaF ₂	1250°C	1280°C
				2137°C

۵- ۳- ۲: په انحلايت باندې د قواو اغيزه :

انحلايت اود حل شورو جسمونو نور ځانگړتياوې پېچلې موضوع ده ،په دې ځاى کې يوازې لنډه توضيحات وړاندې کېږي.

د غير قطبي جسمونو محلولونو په غير قطبي محلولونو کې د محلولونو ډېر ساده ډول دي، هغه قراوې چې د حل کېدونکې مادې او محلل ترمنځ په محلولونو کې شتون لري ، د لندن د قواوې ډول دي او ضعيفه ده، د دې قواو شتون د حل کېدونکې مادې او محلل ترمنځ چې د دې دوو موادو د انحلايت او نښلېدو لامل گرځي ، د دې محلولونو توپير د ايډيالو گازونو د محلولو سره نيسي .

په ايډيال محلولونو کې د غير قطبي ماليکولونو لرونکي جسمونه ، ايرزي مرکبونه، ډير قطبي محلولونه ؛ لکه اوبه شتون لري. د دې لپاره چې يو ايرزي مرکب په محلل کې بڼه حل شوي وي، بايد په کرسټلې شبکې کې د ايرزي ذرو ترمنځ د جذب قواو باندې غلډه حاصل کړي او د ايرزونو ترمنځ د الکټروستاتيکي جاذبه انرژي بايد مغلوبه شي، په محلولونو کې چې د حل شوی مادې ايرزونه د لوړ ډالۍ الکټريک د ثابت لرونکي د محلل په واسطه (بيلگې په ډول $CH_2O = 87^\circ$) جلا کېږي، د دې ايرزونو ترمنځ د جاذبې قوه لږه ده او په اسانۍ يو بل نه شي جذبوي او رسوب نه تشکيلېږي ، نوموړی قوه کېدای شي چې د کولمب د قانون پر بنسټ توضيح کړای شي :

$$F = K \frac{q_1 \cdot q_2}{\epsilon^0 \cdot r^2}$$

په دې فارمول کې F د مخالف علامه ايرزي ذرو ترمنځ د جذب قوه، K ثابت، q_1 او q_2 د چارجونو اندازه، r د دوو چارجونو فاصله او ϵ^0 د محلل د ډالۍ الکټريک ثابت رانښيي .

د محلل د انحلايت وړتيا يو عامل د هغه له کوارډينيشن څخه عبارت دي چې د حل کوونکو موادو د ماليکولونو د مرکزي اتومونو سره بې ترسره کوي ، قطبي محلولونه د منحلې مادې د کيټونونو سره ډير بڼه کوارډينيشن کېږي او د هغه د حل کېدو نور عوامل په محلولونو کې د شاملو ايرنونو ځانگړتياوې؛ لکه اندازه، د محلل د ماليکولونو د اړيکو د جوړېدو وړتيا له ايرنونو سره او د نوموړو ايرنونو جسامت پورې اړه لري ، د کرسټلې شبکې انرژي هم د مرکزي ايرن پر جسامت

پوري اڙه لري کوم چي په کرسټلي شبکه کې شته دي. په کرسټلي شبکه کې موجودي قواوي (ايون - ايون) دمحل د ماليکولونو او ورته دږدی ايون ترمنځ قواوي (ايون - ډای پولې) ډير قوي دي، که چيري د کرسټلي شبکې انرژي د سلويشن په پرتله لوړه وي، د داسې محلولونو محيط سور دي، که چيري د کرسټلي شبکې انرژي په محلولونو کې د سلويشن (Solvation) د انرژي په پرتله ډيره ټيټه وي، د محلولونو محيط گرم دي.



د پنځم څپرکي لنډيز

■ د بيلابيلو مرکبونو ماليکولونه بيلابيل خواص او جوړښت لري او بيلابيل جسمونه په بيلابيل شکلونو جوړوي، په داسې جسمونو کې ماليکولونه د يوې قوه پر بنسټ سره يو ځای شوي او جسمونه يې د بيلابيلو حالتونو په لرلو سره تشکيل کړلای.

■ په کيمياوي اړيکو کې د اتومونو ولاړنسي الکترونونه برخه لري، ماليکولونه، ايونونو او يا راډيکالونه يې جوړ کړلای؛ خو ماليکولونه د بيلابيلو قواو پر بنسټ سره يو ځای او، لوی جسمونه يې تشکيل کړي دي.

■ د اتومونو او ماليکولونو ترمنځ د متقابل عمل بيلابيل شکلونه شته دي چې د هغوی ترمنځ د اړيکو د جوړېدو لامل گرځي، د هغو له ډلې څخه د ډای پول- ډای پول د قوه متقابل عمل، د واندروالس د قوه متقابل عمل، د لندن د قوه متقابل عمل او د هايډروجنې اړيکې له متقابل عمل څخه عبارت دي.

■ په جامدو جسمونو کې قطبي ماليکولونه د منظمو جوړښتونو د جوړېدو په غرض متقابل عمل يې سرته رسولی، د ډای پول- ډای پول متقابل عمل هغه وخت ليدل کېږي چې ماليکولونه يو له بل سره نژدې شي، په دې صورت کې دوی يو بل جذب او جامد جسمونه تشکيلوي.

■ په کرسټلې شبکه کې د اړيکو د جلاکولو لپاره ضروري انرژي د هغه اندازې انرژي په واسطه ټاينښت کېږي کوم چې د انرژي د منحلې مادې د قطبي ماليکولونو او د محلل قطبي ماليکولونو د متقابل عمل په پايله کې ازادېږي.

■ د غير قطبي ماليکولونو ترمنځ د جذب قوه شته ده، د لندن د تيوري سره سم دا قوه د ماليکولونو په شېبه بې پو لارښښ پورې اړه لري کوم چې د جذب د قواوو د ثابت متقابل عمل لامل کېږي هايډروجنې اړيکه يو ډول خاصه کيمياوي اړيکه ده چې د هايډروجن او نورو الکټرونيگاتيټيف عنصرنو ترمنځ په هغه صورت کې جوړېږي کله چې د هايډروجن اټوم له همدې الکټرونيگاتيټيف عنصرنو سره اړيکه ولري.

■ بلوري مواد چې صرف د لندن د قوي په واسطه سره کلک شوي وي، په ټيټه تودوخه کې وېلي کېږي او له هغې څخه حاصل شوي مایع په اسانۍ سره په ايشيدلو راځي.

■ کله چې په محلولونو کې د موادو د ايونونو ترمنځ د جاذبې قوه لږه وي او په اسانۍ سره يو بل جذب نه شي کړای، رسوب نه تشکيلېږي، داعمل اومحل د محلل ډای الکټريک د ثابت لوي

والي ته هم اړه لري ، نوموړي قوه کولاي شو د کولمب د قانون په واسطه توضيح کړو:
 ■ د بلوري موادو د جوړونکو ايزونو د برېښنايي چارج زياتوالي د کرسټلي شبکې د انرژي د زياتوالي لامل گرځي او د هغوی د وييلې کيدو او ايشيدو درجي لوړېږي.

د پنځم څپرکي تمرين څلور خوا به پوښتي

- 1 - د لويو جسمونه ماليکولونه د يو..... پرېنسيپ سره يو ځای شوي او جسمونه چې..... لرونکي دي ، جوړ کړي دي.
- الف- قوه، بيلابيل حالتونه
 ب- اړيکه، بيلابيل حالتونه
 ج- الف او ب دواړه
 د- هيڅ يو هم
- 2 - ماليکولونه د بيلابيلو قواو پرېنسيپ يو له بل سره يو ځای شوي دي..... جسمونه يې تشکيل کړي دي.
- الف- کوچني مواد ب- لوی جسمونه ج- ايزونو د- ټول سم وي.
- 3 - د کومو عناصرونو شتون د مرکبو په ماليکولونو کې د هايډروجنې اړيکې لامل د ماليکولونو ترمنځ گرځيدلي دي.
- الف- نايټروجن، اکسيجن، فلورين او هايډروجن ب- يوازي اکسيجن
 ج- يوازي فلورين د- هايډروجن
- 4 - د هايډروجنې اړيکو د جوړېدو حتمي شرط به له لاندې موادو څخه کوم يو وي؟
- الف- هايډروجن شتون ب- درې الکترونينډگانټيف عناصرونو(فلورين، اکسيجن، نايټروجن) شتون او هايډروجن اړيکه د همدې عناصرونو د مرکبو په ماليکول کې
- ج- الف او ب دواړو د- هيڅ يو
- 5 - بلوري مواد چې صرف د لندن قواوو په واسطه يو له بل سره کلک شوي وي په تودوخه ويلې او د هغوی حاصل شوي مايع..... په ايشيدوارځي .
- الف- ښکته په اسانې ب- تودوخه، په مشکل
 ج- متوسط، سست د- ډير لوړ، ساده
- 6 - داړيکو ډير پکيدلو ضروري انرژي په کرسټالي شبکو کې له هغه مقدار انرژي په واسطه تايمين کيږي کوم چې دا انرژي د حل کيدونکو موادو د قطبي ماليکولونو او دمحلل د قطبي ماليکولونو له مقابل عمل څخه..... کيږي.

الف - ختي ب - آزاد ج - جذب د - الف او ب دواړه

7 - زيات مواد چې د لوړو ماليکولونو لرونکي دي او د لندن د قوه پرنسب يو له بل سره متر اکم شويدي، په عادي توډوخه کې لرونکي دي .

الف - جامد حالت ب - گاز حالت

ج - مایع حالت د - پلازما حالت

8 - هغه جسمونه چې په جامد حالت کې کورولانسي اړیکې یې کلکې کړي دي؛ خو د گاز په حالت کې کورولانسي ضعیفې اړیکې لري؛ د هغوی د ویلې کیدو او ایشیدو درجې کېدای شي.

الف - لوړ ب - ټیټی ج - متوسط د - ډیر ښکته

9 - د بلوري موادو د تشکیل کونکو آیونونو د بریښنا چارج زیاتوالي د کرسټلي شبکې د انرژي د زیاتوالي لامل ګرځېدلي اود هغوي د ویلې کیدو او ایشیدو درجه کوي.

الف - ښکته والی ب - پورته والی

ج - بدلون نه کوي د - فوق العاده ښکته والی

10 - که چیرته له کورولانسي اړیکې د گاز د فاز په مالیکولونو کې د هغوی د جامد حالت د اړیکو د شمیر سره مساوي دی او هغوی ته عین ثبات ورکړی وي د هغوی د براس عمل

او ساده تر سره کېږي.

الف - چټک ب - سست ج - ډیر کمه د - هېڅ یو

تشریحي پوښتنې

1 - د هایډروجنې اړیکې د جوړیدو لپاره کوم شرطونه لازم دي؟ په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.

2- لاندې موادو د مالیکولونو په منځ کې د قواو کوم شکلونه لیدل کېږي؟

الف- HF ب- Br_2 ج- ICl د- HF

3 - د اوبو د ایشیدو درجه $100^\circ C$ او د اکسیجن عنصر د نورو هم ګروپو عنصرونو مرکبونو د ایشیدو درجه ښکته ده؛ همدارنګه د فلورین د نور هم ګروپو. عنصرونو مرکبونو په بله سلسله کې د HF د ایشیدو درجه $19^\circ C$ ده او د نورو عنصرونو مرکبونو د ایشیدو درجه ښکته ده، د هغه لامل

توضیح کړئ.

4 - لاندې مرکبونه د ایشیدو د درجې د لوړېدو پر بنسټ تنظیم کړئ او خپل حل توضیح کړئ.

الف- $OH - C_4H_9$ ب- $CH_3 - CH_2 - CL_2 - CH_3 - CH_3$ ج- $CH_3 - CCH_3$

د- N_2


5 - د مسوادو د ذرو ترمنځ د جذب قوه د هغوی د ویلې کیدو او ایشیدلو پر درجه باندې څه اغیزه لري؟ معلومات ورکړئ.

6 - د موادو په انحلالیت کې کومې قواوې اغیزه لري؟ معلومات وړاندې کړئ.

7 - کوم فکتورونه د ایزونو په انحلالیت کې موثر دي؟ دای الکتریک څه شې دي؟ په دې اړه معلومات ورکړئ.

8 - د کیمیاوي اړیکو او مالیکولي قواو ترمنځ کوم توپیر شتون لري؟ په اړه یې معلومات ورکړئ.

د مادي حالتونه



په خپل چاپېریال کې بیلابیل مواد په بیلابیلو حالتونو کې گوري، یا پوهېږي چې مواد په طبیعت کې په څو حالتونو پیدا کېږي؟ د مادي حالتونه پر کومو شرايطو پورې اړه لري؟ مواد په بیلابیلو حالتونو کې د کومو خصوصیاتو لرونکي دي؟ د مادي د گاز، مایع او جامد حالت څرنگه یو پر بل بدلون لاري شي؟ د مادي د حالتونو په بدلونونو کې کوم شرایط بنسټیز رول لرونکي دي؟ د دې فصل په لوستلو کېدای شي د مادي د حالتونو په اړه معلومات حاصل، پورتنۍ پوښتنو ته ځواب وړاندې او هم د دې ډول پوښتنو بیلگې حل کړای شي .




۶- ۱: جامدات مایعات او گازونه

هره ماده کو لای شي چې د محیطی شرایطو په څرنگوالی سره درې حالتونه (جامد، مایع او گاز) ولري، که څه هم مواد په عادی حالت کې د گاز په حالت ډیر لږ پیدا کېږي، خو گازونه د ځانګړي اهمیت لرونکي دي؛ د بیلګې په ډول: ژوندي موجودات د هغوی له ډلې څخه انسانان د گازي محلول په دننه کې ژوند کوي. دځمکې اتموسفیر دگازونو مخلوط دي چې د هغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی ده. گازونه هغه مواد دي چې د هغوي تشکیل کوونکي ذري یو پر بل باندې لږه اغیزه لري او د هغوی د ذرو د جذب قوه ډیره ضعیفه او نامنظم حرکت لری. په لوړه تودوخه او لږ فشار کې د گازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د گازونو له خواصو څخه توپیر لري.

د گازونو کثافت ډیر لږ دی، په داسې حال کې چې د جامدات کثافت لوړ دی، گازونه د فشار په پایله کې متر اګم کیدای شي؛ خودجامداتو د تراکم کیدلو خاصیت کوچني دي؛ ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه دگازونو په پرتله څو ځلې زیاته ده. جامدات کلک او ماتیدونکی دي؛ په داسې حال کې چې گازونه د دا ډول خواص لرونکي نه دي.

مایعات د جامداتو او گازونو په نسبت ځانګړي خاصیتونه لري؛ د بیلګې په ډول: د مایع په حالت کې د موادو د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره زیاته ده، خو د جامداتو په پرتله کمزوري ده. لاندې شکلونه د موادو ذري په درې حالتونو کې ورنښي:



(6 - 1) شکل جامد، مایع او گاز حالت

د جامد او مایعو حالتو لرونکي مواد څه نا څه یو شان کثافت لري چې بیلګه یې کیدای شي د اوبو د جامد، مایع او گاز (د اوبو براس) حالت کثافت وړاندې شي. لاندې جدول وګورئ:

(6-1) جدول په بیلابیله تودوخه کې د اوبو درې حالتونه

حالت مشخصات	مایع اوبه	جامدې اوبه	د اوبو ګاز (براس)
کثافت	0.997 g / cm^3	0.9168 g / cm^3	3.26 g / cm^3
د تودوخې درجه	25° C	0° C	400° C

۶-۱-۱: د جامداتو ځینې لومړنۍ لیدنه

د جامداتو ساده تعریف د موادو لپاره دا دی چې یوه جامده ماده ټاکلې شکل او حجم لري ، په بل عبارت د جامدو موادو شکل او حجم د لوښې د حجم او شکل تابع نه دي، د جامدو موادو پوره تعریف دا دی چې د جامدو موادو تشکیل کوونکي اجزای په ځانګړې نظم سره یو له بل پسي اویو د بل تر څنګ ځای لري، یا د جامداتو پورتنۍ تعریفونه یو له بل سره سمون لري؟ ځواب به داوي چې په ځینو برخو کې یو له بل سره یو شان نه دي.


۶-۱-۲: بلورونه (Crystal)

یو د جامداتو د روښانه ځانګړتیاو څخه د هغوی کرسټلې بڼه ده چې بلوري جوړښت لري. په بیلابیلو بحثونو کې د اتومونو د نظام په اړه د اتومونو یو درې بعدي جوړښت په یو جامد کې خبرې شوي دي، دا درې بعدي جوړښت ته یوه بلوري شبکه وايي، د بلوري شبکو شکلو ته او ټولونه په لاندې ډول دي.

۶-۱-۲-۱: فضايي شبکه

د ټکو منظم هندسي جوړښت په فضا کې د فضايي شبکې په نامه یادېږي، په (6-2) شکل کې د فضايي شبکو یو شکل لیدلای شې چې د خطونو په واسطه یو له بل سره تړل شوي دي، که چېرې خیال شي چې د اوسپنې د اتومونو وصل کیدل په دې شبکې کې شتون لري ، په داسې شکل چې د اوسپنې د هر اټوم مرکز د یوې نقطې له پاسه په دې شبکه کې واقع وي ، دلته د اوسپنې د بلور یوه برخه لیدل کېږي چې هغه د نوموړي شکل په ښی خوا کې لیدل کېږي :






(۶-۲) دشبکې بلوري فضايي شبکه

يوه بلوري شبکه کيدای شي د يوې فضايي شبکې په شکل خيال شي چې په هغې کې بيلابيلې نقطې د اتومونو، ايونونو او يا ماليکولونو او يا د هغوي گروپونو نښولې وي. د ذرو جوړښت په يوه بلوري شبکه کې په متوالي ډول په يوه درې بعدي شبکه کې تکرارېږي چې ترڅو دهر واحد بلور فزيکي سرحدونه لاس ته راشي.

د يوې بلوري شبکې د توصيف په غرض ضرور دي چې سلول او يا واحد حجره تعريف کړو: يوه واحد حجره د بلوري شبکې هغه برخه ده چې د هغې په حرکت ورکولو د ټاکلو قاعدو سره سم کيدای شي چې بشپړه بلوري شبکه ترلاسه شي.


هغه واحد حجره چې معمولاً د فضايي شبکې لپاره ټاکل کېږي، د ټاکلي شکل لرونکې ده، دا حجره د شپږو مخو څخه جوړه شوې ده چې د هغوي هر وجهه يوه متوازي الاضلاع ده. (۶-۳) شکل يو ساده مکعبی شبکه او يوه واحد حجره راښيي چې په دې مکعبی واحد حجره کې د هغې په هر څنډه کې يو اړي يو ټکي شته دي او د ساده مکعبی واحد حجرې په نوم يادېږي، همدا رنگه دا مکعبی واحد حجره يوه بنسټيزه واحد حجره ده.




(۶-۳) شکل يوه ساده مکعبی فضايي شبکه او د هغې حجروي واحد

دوه ډوله مکعبی فضايي شبکې شتون لري چې د هغوی واحدې حجرې معمولاً مرکز لرونکې او يا غير متناظر دي، (۶-۴) شکل په شان) مرکز لرونکې مکعبی واحدې حجرې د اتومونو له اتو نقطو سر بيره چې د مکعب په څنډونو کې ځای لري، د مکعب په مرکز کې د يوې بلې نقطې لرونکې هم

دتي او هم د هغه په هرومخ کې يوه نقطه شته ده ، د دې حجرې واخلونو د هريو لپاره دوه مودله وړاندې شوېدي چې د توپ او ميلې مودل او بله بې غچې کړې دي.



(4 - 6) شکل درې مکعبې حجرې واخلونه توپ او ميله ، لږې کړې



(5 - 6) شکل ساده مکعبې فضايي شبکه او د هغه حجرې واحد

(5 - 6) شکل کې يوه مکعبې واحده مرکز لرونکې حجره له مخ سره (نا اصلي) ليدل کېږي او هم يوه واحده حجره ليدل کېږي چې اصلي حجره ده .

فعاليت




د څو پلاستيکي گولو او له مناسب سربس څخه په گټه اخيستلو سره ، ساده ، مرکز لرونکي او دمخ ډکې مکعبې حجرې جوړوي او هغه وښيي .



په کرسټلونو کې د ذرو کلک نښېدل

په ډیرو زیاتو بلوري شبکو کې د اتومونو ترتیب د نښلیدو په بڼه کلک او متراکم شوي دي، په بل عبارت د اتومونو د یو ځای کیدو سطح په بلوري شبکه کې لوړه ده؛ د بیلګې په ډول: د واحدې حجرې حجم چې د اتومونو په واسطه نیول شویږي، ټاکل کېږي.

مثال: د ارګون په جوړښت کې له (6 - 6) شکل سره سم تېلور کېږي. د اتومونو د ذرو د یو ځای کیدو سویه په جامد ارګون کې محاسبه کړئ.



(6 - 6) شکل ارګون د یو مکعبی جوړښت له مرکز لرونکې وجهې سره

الف - د لویو کرو مودل، ب - دا ډول مودل د اتومونو په مکعبی واحدو حجرو کې ښودل شوي دي. حل: په لومړي سر کې هغه حجم چې د کروي جامدو اتومونو په بنسټیزه واحد حجره کې نیولې دي، محاسبه کېږي، د دې لپاره لازمه ده تر څو پیدا کړو چې د ارګون څو اتومونه په هر واحد حجره کې ځای لري، د هرې حجرې په راسونو کې اته اتومه او د خپلې سطحې په مرکزونو کې شپږ اتومه لري، خو د واحدې حجرې د راسونو څخه یو، د اوو (۷) نورو واحدو حجرو لپاره راسونه هم دي؛ نو له دې کبله یوازې $\frac{1}{8}$ برخه راس د هر اتوم د یوه واحد حجره پورې اړه لري، همدارنګه هر یو شپږ اتومونه چې په مرکز کې شتون لري، د دوه نږدې واحدو حجرو ترمنځ نیمایي برخه یې هرې حجرې ته اړه لري.

څرنگه چې اته اتومونه په راسونو او شپږ اتومونه د واحدو حجرو د سطحې په مرکزونو کې شته

دي، د ارگون د اټومونو مجموعي شمير چې پر هري حجرې پورې اړه لري، د راسونو له اټومونو څخه عبارت دي چې په لاندې ټول محاسبه کېږي:

$$8 \cdot \frac{1}{8} = 1 \text{ د راس اټومونه}$$

$$6 \cdot \frac{1}{2} = 3 \text{ د سطح د مرکز اټومونه}$$

د اټومونو مجموعي شمير د هرې پورې حجرې په في واحد کې $1 + 3 = 4$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ د کرې حجم}$$

په جامد ارگون او يا هغه مرکبونه چې د مکعبې مرکز داره وجهي جوړښت لري، هری واحدې حجرې سره څلور اټومه اړه لري.

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{16}{3} \pi r^3 \text{ د څلور کروي اټومونو حجم}$$

اوس د واحدې حجرې حجم د r پرنسپټ پيدا کړو، د (6-6) شکل پرنسپټ کولاي شو پيدا کړو چې د بېړي واحدې حجرې د بېړي وجهي قطر له $4r$ سره مساوي دي؛ له دې کبله له رياضيکي فورمولونو څخه په گټه اخيستلو سره کيداي شي چې د بېړيال (e - د دوو مستويو يا په متوازي السطوح منشور او هرم کې د دوو وجهي گډه فصل د پال په نوم ياد وي)، په لاس راوړو:

$$(4r)^2 = e^2 + e^2 \quad \text{پس} \quad 2e^2 = 16r^2 \\ e^2 = 8r^2 \quad \text{او} \quad e = 2r\sqrt{2}$$

څرنگه چې د واحدی حجرې حجم (V_{cell}) $V_{\text{cell}} = e^3$ دی؛ نو حاصل کېږي چې:

$$V = [2r\sqrt{2}]^3 = 16r^3\sqrt{2}$$

د واحدې حجرې د حجم نسبت چې د ارگون اټومونو نيولي دي عبارت دی له:

$$\frac{V}{V_{\text{cell}}} = \frac{16/3\pi r^3}{16r^3\sqrt{2}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0.74$$


$$0.74 \cdot 100 = 74\% \text{ د اتصالاتو سلنه}$$

هغه عنصرونه چې په متر اکمو جوړښتونو کې له نښتو سره مېلور کېږي، عبارت له ټول نېجیه گازونه او له ۲۰ څخه لوړ فلزي عنصرونه دي، ځینې مالیکولي جسمونو، لکه: H_2 ، CH_4 او داسې نور هم د بلوري جوړښتونو د ذرو د لوړو متر اکم کیدلو دښتو سره یو ځای دي.

سودیم کلوراید :


د سودیم کلوراید بلوري جوړښت مکعبی مرکز لرونکو سطحی لري چې د CT^- ایونونو د هغه کنج او منځ نیولي دي؛ خو څرنګه چې په شکل کې لیدل کېږي، د Na^+ ایونونه د مکعب منځ او د مخونو منځ یې هم نیولي دي.

که چېرې د هر Na^+ په مقابل کې یو CT^- شتون ولري، په دې صورت کې به وضعیت روښانه وي، د دې په پام کې نیولو سره که چېرې په یوه درې لوري شبکه کې د CT^- ایونونه د سیستم په کنجونو کې ځای ولري، نو مکعبو پورې اړه لري، نو په کنجونو کې د کلوراید د اتو ایونونو شتون فقط یو $\frac{1}{8} = 8$ د هري واحدې حجرې سره تعلق لري او هم ټولې سطحې په خپل مرکز کې د کلوراید د یو ایون لرونکي دي، دا چې هره یو سطحې هریو له دوو مکعبو سره اړه لري، نو د کلوراید د شپږو موجودو ایونونو د جملې څخه چې د سطحې په منځ کې شتون لري، د هغې درې $3 = \frac{1}{2} \times 6$ پر هری بنسټیز واحدې حجرې پورې اړه لري؛ نو په مجموع کې په شپږ عدد واحدې حجره کې څلور واحدې کلوراید CT^- شته دي؛ داسې چې په یو عدد واحدې حجره کې د Na^+ څلور ایونونه شته دي؛ یعنې په واحدې حجره کې د کلوراید یو ایون د سودیم له یو ایون سره سمون لري، نو د سودیم کلوراید فورمول $NaCl$ دی.



(7-6) شکل د واحدې حجره د توپ او میلی مودل


هر څومره چې د بلورونو د جوړیدلو او غټیدلو چټکتیا په کراهه وي، په هماغه اندازه ښه او کیفیت لرونکي کریستلونه جوړېږي، (6-8) شکل د زینځ (پټکری) $(KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O)$ د مرکب طبیعي بشپړ کرسټال راښيي:



(6-8) شکل بشپړه بلورونه له طبيعي بشپړ شکل څخه وتلی $KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
۶-۱-۳: د جامداتو ډولونه

د جامداتو خواص تر یوه حده پورې د هغو هندسې بلوري شبکو بڼو، د هغوی د کینودل شوی واحدونو خاصیت (اتومونه، ایونونه او مالیکولونه) د شبکې په نقطو او د هغوی ترمنځ قوي پورې اړه لري، په دې بنسټ کېدای شي جامدات په څلورو ډولونو لیدل کېږي چې له ایوني، مالیکولي، کووالنسي او فلزي څخه عبارت دي.

1 - ایوني جامدات: د ایوني جامداتو په شبکه کې مثبت او منفي ایونونه شته دي. څرنګه چې د هغوی ترمنځ الکتروستاتيکي (ایوني اړیکې) قوای قوي دي نو د دې ډول شبکو بې ترتیبه کول امکان نه لري، له دې کبله جامدات له سختو ایونونو څخه جوړ شوي دي؛ مګر دا ډول جامدات ملټوژنکي دي؛ د بیلګې په ډول: د $NaCl$ یو بلور د مایډو په مقابل کې کلک مقاومت ښيي؛ که چیرې ټوټه شي، په پورهرو بدلېږي.



(6-9) شکل د ایوني جامداتو ټوټه کیدل

د ایوني جامداتو د ویلي کیدو ټکي لوړ دي او د بلوري شبکې له ماتیدلو سره یو ځای وي، څرنګه چې ایوني اړیکې فوق العاده ټینګې دي؛ پر دې بنسټ د هغوی ویلي کیدل په لوړه تودوخه کې

ترسره کيږي؛ د بيلگې په ډول: $NaCl$ په $800^\circ C$ تودوخه کې ويلي کيږي د ايوني جامداتو برښنايي تيرونه کمزوري ده؛ ځکه د هغوی ايونونه په پراخه توگه حرکت نه شي کولاي؛ خو په ويلي شوي حالت کې د لوړ برښنايي تيرونه لرونکي دي.





فکر وکړئ

ايوني شعاع د Na^+ او Cl^- ايونونه په ترتيب سره $116pm$ او $167pm$ ده، د هغه حجم په متر مکعب او سانتي متر مکعب او دهغي مولي کثافت پيدا کړئ.

۲- ماليکولي جامدات: په ماليکولي جامداتو کې هغه واحدونه چې د يوې شبکې ټکي تشکيلوي ماليکولونه دي او په هر ماليکول کې اټومونه د کووالانسي قوی پرنست ترکيب شويدي؛ په ماليکولي جامدو جسمونو کې د واندر والس کمزوری قوه شتون لري. واندر والس قوه بيلابيل ډولونه لري چې مهم؛ يې د ډای پول- ډای پولې ($Dipol - Dipoly$) او لندن ($London$) قوه ده.

ډای پول - ډای پولې قوه د پولار ($Polar$) ماليکولونو ترمنځ الکتریکي مقابل عمل دي، لاندي شکل په شيميائيک ډول د مجاورو دوو قطبي يوه جوړه ماليکولونه يوله بل سره په يوې شبکه کې ښيي؛ ډای پول- ډای پولې قوه د ايوني کووالانسي قوې په پرتله کمزوري ده.




(6 - 10) شکل ډای پول - ډای پولې قواوې.

3- **کووالانسي جامدات:** کووالانسي جامدات ځینی وخت د اټومي جامداتو په نوم هم يادشوي دي؛ په دې ډول جامداتو کې تشکيل کونکي واحدونه د شبکې په ټکو کې يو له بل سره د کووالانتي اړيکو په واسطه يوځای شوي دي. اټومونه درې بعدي شبکې منځته راوړي چې د بلور فزيکي حدود لوي او پراخه شوي وي، د کووالانسي جامداتو ساده بيلگه سيلکان کاربايد (SiC) دي، د دې مادې په شبکه کې د Si هر اټوم د څلور وجهي په ترتيب کې د کاربن له څلورو اټومونو سره اړيکه او




د کاربن هر اټوم د $2s$ د خپلورو اټومونو سره اړیکه لري چې په پایله کې کلکه جامده بلوري ماده جوړه کړې ده، د دې ډول جامداتو د ویلې کېدو درجه لوړه ده ځکه اټومونه د قوي اړیکو په واسطه سره یو ځای شوي دي، څرنگه چې په دې ډول جامداتو کې حرکت کوونکي ایونونه او الکترونونه نه شته ډد دي کبله د بریښنا هادی نه دي؛ الماس هم د کوولانسي جامداتو د ډولونو د څخه دي چې د کاربن هر اټوم له نورو خپلورو اټومونو سره اړیکه لري.



(6- 11) شکل د گرافیت او الماس جامد جوړښت


۴- فلزي جامدات: په یو فلزي جامد کې، هغه واحدونه چې د شبکې ټکي نیسي، مثبت ایونونه دي چې بېلگه یې کولای شو جامد سوډیم وړاندې کړو، د Na^+ ایونونه د یوې مرکز لرونکې مکعبې شبکې ټکي نیولي دي، سوډیم (Na) خپل یو الکترون د شبکې د مجموعي الکترونو ورځې د جوړېدو په غرض له لاسه ورکوي، د لاسه ورکړل شوي الکترونونه د یوو اټومونو په اختیار کې نه وي، خو په ټوله شبکه کې د لامبو او حرکت په حال کې پاتې کېږي او ټاکلې ځای نه لري. دا ډول الکترونونه د ازادو الکترونونو په نوم یادشوي دي. د ایونونو او الکترونو ورځې ترمنځ د جاذبې ښه قوه شته ده چې د جاذبې د قوه د شبکې جوړښت ثابت او پایدار ساتي او په عین وخت کې اجازه ورکوي ترڅو د شبکې ښه پرتله ماتېدو بدلون ومومي؛ د دې کبله سوډیم او ځینې نور فلزونه نرم دي، په ډیره اسانۍ سره یې ښه یې بدلون مومي. ځینې فلزونه ډیر کلک دي، بېلگه یې کیدای شي چې ولفرام (W) او کرومیم (Cr) ورکولی شو، په دې ډول فلزونو کې

اړيکه قطبي ده؛ له دې کبله ميل لري چې د جوړښت کبروالی يې ټير لږ وي او دهغې د بڼې له بدلون څخه مخنيوي وکړي، د فلزونو د وېلي کيدو درجه د پورتنیو دلیلونو پرتلیست په لویه ساحه کې بدلون لري؛ د بېلگې په ډول: د سوډیم د ایشیدو ټکی 89°C ؛ خو د ولفرام 3415°C دی. د فلزونو ازاد الکترونونه د هغوی د تودوخې او برېښنا د لیږلو لامل شوي دي، الکترونونه کولای شي چې د فلز د یوې برخې څخه بلې برخې ته حرکت وکړي او د تودوخې او برېښنا تیرولو لامل کیږي. حرکت کوونکي او ازاد الکترونونه په فلزونو کې هم د هغوی د خلا لامل کیږي، هغه برېښنا چې د فلز په سطحه لگيږي، الکترون يې جذبوي او بیرته يې په چلیږيال کې خپروي، دا عمل داسې واقع کیږي چې فلزي سطح ټولو خوا ته رڼا خپره وي.



(6 - 12) شکل فلزي شبکه په جامد فلز کې

۵- امورف جامدات (بې بڼې جامدات): په ټيټه تودوخه کې مایعات ټیر زیات ساره او کلک کیږي چې د مایع دا حالت د سسې مایع په نوم یادېږي، هر څومره چې د مادي تودوخه ټيټه شي، په هماغه اندازه مایع خپل دسیال حالت له لاسه ورکوي او جامد حالت ته نژدې کیږي، تر څو چې جامد حالت ځانته غوره کړي، په دې حالت کې ماده ځانته کلک حالت غوره کوي او دټاکلې شکل او حجم لرونکي وي؛ خو د دنني جوړښت له کبله د هغوی جوړونکي اجزايي په نا منظم بڼه شتون لري، دا ډول جامدات د امورف (*Amorph*) بې بڼې په نوم یادوي او جامدات د منظم جوړښت لرونکي بلوري (*Crystal*) جامداتو په نوم یادېږي.



ب

ب- امورف

(6- 13) شکل الف- کرسټال

په دي هکله پوښتنه پيدا کيږي چې کيداي شي امورف جامداتو ته هم جامد ويلی شي؟ خو خواب دادی: هر شي چې د ټاکلي شکل او حجم لرونکي وي، جامد ورته وايي؛ خو امورف جامدات د دنني جوړښت له له کبله له مایعاتو سره ورته والی لري. بنسټه هم د امورف جامداتو له ډلې څخه ده.

۶-۴: د جامداتو خواص:

جامدات د ټاکلی حجم او شکل لرونکي دي؛ خو که د هغوی تودوخه لوړه کړی شي، لږ انبساط کوي. د جامداتو تودوخې د انبساط ضریب (د حجم نسبتي بدلون د یوې درجې تودوخې د زیاتوالي په اندازه) د گازونو په پرتله ډیر کوچنی دی، د فشار اغیزه په جامداتو کې ډیره لږه ده. جامدات تقریباً د انقباض وړ نه دي؛ د بیلګې په ډول: که مو غوښتي وي چې د سپینو زرو د نمونې یو مقدار حجم نیمايي ته ورسوو، باید په هغه باندې $5 \cdot 10^5 \text{ atm}$ فشار وارد شي. د جامداتو د حجم کمه اړیکه له فشار او تودوخې سره د هغوی پر جوړښت پورې اړه لري، په جامداتو کې د اتومونو او مالیکولونو ترمنځ فاصله ډیره لږه ده؛ خو په گازونو کې د فاصله ډیره زیاته ده، ډیوري جامدي مادې جوړښت رانښتی چې د جامداتو په جوړښت کې مالیکولونه او اتومونه یو له بل سره ټینګې اړیکې لري په جامداتو کې د مالیکولونو حرکت ډیر وړو او حتی نه لیدل کیږي. مایعات په زیاته چټکتیا جاري کیږي؛ څرنگه چې په مایعاتو کې مالیکولونه په اسانۍ یو له بل پر سطحې خوځيږي او د همدې کبله دي چې مایعات د لوښي شکل خاڼه غوره کوي کوم چې په هغه کې ځای لري، له بله پلوه د جامداتو د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه د گازونو په نسبت ډیره زیاته او ډیره قوی ده، دا عامل لامل کیږي چې داخلي مقاومت د جاري کیدلو په وړاندې پریو مایع د گازونو په پرتله زیات وي.

۶-۲: مایعات

مایعات کیدای شي چې بزدو لارو په لاس راوړل شي.

1 - د جامداتو د ویلې کیدو له لارې.

2 - د گازونو د مایع جوړولو له لارې.

په لومړي لاره کې جامدې مادې انرژي جذب کړي ده او دا انرژي د هغو ذرو د حرکي انرژي په زیاتوالي کې په کارول شوی ده. په دویمه لاره کې د موادو د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه په گازي فاز کې زیاته شوي دی او سیستم خپل چاپیریال محیط ته انرژي ورکړي ده چې په مایع تبدیل شوي ده؛ څرنگه چې د مایعاتو تشکیل کوونکي ذرې یو له بل سره ډیرې نژدې دي؛ د دې کبله مایعات جامداتو ته ورته کیدای شي، له بله طرفه څرنگه چې د مایعاتو مالیکولونه او ذرې ازادانه حرکت کولای شي؛ له دې امله گازونو ته هم ورته کیدای شي.

۶-۲: د مایعاتو عمومي خواص

مایعات په زیاته چټکتیا جاري کېږي او څرنگه چې په مایعاتو کې مالیکولونه په اسانۍ یو د بل د سطحې له پاسه خوښېږي نو دهمدي کبله دهغه لوبښي شکل ځانته غوره کوي کوم چې په کې موجود دي، له بلی خوا د جامداتو د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه د گازونو په پرتله ډیره قوړې ده، دا عامل لامل کېږي چې ترڅو د یوې مایع دننې مقاومت د جاري کیدلو په مقابل کې د گازونو پسرته‌ښوېږي.

۶-۲-۱: د مایعاتو او د گازونو د خپریدلو پرتله

څرنگه چې د گازونو ډیر زیات حجم تسی فضا جوړ کړي ده او په هغوی کې د مالیکولونو ټکر کم دی، خو دا مطلب په مایعاتو کې ډیر لږ دی، پر دې بنسټ ویلې شو چې د مایعاتو خپریدل د گازونو په پرتله چټک دی او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر ډیر زیات دی چې له دې کبله د هغوی حرکت په یو ټاکلې لور ترسره کېږي؛ د بیلگې په ډول: که چیرې یو څاڅکي مایع رنگ په اوبو کې ورزیات کړو، ویه لیدل شي چې رنگ په اوبو کې په کراره، کراره خپریږي او له اوبو څخه ډک لوبښي ټوله فضا نیسي. د مایعاتو د تراکم کیدو وړتیا د گازونو په نسبت ډیره ده، مایعات ځانگړی حجم لري، که څه هم د مایع ښه د لوبښي پر بڼه پورې اړه لري؛ خو مایع د گازونو پر خلاف د لوبښي ټول حجم نه نیسي. د مایعاتو مالیکولونو د جاذبې قوه د گازونو په پرتله لږ څه د تراکم لامل ګرځي.


مایعات د سطحې کشش لرونکي دي، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره عبارت له



سطحي له کشش خڅه دي چې له ځانه يې بنسټې او د قواوو د توازن د نه شتون د مانع په سطح کې منځ ته راځي. څرنگه چې دننني ماليکولونه د باندینو ماليکولونو د کش کولو لامل دننه لوري ته کېږي، په دې صورت کې د سطحي ماليکولونو د پاسه موثره قوه چې دننې قواوو خنثي کوي شتون نه لري.

۶-۲-۲: براس کیدل او دمایعاتو د براس فشار

دمایعاتو له مهمو خواصو څخه یو د هغوی د براس کیدلو ځانګړتیا ده، دمایع ماليکولونو چټکتیا د جامد او ګازونو د ماليکولونو د چټکتیا په شان مختلفه ده او په مقابل کې د مانع ماليکولونو حرکي انرژي هم توپیر لري چې په هره شېبه کې ځینې ماليکولونه چټک حرکت کوي او په همدې محیط کې ځینې ماليکولونه په کراره حرکت لري، لاندې ګراف مطلب په واضح ډول روښانه کوي:



(6-14) شکل په یو مایع کې د مالیکولي انرژي ویش

په یو مایع کې د مالیکولونو انرژیکي ګراف او د هغې ویش له پورتنۍ شکل سره سم توضیح کوي چې مالیکولونه په لوړه تودوخه کې له ډیږی حرکتی انرژي سره په محیط کې شتون لري. هغه شمیر مالیکولونه چې د یوې مایع په سطحه کې ځای لري، که چیرې خپل ځان د نورو مالیکولونو له جاذبې قوې څخه خلاص کړي، په براس بدلېږي چې دې عملي نه براس کیدل ولایي، د براس کیدلو عملیه په هره شېبه کې ترسره کېدای شي. د تودوخې زیاتوالي د مانع مالیکولونو د حرکي انرژي د زیاتوالي لامل ګرځي او د براس عملیه چټکه کېږي.

۶-۴: د مایعاتو د ایشیدو درجه

که چیرې مایع ته په یو سر لوړځي لوړېږي کي تودوخه ورکړل شي ، د هغه تودوخه زیاتېږي. د یوې مایع د ایشیدو په بهیر کې (له ثابت فشار سره) د هغې د ایشیدو ټکی ثابت پاتې کېږي، په رښتیا په ثابت فشار کې هغه تودوخه چې په هغه کې مایع په ایشیدو راځي، د همدې مایع د ایشیدو د ټکي په نامه یادېږي. یوه مایع هغه وخت په ایشیدلو راځي چې د مایع د بخار فشار د وارد شوي باندني فشار یا اتموسفیر سره مساوي شي.

د مایعاتو د ایشیدو پروسه په سر لوړځي لوړېږي کې لیدل کېږي؛ خو په سربېخي لوړېږي کې نه ترسره کېږي. په سر لوړځي لوړېږي کې په مایع باندې وارد شوي باندني فشار ثابت دي خو د باندني فشار په بدلون د ایشیدو درجه هم بدلون مومي، داسې چې د فشار په زیاتوالي د مایعاتو د ایشیدو درجه لوړېږي او د فشار په لوړوالي د مایع د ایشیدو تودوخه لږېږي؛ د بیلګې په ډول: د اوبو د ایشیدو درجه په یو اتموسفیر فشار کې 100°C ده؛ مګر په لوړو منطوقو کې چې فشار 650mmHg وي، اوبه په 95°C کې په ایشیدو راځي.



فعالیت

الف- د اوبو د ایشیدو د تودوخې درجه د غره په سر کې زیاته ده او یا د غره په ټیټو برخو

کې، ولې؟

ب- په اوبو کې د کچالو پخول د غره په سر کې ډیر وخت نیسي او یا د غره په ټیټو برخو کې؟

ج- ایا هغه اوبه چې د غره په سر ایشیږي، لاس زیات سورځوي او یا هغه اوبه چې د غره په بنګکټې برخه کې ایشیږي لاس زیات سوځوي؟

د ایشیدو پروسه عملاً په سړیتو لوړېږي نه ترسره کېږي؛ ځکه په سړیتو لوړېږي کې برأسونه ټولېږي او د مایع سطح برأس راچاپېروي او د مایع د سطحې فشار لوړوي چې د مایع د ایشیدو خنډ ګرځي، په دې صورت کې هر څومره چې په هغې باندې تودوخه زیاته شي په هماغه اندازه مجموعي فشار په سترګې لوړېږي چې د مایع پر سطحه باندې زیاتېږي او د ایشیدو بهیر نه ترسره کېږي



فکر و کړئ:

الف- آیا د بخار په سرېټي ډېک کې چې د اور پر وړاندې د اېښودل شوي وي، د اېښودلو عملیه تر سره کېږي ؟

ب- ولې د بخار ډیګونونه په پورتنۍ برخه کې سموري ویاسي چې په مناسب وخت کې وازاو بخار یې ووزي ؟

ج- د اوسو تودوخه د بخار ډیګ کې زیاته ده او یا دا چې په سر وازو ډیګونو کې اوبه ډیرې زیاتې د ایشیدو په حالت دي.

۲- ۱- ۴- : تودوخه او د مادي بدلونونه

که یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، کوم بهیر به ولیدل شي؟ په عمومي ډول جامده ماده ویلې کېږي او په مایع بدلیږي، که لاسته راغلی مایع ته بیا هم تودوخه ورکول شي په یوه ټاکلې درجه تودوخه کې اېښیږي او د گاز فاز تشکیلوي . د تودوخې منځني او درې ګونو حالتونو د مادي بدلونونو وخت (جامد، مایع او گاز) په لاندې ډول لیدلې شي:




صعودي حرکې انرژي

(6- 15) شکل: د اوبو د درې حالتونو (جامد، مایع او گاز) د بدلونونو منځني ګراف د تودوخې د درجو له تړون سره. هغه انرژي چې یخ ته ورڅښه کېږي، د اوسو د مالیکولونو حرکې اهتزازونه زیاتیږي چې په پایله کې مالیکولونه یو له بل څخه جلا او کرسټالي شبکې یو له بل څخه بیلېږي چې جامده ماده په مایع بدلیږي او دمالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې دا مالیکولونه خپل ځای په شبکه کې له لاسه ورکوي. د جامداتو تودوخه دولې کېدو تر هغه وخت پورې ثابته پاتې کېږي چې کاملاً جامده ماده په مایع تبدیله شوې نه وي. دویلي کېدو نه وروسته د تودوخې درجه د

ایشیدو تر درجې پورې لورېږي او د تودوخې دا درجه تر براس کیدلو پورې بشپړه ثابته پاتې کېږي، کله چې مایع پوره براس شي، نو د تودوخې درجه لوړېږي.


فعالیت

څیرنډه وکړئ چې ولې جامد مواد د تودوخې د زیاتوالي په اثر ولې کېږي؟ ولې د تودوخې د زیاتوالي په اثر مایعات په براس او یا گاز تبدیلېږي؟ لاندې شکلونه وگورئ، ځواب وړاندې کړئ.



(6 - 16) شکل د اوبو حالتونه د تودوخې په بیلابیلو درجو کې

دیروي مادې د ویلي کیدو او ایشیدو ټکی د جامد او مایع حالتونه د براس د فشار په واسطه ټاکل کېږي، لاندې گراف د اوبو د جامد او مایع د براس فشار نښي:



تودوخه ($^{\circ}\text{C}$)

(6 - 17) شکل د اوبو د براس فشار ترون د تودوخې سره

۶-۵: د مایعاتو کنگل کیدل


کله چې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل شي، په دې صورت کې د مایکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ښکته راځي، نو ثابت حالت ځانته غوره کوي او له هغې سره گډه د مواد جامد بلورونه لاس ته راځي. د یو مایع د کنگل کیدو درجه د هغه اندازه تودوخه لاس ته راځي د کوم چې د یوې مادې جامد او یا مایع فاز یو بل سره د تعادل په حالت کې شتون لري.

جامد $\longrightarrow$ مایع

که چیرې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل شي، د تعامل لوري به ښي خواته دوام پیدا کوي او دی حالت ته کنگل کیدل ولایي، که چیرې جامدو موادو ته تودوخه ورکول شي، د تعامل بهیر له پورتنۍ معادلې سره سم کین لور ته بهیر پیدا کوي، دی بهیر ته ویلې کیدل ولایي. د کنگل کیدلو چټکتیا د ویلې کیدو چټکتیا ده، داسې چې سیستم نه تودوخه جذب او نه ازاده کوي، دلته د تگ او رانگ بهیر په دی سیستم کې د تودوخې په عین درجه کې ترسره کېږي؛ پر دی بنسټ د یوې خالصې مادې د ویلې کیدو او کنگل کیدو ټکی یو شان دی.

د جسمونو د جامد حالت نیغ پر نیغ بدلیل د گاز حالت ته د تصعید (Sublimation) عملیه ولایي. د موادو جامد حالت د مایع او گاز حالت په شان د براس فشار لرونکي دي او څرنگه چې په جامداتو کې د مایکولونو ترمنځ د کشکولو غښتلی قوې ده؛ پر دې بنسټ د جامداتو براس ډیر لږ دی. د تعادل په حالت کې د جامد او گاز له براس فشار سره مساوي دي او د سیستم د تودوخې درجه د تعادل په حالت کې ثابته ده. که چیرې د گازي مادې تودوخه لږه شي او پرته له دې چې مایع شي، جامد حالت ځانته غوره کړي، دا بهیر د تیرید (Deposition) په نوم یادېږي، کیدای شي چې ځینې مواد په عادی شرایطو کې د تصعید او تیرید په لاره، خالص کړی شي چې بیلگه یې کیدای شي چې I_2 او نفتالین ($C_{10}H_8$) وړاندې شي.

په عمومي ډول یوه ماده د شرایطو په پام کې نیولو سره په درې حالتونو (جامد، مایع او گاز) ولیدل شي چې د درې حالتونو تبدیل یو په بل ته لاندې شکل کې لیدل کېږي:



(6 - 18) شکل د مادې د درې حالتونو تبدیل یو په بل باندې

۶-۳ : گازونه

د گازونو ځانګړتیا د لیدلو وړ په اندازه یو له بل سره یو شان دي او دا تشابه مونږ ته د دې امکان تر لاسه کوي چې تر څو ایديال گاز تعریف کړو او وروسته د حقیقي گازونو خواص د ایديال گازونو له خواصو سره پرتله کړو، په دې صورت کې به تر لاسه شوي چې حقیقي گاز او ایديال گاز په ځینو مواردو کې سره یو شان دي (کله چې فشار او تودوخه زیات نه وي) د گازونو خواص د غازي موادو د بنو فکتورونو له ډلې څخه دي چې کیدای شي هغه د ساده قوانینو په واسطه توضیح کړو، خو لومړی لازم دي تر څو کمیتونه د بحث لاندې ونیسو کوم چې په گازونو باندې اغیزه لري، هغه عبارت له حجم، فشار، د گاز اندازه او تودوخه ده، د اکمیتونه به په دې څپر کې وروستيو بحثونو کې د ازمايشي قوانینو په مورد زیات کومک وکړی.

حجم :

دا چې گازونه په ناڅاپه منبسط کېږي او خپل اړونده لوښی، ډکوي؛ نو د گازونو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان دی؛ خو نن ورځ توصیه شوي ده چې د گازونو د حجم د اندازه کولو کمیتونه باید له بین المللي سیستم سره سم په واحد توګه وټاکل شي، څرګه چې په بین المللی سیستم کې (SI) د فاصلي واحد متر (m) دي؛ پړدې بنسټ بین المللي سیستم کې (SI) د حجم واحد متر مکعب (m³) دي او عمدتاً $dec m^3$ (دیسې متر مکعب) د حجم د واحد په توګه ټاکي، یو دیسی متر مکعب حجم د لیتر (Liter) په نوم هم یادوي. د موادو د حجمونو د اندازه کولو لپاره د m³ له اجزاوو او اضعافو څخه هم ګټه اخلی چې په عمده توګه $C m^3$ دي او

$$cc = 1cm^3 = 1mLi \text{ کېږي.}$$

فشار

وارده شوي قوه پړ یوې سطحې باندې له فشار څخه عبارت دي:

$$p = \frac{F}{S}$$

د cgs په سیستم کې د فشار واحد $MKS, Bary$ پاسکال او په FPS کې پوند (Lb تقسیم پړ انچ مربع (In^2) دي چې ($1atm = 14.7Lb / In^2$) کېږي او دیسی PSi په نوم هم یادېږي. $1atm = 14.7Lb \cdot Inch^{-2} = Psi = 760mmHg$ او ملي متر ستون سیماب دي.

$$14tm = 760mmHg = 760torr$$

$$14tm = 14.7 lb / Inch^2 = Psi = 101.3KPa$$



۶- ۱- د گازي مادي مقدار:

په عمومي توگه د موادو مقدار په مول اندازه کيږي چې په (n) بنسودل کيږي د مادي د مولونو مقدار کيداي شي د مطلوبي مادي د گرامونو اندازه پر ماليکولي او يا اتمي کتلې د ويشلو څخه لاس ته راشي:

$$n = \frac{m}{M}$$

د گازونو تودوخه

د گازونو تودوخه په عمومي توگه په کالوین اندازه کيږي چې کالوین د مطلقه تودوخې په نوم هم يادوي:


$$T_k = C^{\circ} + 273$$

۶- ۲- د بایل قانون (Boyle's Law)

په 1662 م کال کې دوو فرانسوي فزيک پوهانو د رابرټ بایل او اډام مارپورت په نامه يو له بل څخه بیل د گازونو د حجم او فشار ترمنځ اړيکه په ثابته تودوخه کې وڅيړله او په پایله کې لاس ته راوړه چې په ثابته تودوخه ($T = \text{Constant}$) کې د گازونو د ټاکلې اندازې حجم پرمهوی باندې دواړه شوي فشار سره معکوساً متناسب دي.

$$V \approx \frac{1}{p} \dots \dots \dots l$$

نور ورو پوهانو له هغې دستگاه څخه گټه اخيستلې کوم چې په هغه کې د گاز يوه نمونه د تړل شوي درجه لرونکي مانومتر په لاندینې برخه کې خلی لري، د مانومتر په خلاص سر کې د سیمابو د زیاتوالي په واسطه کيدای شي چې د گاز فشار زیاتوالی ومومي او د فشار په زیاتوالي د گاز حجم په سیلابو پراوړنو کې اندازه او وټاکل شي.



(6- 19) شکل سري وازي مانومتر د هایدروجن له گاز سره $P_{atm} + P_{Hg}$

د تجربو لاندې د هایدروجن گاز د فشار- حجم د اندازې اخیستلو یو تعداد پایلې چې د تودوخې په 25°C کې لاسته راغلي دي، په لاندې جدول کې خلاصه شوي دي:

(6-1) جدول د هایدروجن د گاز د تراکم د تودوخې په 25°C درجو کې

د تجرو نومبر	فشار mm Hg	حجم mli	حجم ضرب د فشار
I	mm Hg 760	mli 25	$1.75 \cdot 10^2$
II	mm Hg 830	mli 21.1	$1.75 \cdot 10^2$
III	mm Hg 890	mli 19.7	$1.75 \cdot 10^2$
IV	1060mm Hg	mli 16.5	$1.75 \cdot 10^2$
V	1240mm Hg	mli 14.1	$1.75 \cdot 10^2$
VI	1510mm Hg	mli 11.6	$1.75 \cdot 10^2$

په دې پایلو کې دوه مهم ټکي پټ دي: لومړی دا چې د فشار په زیاتوالي د هایدروجن د گاز حجم لږ شوی او دویم دا چې د فشار زیاتوالي او د حجم لږوالي د ضربولو پایله (PV) ثابت پاتې کېږي او دې فکتور د بیل او ماریوت توجه ځان ته راوړله چې د هغې معادله په لاندې ډول ده:

$$PV = K \text{-----} 2$$

په پورتنۍ اړیکې کې P فشار V د گاز حجم او K ثابت دي چې د هغه اندازه په تودوخه او د گاز په اندازې پورې اړه لري، پر دې بنسټ کېدای شي چې I معادله په مکمل ډول په لاندې توګه ولیکل شي:

$$n = Constant, T = Constant \text{-----} 3$$

$$PV = K$$

II او III معادلې د بیل او ماریوت د قانون په نوم هم یادوي، دا معادلې په لاندې توګه هم لیکلې کېږي:

$$V = \frac{K_1}{P} \text{-----} 4$$

په لنډه ډول ویلې شو چې په ثابت تودوخه کې د گازونو د یو ټاکلي مقدار حجم له فشار سره معکوس متناسب دي.

بیلګې: یو ایډیال گاز د بیل د اندازه کولو په دستگاه کې ځای لري، د بیلګې په ډول چې په



625mmHg کې د گاز حجم 247mL دي، که چېرې فشار 825mmHg ته بدلون وکړي، په دې فشار کې د حجم بدلون لاسته راوړي ($T = \text{Constant}$).

حل: د بایل له قانون سره سم $P_1V_1 = K$ ، $P_2V_2 = K$ دي نو $P_1V_1 = P_2V_2$ سره کېدای

شي:

$$V_1 = 247 \text{ mL}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2}{P_1}$$

$$P_1 = 625 \text{ mmHg}$$

$$V_2 = \frac{V_1 P_1}{P_2}$$

$$P_2 = 825 \text{ mmHg}$$

$$V_1 = ?$$

$$V_2 = \frac{247 \text{ mL} \cdot 625 \text{ mmHg}}{825 \text{ mmHg}} = 187 \text{ mL}$$

مشق او تمرین وکړئ

په 1.23atm فشار کې د ایډیال گاز حجم 4.63L دي، که چېرې فشار $4.14 \cdot 10^{-2}$ ته بدلون ومومي، د گاز حجم پیدا کړئ. ($T = \text{Constant}$)

فعالیت

$PV = K$ په معادلي کې K د بایل د ثابت په نوم یادوي، د دې ثابت مقدار د گازونو لپاره په معیاري شرایطو کې په $\text{Pa} \cdot \text{m}^3$ ، $\text{mmHg} \cdot \text{L}$ ، $\text{atm} \cdot \text{L}$ لاسته راوړي.

۶-۳: د چارلس قانون (په گازونو باندې د تودوخې اغیزه)

د چارلس په نوم فرانسوي فزیک پوه په 1787م کال کې د گازونو د حجم بدلون د تودوخې په واسطه په ثابت فشار او په ثابت مقدار کې مطالعه کړ. نوموړي عالم ولیل چې په ثابت فشار کې $(P = \text{const})$ که چېرې گازونو ته تودوخه ورکړ شوی تودوخه د 0°C درجې څخه 80°C پورې بدلون ومومي، نو د نوموړو گازونو د حجم بدلونونه یو له بل سره معادل دي.

په 1806 تر 1808 کالونو کې گیلوسک وکړی شو چې د چارلس د گازونو فهرست پوره کړي او هم نوموړي وښودل چې که چېرې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې سانتي ګراد په زیاتوالي له صفر درجې (0°C) څخه، د گاز د حجم 23L: 1 برخه انبساط حاصلوي. د چارلس او گیلوسک د درې نمونو د مطالعې پایلې په (6-21) شکل ګراف کې په لاندې ډول وړاندې شوي دي:


په دې ګراف کې د درې نمونو لپاره د تودوخې او حجم ترمنځ اړیکې د هایدروجن د بیلابیلو کتلو

لپاره توضیح شوي ده، په دې تجزويو کې فشار ثابت دي. که د گراف دې خطونو ته چې د تودوخې او حجم تړون اړیکه رابښي، دوام ورکړل شي، د تودوخې د درجو افقي محور به په یوه ټاکلي ټکي کې چې په دې ټکي کې $(V = 0)$ دي، پري کوي. د نوموړو تجربو څخه پایله اخیستل کېږي چې د تودوخې د تیزل په بهیر کې تر $273^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C}$ پورې، د گازونو حجم له صفر مساوي دي. په ظاهر کې $273^{\circ}\text{C} - 273^{\circ}\text{C}$ تودوخه کې گاز باید د منځه لاړ شي.

له اړونده ترسره شورو تجزويو چې په بیلابیلو گازونو باندې ترسره شوي دي، پایله اخیستل شویده چې د هغوی له گرافونو د رسمونو څخه مستقیم خطونه حاصلېږي او هغه د تودوخې ټول افقي محور په یوه ټاکلي $273^{\circ}\text{C} - 273^{\circ}\text{C}$ ټکي پري کوي، څرنگه چې حجم له صفر څخه ټیټه شتون نو $273^{\circ}\text{C} - 273^{\circ}\text{C}$ تودوخه ډیره لږه تودوخه ده؛ له دې کبله دغه دتودوخې درجه، مطلق صفر منل شویده (د هغې دقیق عدد $273.15^{\circ}\text{C} - 273^{\circ}\text{C}$ دي). د نیغو خطونو عمومي معادلی $(6 - 21)$ بڼه عبارت ده له:

$$V = a(t + 273) \text{-----} I$$

په (I) معادله کې V د گاز حجم، T دتودوخې درجه په $^{\circ}\text{C}$ او a د نیغو خط میل دي. څنگه چې $(v = a(t + 273))$ دی او کالوین له مقیاس سره اړیکه لري، په دې بنسټ کولای شو چې معادله داسې هم ولیکو:

$$\frac{V}{T} = a(n \cdot p)$$


(6 - 20) شکل د فشار او تودوخې ترمنځ اړیکه

په ثابت فشار $(p = \text{constant})$ کې د ټاکلي مقدار د گازونو حجم له تودوخې سره نیغ پر نیغ (مستقیمه) اړیکه لري. پورتنۍ قضیه د چارلس او د گیلوسک پر قانون پورې اړه لري.

که چېرې په ثابت فشار کې د یو ټاکلي مقدار گاز حجم V_1 وي، نو دلته د نوموړي گاز لومړنی تودوخه T_1 ده او که تودوخه T_2 ته بدلون ومومي، د گاز حجم V_2 دي، پر دې بنسټ لیکلې شو چې:

$$V = KT \text{ -----} 3$$

$$\frac{V}{T} = K \text{ -----} 4$$

$$\frac{V_1}{T_1} = K \text{ -----} 5$$

$$\frac{V_2}{T_2} = K \text{ -----} 6$$

د 5 او 6 معادلې له پرتلې څخه نه لیکلې شو چې:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{T_2}{T_1} \text{ -----} 7$$

لومړۍ بېلگه: یو ایډیال ګاز په 25°C کې، د 1.28L حجم لري، که چېرې تودوخه 50°C ته بدلون ومومي، د نوموړي ګاز حجم به څومره وي؟ (چې فشار ثابت وي)

$$\left. \begin{array}{l} V_1 = 1.28\text{Li} \\ T_1 = 25^\circ\text{C} \\ T_2 = 50^\circ\text{C} \\ V_2 = ? \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \\ V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = \frac{1.28\text{L} \cdot 323\text{K}}{298\text{K}} = 1.39\text{L} \end{array}$$

فکر وکړئ

په ثابت فشار او 27°C تودوخه کې، یو ایډیال ګاز 128cm^3 حجم نیولې دي، که چېرې نوموړي ګاز حجم 214cm^3 ته بدلون ومومي، نو تودوخه به څومره وي؟

دویم مثال: په 25°C تودوخه او 1atm فشار کې یو ایډیال ګاز 2.65L حجم نیولې دي، که چېرې په یو وخت کې تودوخه 75°C او فشار 2atm ته لوړ شي، دلته به دنوموړي ګاز حجم څومره وي؟



حل:

1- د بایل د قانون پرنسټ (n او t ثابت وي)

$$V \approx \frac{1}{P}$$

2- د چارلس د قانون پرنسټ (n او P ثابت دي)

$$V \approx T$$

د بایل او چارلس د معادلې له ترکیب څخه کولای شو چې ولیکو

$$V = \frac{CT}{P} \quad (\text{ثابت دي})$$

په دې فورمول کې C د تناسب ثابت دی چې تناسب یې پر مساوات تبدیل کړئ، نو:

$$\frac{PV}{T} = C$$


پورتنی اړیکه د گازونو د ترکیب د قانون په نوم یادېږي چې هغه کولای شو د گازونو د دوو بیلابیلو حالتونو لپاره په لاندې ډول ولیکل شي:

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_1 V_1}{T_1} &= C \\ \frac{P_2 V_2}{T_2} &= C \\ \frac{P_1 V_1}{T_1} &= \frac{P_2 V_2}{T_2} \end{aligned} \right\} \quad V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1} = \frac{1 \text{ atm} \cdot 2.65 \text{ L} \cdot 348 \text{ K}}{2 \text{ atm} \cdot 298 \text{ K}} = 1.55 \text{ L}$$

۶-۳-۴: د اوهگډرو اصل

د گیلوسک له قضیې سره سم: د تعامل کوونکو گازونو د حجمونو نسبت په یو کیمیاوي تعامل کې د فشار او تودوخې د یوشان شرایطو لاندې تام او کوچنی عددونه دي؛ د بیلگې په ډول: نایتروجن او هایدروجن د زیات فشار او تودوخې لاندې یو له بل سره تعامل کړي امو نیایي تشکیل کړي ده، د امو نیایي په تشکیل کې نایتروجن او دهایدروجن حجمی نسبت او همدارنگه د هغه برعکس

$$\text{دي} \quad H_2 : N_2 = 3 : 1$$



دو حجمه $\longrightarrow$ یو حجم + درې حجمه



په دې مورد کې پوښتنې منځ ته راځي، دا چې ولې د حجمونو ترمنځ اړيکه په پام سره همداغه اړيکه ده چې د تعامل کوونکو موادو د مالیکولونو د شمیر ترمنځ په یو کیمیاوي تعامل کې شتون لري؟ د دې سوال ځواب داسې دي چې د بیلابیلو گازونو مساوي حجمونه د فشار او تودوخې ترپوشان شرایطو لاندې د مساوي شمیرو مالیکولونو لرونکي دي، (د اوگدرو لومړی قانون). د بیلابیلو گازونو د ذرو مساوي شمیر (مالیکولونه، اټومونه او یا آیونونه) د فشار او تودوخې د پوشان شرایطو لاندې مساوي حجمونه نیسي. (د اوگدرو دویم قانون)

د اوگدرو د اصل پرنسپ په ثابت فشار او تودوخه کې د گازونو حجم نیغ نیغ د هماغه گاز د مول له شمیر ورسره متناسب دي:

$$\begin{aligned} T &= \text{Constant} \\ P &= \text{Constant} \\ V &\approx n \\ \frac{n}{V} &= k \end{aligned}$$

مشق او تمرین وکړئ

الف- د نایتروجن د گاز نیول شمیري حجم چې د مالیکولونو شمیر یې په STP شرایطو کې $3.011 \cdot 10^{23}$ دی، څو لیتره به وي؟
 ب- د گازونو مولې حجم پر کوم عامل پورې اړه لري، د مولې حجم په نظر کې نیولو سره په ستندردو شرایطو د گازونو مولې حجم په یو اټمو سفیر فشار او 127°C کې محاسبه کړئ.

۶- ۵: د ایډیال گازونو قوانین

د بایل قانون، د چارلس قانون او د اوگدرو اصل درې واړه دهغه متناسب بیانونو کې دی کوم چې ایډیال گازونه توصیف وي، دنوموړو علماوو د اصولو متناسب په لاندې ډول لنډولی شو:

$$\begin{aligned} (n \text{ او } T \text{ ثابت دي}) \quad V &\approx \frac{1}{P} & (n \text{ او } P \text{ ثابت دي}) \quad V &\approx T \\ (n \text{ او } T \text{ ثابت دي}) \quad V &\approx n & (n \text{ او } P \text{ ثابت دي}) \quad V &\approx n \end{aligned}$$

له درو تناسبو څخه کولای شو ولیکو، چې:

$$V \approx \frac{1}{P} \quad (3) \text{ معادلې متناسب پر مساوات تبدیل کړو، } R \text{ چې د گازونو د تناسب په}$$

نوم ياديري، د معادلې په ښي خوا کې معامله کوو، حاصلېږي چې:

$$V = RTn \frac{1}{p}$$

$$V \frac{nRT}{p}$$

$$PV = nRT \text{ -----4}$$

4 اړیکه د ايډيال گازونو د حالت عمومي يا بشپړه معادلې په نوم يادوي، د R قيمت د حجم، تودوخه، فشار او د گازونو مقدار پورې اړه لري، د شرايطو او د گاز دمقدار په نظر کې نيولو سره د R قيمت تغير کوي؛ خو په STP شرايطو کې يو مول د هر گاز 22.4L حجم لري؛ پردي بنسټ که د ايډيال گازونو n, T, P او V قيمتونه د گازونو د حالت په عمومي معادله کې معامله کوو، د R بيلا بيل قيمتونه د پورتنیو پارامترونو له قيمتونو سره سم لاسته راځي:

$$T = 0^{\circ}C = 273K$$

$$PV = nRT$$

$$P = 1 \text{ atm} = 101.3 \text{ kPa}$$

$$R = \frac{PV}{nT}$$

$$n = 1 \text{ mol} \quad R = \frac{101.3 \text{ kPa} \cdot 22.4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ mol} \cdot 273 \text{ K}} = 8.31 \frac{\text{joul}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$V = 22.4 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$R = ?$$

لومړی مثال: يو ايډيال گاز په $0,432 \text{ atm}$ فشار کې $8,64 \text{ L}$ حجم نيولي دي او د هغې مقدار $0,176$ مول دي په نوموړي گاز باندې وارده شوي تودوخه پيدا کړئ.

$$\begin{aligned} &= \\ &= 2 \\ &= \\ &= \frac{2 \cdot \cdot \cdot}{2 \cdot \cdot \cdot} = 2 \\ &= \\ &= 2 \end{aligned}$$

ځېل ځان ازمايښت کړئ

د اکسيجن $5g$ گاز په $35^{\circ}C$ تودوخه کې 6 L حجم لري، دنوموړي گاز فشار په څومره وي؟



د گازونو کثافت

که چیرې د گاز مولې کتله د هغه د یو مول حجم باندې په سټنډرډ شرایطو کې تقسیم شي ، د گاز د مولې کثافت لاس ته راځي :

$$D = \frac{m(\text{mol})}{V_{STP}}$$

لومړی مثال:

د هایدروجن د گاز 5 گرام په 22°C تودوخه اویو اتموسفیر فشار کې ، 41.5 لیتره حجم لري ، د هغه مولې کثافت پیدا کړئ.

$$D_{mol} = \frac{m(\text{mol})}{V_{STP}} = \frac{5\text{g}}{61.5\text{L}} = 0.0813\text{g/L}$$

خړنگه چې $n = \frac{m}{M}$ دي ، که چیرې د n قیمت په $PV = nRT$ معادله کې معامله کړو ، لاس ته راځي چې :

$$PM = DRT \quad \text{یا} \quad PM = \frac{m}{V} RT \quad \text{یا} \quad PV = \frac{m}{M} RT \quad \text{یا} \quad PV = nRT$$

$$D = \frac{PM}{RT}$$

دویم مثال

د اکسیجن د گاز کثافت په 320 تودوخه او 2.5 atm فشار کې پیدا کړئ ، د اکسیجن د گاز مالیکولي کتله 32amu ده.

حل:

$$d = \frac{PM}{RT}$$

$$D = \frac{2.5\text{atm} \cdot 32\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}}{0.082\text{L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 320\text{K}} = 2.79\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$$

مشق او تمرین وکړئ



د نایټروجن د یوې نمونې گاز فشار چې د هغې کثافت په 300K تودوخه کې 2.0g/L دي ، پیدا کړئ . د یو مول نایټروجن کتله 28g/mol ده.



۶-۳-۶: د یو ایډیال گاز د مولی حجم محاسبه په STP شرایطو کې

محاسبو ښودلې ده چې د یو ایډیال گاز حجم په STP شرایطو کې د 22.4L دی:

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{1 \text{ mol} \cdot 0.08206 \text{ atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 273 \text{ K}}{1 \text{ atm}} = 22.4 \text{ L}$$

پر دې بنسټ په STP شرایطو کې د هر گاز یو مول 22.4L حجم نیسي.

۶-۳-۷: د گازونو د مالیکولي کتلې پیدا کول د گازونو عمومي معادلي پر دې بنسټ او د گازونو کثافت.

د گازونو عمومي معادله په نظر کې ونیسي د هغې پریزنسټ کېدای شي چې د گازونو د مالیکول کتله لاس ته راوړل شي:

$$PV = nRT \quad \text{-----} 1$$

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{-----} 2$$

$$PV = \frac{m}{M} RT \quad M = \frac{mRT}{PV}$$

لومړۍ مثال: د فاسفین PH_3 د گاز کثافت په $50^\circ C$ تودوخه او 727 mmHg فشار کې 1.26 g/L دي، د نوموړی گاز ایډیال دی، د هغه مالیکولي کتله محاسبه کړئ.

$$P = 727 \text{ mmHg} \quad M = \frac{mRT}{PV}$$

$$m = 1.26 \text{ g} \quad M = \frac{1.26 \text{ g} \cdot 6236 \text{ mmHg} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 323 \text{ K}}{727 \text{ mmHg} \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}$$

$$V = 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 \quad M = 34 \text{ g/mol}$$

$$T = 50^\circ C = 323 \text{ K}$$

$$R = 62.36 \text{ mmHg} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$M = ?$$


مشق او تمرین وکړئ

د تودوخې په صفر درجه سانتی گراد او $0.1 \mu Pa$ فشار کې، د یو لیتر مشبوع هایدروکاربن گاز، 1.96 g کتله لري، د هغه مالیکولي کتله او فورمول پیدا کړئ.



۶- ۸: د گازونو مخلوط (د دالتن قسمي يا جزئي فشار)

په 1801م کال کې جان دالتن د یو لړ علمي تجربو پر بنسټ پایله تر لاسه کړه چې د گازونو له مخلوطو څخه د ډک لوبنسي په دیوال باندې وارد شوي فشار د گازي مخلوط د تشکیل کورونکو اجزاوو د گازونو د هر یوه د مجموعي فشار څخه عبارت دي؛ پر دې بنسټ دیو گازي مخلوط اندازه شوي فشار باید د گازونو له حاصل جمع سره مساوي وي، داسې چې: که چېرې د مخلوط د اجزاو هر یو جز یوازې د لوبنسي حجم ځانته ونیسي او د لوبنسي په دیوال باندې فشار واچوي. نو د دالتن له جزئي فشارونو سره سم کېدای شي چې وویل شي: دیو گازي مخلوط ټولیز فشار عبارت له گازونو د هر جزو فشارونو د جمعې له حاصل څخه دی. جزئی یا قسمي فشار داسې تعریف کېږي: که چېرې یو گاز په یوازې ډول یو لوبنسي ونیسي او خپل جزئي فشار معادل فشار یې د لوبنسي په دیوال وارد کړي، د قسمي یا د جز فشار پر نامه یادېږي، لاندې شکلونه د دالتن د جزئي فشار او د گازونو د مخلوط مجموعي فشار رابنسي؛ دیلگي په ډول: که چېرې د هیلیم جزئی فشار 100mmHg او د هایدروجن جزئی فشار 300mmHg وي، نو مجموعي فشار یا کلي فشار 400mmHg دی. څه ناڅه د گازونو ټولیز مخلوطونه د دالتن د جزئي فشارونو له قانون څخه پیروي کوي او بنسټیز شرط یې دا دی چې مخلوط شوي گازونه یو له بل سره تعامل ونه کړي:



(6 - 21) شکل: د دالتن د قسمي فشارونو قانون د ثابتې تودوخې په درشل کې

د گازونو د حالت د عمومي معادلې پر بنسټ ($PV = nRT$) کېدای شي مجموعي فشار او هر گاز جزئي فشارونه په لاس راوړل شي:

$$P_{Total} = \frac{n_{Total} RT}{V} \text{-----1}$$

$$P_i = \frac{n_i RT}{V} \text{-----2}$$

$$\frac{P_i}{P_{Total}} = \frac{n_i RT}{n_{Total} RT} = \frac{n_i}{n_{Total}} \text{-----3}$$

$$\frac{P_i}{P_{Total}} = \frac{n_i}{n_{Total}} \text{-----4}$$

دا چي د مخلوط موادو د يو جز مول تقسيم پر د دوی د تشکیل کونکو اجزاو دمولونو په مجموعي باندې، د اجزاو مولې کسر دي؛ نو که ديو جز مولې کسر په X_i وښودل شي، په دې صورت کې لرو چې:

$$\frac{P_i}{P_{Total}} = X_i \text{-----} 4$$

$$P_i = P_{Total} X_i \text{-----} 5$$

مثال: که چيرې O_2 , N_2 او H_2 گازونو څخه د يو، يو گرام په اندازه په يو لس ليتره بالون کې وړدنه کېږي، نوموړي گازونه ايد يال دي، ددی گازونو د مخلوط تودوخه $125^\circ C$ ده، کلي يا مجموعي فشار (Total) به پيدا کړي. (د atm په واحد)

حل:

$$n_{H_2} = \frac{m_{H_2}}{M} = \frac{1g}{2g/mol} = 0.5mol$$

$$n_{O_2} = \frac{m_{O_2}}{M} = \frac{1g}{16g/mol} = 0.0313mol$$

$$n_{N_2} = \frac{m_{N_2}}{M} = \frac{1g}{14g/mol} = 0.0357mol$$

$$P_{H_2} = \frac{nRT}{V} = \frac{0.5mol \cdot 0.082atm \cdot L \cdot 398K}{10L \cdot mol \cdot K} = 1.63atm$$

$$P_{O_2} = \frac{nRT}{V} = \frac{0.0313mol \cdot 0.082atm \cdot L \cdot 398K}{10L} = 0.102atm$$

$$n_{N_2} = \frac{n_{N_2} RT}{V} = \frac{0.0357mol \cdot 0.082atm \cdot L \cdot 398K}{10L} = 0.117atm$$

$$P_{Total} = P_{O_2} + P_{H_2} + P_{N_2} = 1.63atm + 0.102atm + 0.117atm = 1.85atm$$

$$P_{total} = 1.63atm \cdot mol \cdot K$$

په عمومي ډول د گازونو د مخلوط سیستم ټول فشار کو لايي شو د لاندي فورمول په واسطه محاسبه کړو:

$$P_{Total} = \frac{n_{Total} RT}{V}$$



۶- ۹: د گازونو د مالیکولونو د خپرېدو او نفوذ په اړه د گراهام قوانین

په ۱۸۲۹م کال انګلیسي عالم توماس گراهام *Tomas Graham* لازمي څېړنې د خپرېدو د چټکتیا (*Diffusion*) او نفوذ (*Effusion*) پر بیلابیلو گازونو باندې سر ته ورسولي. څېړلنه هغه اصطلاح ده چې له یوه محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالېږي؛ د بیلګې په ډول: کله چې غذا د پخیدلو په حال کې وي، د غذا د پخولو د لوړېښي څخه گازونه بهر ته وځي او په چاپیریال کې خپرېږي چې مونږ یې د خپل شامې د حس په واسطه د غذا بوی حس کوو.

گراهام پیدا کړه چې د گازونو د نفوذ چټکتیا په غازي محیط کې، د گازونو د کثافت د جنر له مربع سره معکوس متناسب دی:

$$1\text{-----}V = \frac{K}{\sqrt{D}} \text{ د گاز د خپرېدو چټکتیا}$$

د A او B دوو گازونو د نفوذ نسبت کېدای شي داسې لاس ته راوړل شي:

$$2\text{-----}V = \frac{K}{\sqrt{D_A}} \text{ د گاز د خپرېدو چټکتیا}$$

$$3\text{-----}V = \frac{K \sqrt{D_A}}{\sqrt{D_B}} \text{ د گاز د خپرېدو چټکتیا}$$

$$4\text{-----}\frac{V_A}{V_B} = \frac{\sqrt{D_B}}{\sqrt{D_A}}$$

1 او 4 معادله د گراهام د خپرېدو د قانون په نوم یادېږي
په ټاکلي تودوخه او فشار کې د گازونو مالیکولي کثافت او مالیکولي کتله یو له بل سره ښه پرتېږي
اړیکې لري:

$$5\text{-----}D = \frac{m}{v}$$

$$6\text{-----}V = \frac{nRT}{P}$$

د V قیمت له (6) معادلې څخه په (5) معادله کې معامله کوو، حاصلېږي چې:

$$7\text{-----}D = \frac{\frac{m}{nRT}}{\frac{mP}{nRT}} = \frac{m}{P}$$

$$8\text{-----}n = \frac{m}{M}$$

$$D = \frac{mP}{nRT} = \frac{mP}{1 \cdot nRT} \cdot \frac{M}{M}$$

$$9\text{-----}D = \frac{PM}{RT}$$



د دو ثابتو د ضرب حاصل او د تقسیم حاصل له دریم ثابت سره مساوي دي ؛ يعنې:

$$\frac{P}{RT} = K$$

$$D = MK \text{ -----10}$$


$$D \approx M \text{ -----11}$$

خړنگه چې د گازونو مالیکولي کتله اود گازونو مالیکولي کثافت یو له بل سره نیغه اړیکه لري ، نو د گراهام مالیکولي خپریدنی قانون کولای شو د دوو گازونو لپاره په لاندې شکل ولیکو :

$$\frac{V_A(\text{Diffusion})}{V_B(\text{Diffusion})} = \frac{\sqrt{M_B}}{\sqrt{M_A}}$$

گراهام په (1826) م کال کې .بله مقاله یې نشر کړه چې په هغې کې یې د گازونو د نفوذ دیوالونو د کوچنیو سوریو په اړه علمی مطلبونه وړاندې کړيدي ، د یو گاز د مالیکولونو نفوذ د هغه مالیکولي حرکت د دیوال تر منځ له تخلخل څخه عبارت دي. د مالیکول د تیریدو قانون د مالیکولي خپریدنی له قانون سره یوځای دي. د گازونو د تیریدو چټکتیا د دیوال اود تیریدو نیمگړی پرتي د مالیکولي کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې جذر مربع سره د معکوس تناسب لرونکي دي ؛ یعنې:

$$\frac{V_A(\text{Effusion})}{V_B(\text{Effusion})} = \sqrt{\frac{D_B}{D_A}} \quad \frac{V_A(\text{Effusion})}{V_B(\text{Effusion})} = \frac{\sqrt{M_B}}{\sqrt{M_A}}$$



شکل (6-22) د گازونو د نفوذ چټکتیا

لومړی مثال د $\bar{X}$ د یوه نامعلوم گاز د تیریدنی چټکتیا د تخلخل (سوري) لرونکي دیوالونو د سوریو څخه، 0.279 د هایدروجن گاز د تیرونې د چټکتیا له نوموړي دیوال څخه یوځای دی (که چېرې شرایط STP وي) د نامعلوم گاز مالیکولي کتله لاس ته راوړئ د هایدروجن مالیکولي کتله 2.02 ده.

حل:

$$\frac{V_x(\text{Effusion})}{V_{H_2}(\text{Effusion})} = \frac{\sqrt{M_{H_2}}}{\sqrt{M_x}}$$


$$0.279 = \frac{\sqrt{2.016}}{\sqrt{M_x}}$$

جواب:

$$\sqrt{M_x} = \frac{\sqrt{2.016}}{0.279} \quad M_x = \left(\frac{\sqrt{2.02}}{0.279} \right)^2 \quad M_x = 26$$

دویم مثال: د اکسیجن په شتون کې د ایتان له سوځیدو څخه H_2O او CO_2 لاس ته راځي، که چیرې $1.26g$ ایتان د $4.50L$ اکسیجن په واسطه وسوځول شي څو لیتره کاربن ډای اکساید CO_2 او څو لیتره د اوبو براسونه به تولید شي؟ تودوخه $400^\circ C$ او فشار $4.00atm$ دی.

حل:



د اکسیجن مقدار $4.50L$ دی، د $1.26g$ ایتان معادل اکسیجن $4.4L$ دي چې $0.094g$ اکسیجن پرته له تعامل پاتې دي، نو د CO_2 او H_2O مقدار اکیدای شي، په پورتنۍ ډول د ایتان له حجمی مقدار څخه لاس ته راوړل شي.

مشق او تمرین وکړئ

پرویان د اکسیجن په واسطه سوځیږي چې په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې بدل شويدي. یو لیتر پرویان په $12^\circ C$ تودوخه او $8.44atm$ فشار کې د اکسیجن په زیاتي مقدار باندې سوځول شوی دی، د تولید شوي CO_2 حجم د $925^\circ C$ تودوخه او یو اتمو سفير فشار په لیتر باندې محاسبه کړئ.



۶-۱۰: د گازونو جنسي (حرکي) نظريه

تر اوسه مو د ايډيال گازونو مهم خواص د گازونو د قوانينو تر سرليک لاندې؛ لکه: د بایل قانون، د دالتن قانون، د گراهام قانون..... مطالعه کړل، له دې مطالعې څخه پوښتنه پيدا کېږي چې ولې گازونه دا نوموړي خواص له ځانه ښيي؟ تاريخ ټاټه کړي ده چې علوم په ليدو او تجربو پيل شوی دی، نظريې او يا مودلونه د همدې ليدنو او تجربو پر بنسټ ټينگ دي، ويلې شو چې نظريې د مودل پر بنسټ ټينگې دي، دموډلو پر بنسټ کيدای شى چې د يو سيستم فورمول او خواص روښانه شي. د گازونو حرکي نظريه چې هغې ته حرکي نظريه هم ويل کېږي، د گازونو د طبيعت او فزيکي مودل د حرکت څرنگوالي روښانه کوي، دا نظريه د لاندې فرضيو پر بنسټ ولاړه ده:


1 - گازونه د ډيرو زياتو شميرو کوچنيو ذرو (اتومونو او ماليکولونو) څخه جوړ شويدي او دا ذري دومره کوچني دي چې د هغوی د حجم اندازه د هغو ترمنځ د فاصلو په پرتله په منځني ډول د لويښي هغه حجم چې گازونو په هغې کې ځای نيولي دی، ډير کم دي او د لويښي دننه د گازونو اعظمی حد د ذرو ترمنځ له خالي فضا څخه جوړه شوي ده.

2 - د گازونو تشکيل کوونکي اتومونه او ماليکولونه پرله پسې د حرکت په حال کې دي او د هغوي حرکت بى نظم، چټک او پر خط نيغ دی، د گازونو د ذرو ددې حرکت په پايله کې يو له بل سره ټکر او هم د لويښي له ديوال سره ټکر کوي، دا ټکرونه الاستيکي (بیرته گرځيدونکي) دي. څرنگه چې په هر ټکر کې د ټکرونکو ماليکولونو حرکي انرژي بدلون نه کوي، په بل عبارت د دې امکان شته دي چې ماليکولونه په خپل منځ کې خپله سيستيک انرژي له لاسه ورکړي؛ خو د دوو ټکر کوونکو ماليکولونو د سيستيکي انرژي مجموعه ټاټه پاتې کېږي.

3 - په گازونو کې ماليکولونه او يا اتومونه جلا يو له بل څخه ځای لري چې هيڅ د جاذبې او دافعي قوه د گازونو د اتومونو او ماليکولونو ترمنځ شتون نه لري. (د ټکر دوخت په استثنا)

4 - د ذرو (ماليکولونو او يا اتومونو) حرکت په گازونو کې بيلا بيلو شسيو کې کيدای شي چټک او يا ورو وي. ځينې ذري چټک حرکت لري او ځينې د هغوی ورو حرکت سرته رسوي؛ پر دې بنسټ د گازونو د ماليکولونو حرکي انرژي هم په لويه ساحه کې د خوځېدو په حالت کې دي، خو د گازونو د اتومونو او ماليکولونو منځنۍ حرکي انرژي د مطلقې تودوخې سره نېغه اړيکه لري او په ټاکلې تودوخه کې ټاټه پاتې کېږي، په (6-13) شکل کې د گازونو تصويري مودل وړاندې شويدې، په دې مودل کې ليدل کېږي چې د گاز يوه ټاکلې اندازه په رښتيا د ډيري فضايي خاليگاډو لرونکي ده او دا خاليگاډي په ډيره چټکيا د گازونو د ذرو په واسطه ډکېږي.





(6- 23) شکل الف- د گازونو حرکي مودل او برونۍ حرکت، ب- د مالیکولونو مقدار چې ذری په کینۍ خواته بمباردمان کوي، ج- په راتلونکۍ شیبورکې چې وضعیت د الف د جز معکوس گرځي.

۶- ۳- ۱۱): رښتياڼي (حقيقي) گازونه :

هغه گازونه د خپل ځان څخه ايډيال خواص وښيي چې د هغوی د مالیکولونو ترمنځ مقابل عمل و نه ليدل شي. (که چېرې د مالیکولونو ترمنځ الاستيکي ټکر موجود نه وي) او د مالیکولونو په واسطه نیول شوي حجم يې د هغه لږښي د حجم په پرتله چې مطلوب گازونه په کې شتون لري، د پام وړ نه وي؛ خو باید پوه شو چې په رښتياڼيو گازونو کې نوموړی شرایط نه شي کيدای چې سل په سلو کې وليدل شي؛ نو رولې شو چې رښتياڼي گازونه د ايډيال له طبيعت او سلوک څخه تېروتنه کوي.

۶- ۳- ۱۲): د رښتياڼيو گازو د لپاره د حالتو معادله

که چېرې د يوه ټاکلي مقدار گاز لپاره درې متحولو P, V, T نه يو تړل اړيکه ورکړل شي، په دې صورت کې، د نوموړو دوو متحولو په ټاکلو سره، درېم متحول کيدای شي په اسانۍ سره پر لاس راولړل شي؛ د بېلګې په ډول: د اکسيجن د گاز 0.1 mol په 0.5 atm فشار او 39°C تودوخه کې يو ټاکلي حجم نيسي. په عمومي صورت هغه رياضيکي معادله چې فشار، حجم، تودوخه او د يو گاز د مولونو شمير يو له بل سره تړلي دي او د گازونو د حالت د معادلې په نوم ياد شوي ده چې دا $PV = nRT$ څخه عبارت ده چې د ايډيال گاز د حالت معادله رانښيي خو دا معادله د حقيقي گازونو حالت څرګندولی نه شي.

وانډر والس ($Vander - Waals$) په (1873) کال کې د حقيقي گازونو د حالت معادله د

$RT = P_1 \frac{a}{v} (v - b)$ په بڼه د یو مول حقیقي گاز لپاره د ایډیالو گازونو د حالت د معادلې په پام کې نیولو سره او د فشار اغیزه په حقیقي گازونو باندې وټاکله، په پورتنۍ معادله کې a او b مثبت ثابتونه دي چې د هر گاز د ټاکلو ځانګړتیاو څخه عبارت دي، که چېرې د گاز کثافت ډیر کم وي، د گاز حجم (V) زیات دي او د b ارزش د حجم (V) په پرتله خورا ډیر کوچنی دي چې کیدای شي د هغه له پام څخه وغورځول شي، په دې حالت کې $\frac{a}{V^2}$ صفر ته نږدې کیږي، دلته د ولندرس والس معادله د ایډیالو گازونو د حالت معادلې ته نږدې کیږي، داسې چې:

$$\frac{PV}{RT} = z, \quad P = P \left(1 + \frac{a}{V^2} \right), \quad P_v = nRT, \quad v - b = v$$

او a مقدار کیدای شي د تجربې په واسطه د هر گاز لپاره لاس ته راوړل شي، په (6 - 3) جدول کې د ولندرس والس د ثابتو (a او b) مقدار ښودل شوی دی:

(6 - 3) جدول د حقیقي گازونو ثابتونه

گازونه	$a(\text{liter.atm/mol}^2)$	$b(\text{liter/mol})$
H_2	0.244	0.0266
He	0.3412	0.0237
N_2	1.390	0.03913
O_2	1.360	0.03183
CO_2	3.59	0.0427
CO	1.485	0.03985
CH_4	2.25	0.0428
NH_3	4.17	0.0371
H_2O	5.464	0.03049
NO	1.340	0.02789

مثال: د 10g په اندازه د میتان گاز تودوخې په 25°C کې یوه لیتره لوښي کې ساتل شویډي نوموړي گاز باندې وارد شوی فشار د ایډیال گازونو د قانون او واندر والس معادلې پر بنسټ محاسبه کړئ ، b, a قیمتونه له (6 - 3) جدول څخه په لاس راوړي.

حل : الف :

$$m = 10\text{g} \quad P = \frac{mRT}{MV}$$

$$P = \frac{10\text{g} \cdot 0.062\text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K} \cdot 298\text{K}}{16\text{g} \cdot \text{L}}$$

$$V = 1\text{L iter} \quad P = 15.3\text{atm}$$


$$P = ?$$

ب

$$M = 16$$

$$\left(P = \frac{nRT}{V-n} - \left(\frac{n^2 a}{V^2}\right) = \frac{0.0625\text{ mol} \cdot 0.082\text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K} \cdot 298\text{K}}{1\text{L} - 0.625\text{ mol} \cdot 0.428} - \frac{(0.625\text{ mol})^2 \cdot 2.25\text{L}^2\text{atm}}{\text{L}^2 \cdot \text{mol}^2}\right. \\ \left. P = 14.8\text{atm}\right.$$

د واندر والس معادله د گازونو د حالت د عمومي معادلې په پرتله په ښه توګه کولای شي چې حقیقي گازونه توصیف کړو (6 - 25) شکل د یو مول CO_2 د حالتونو څرنگوالي او د PV وضعیت په 350K تودوخه په تجربی ډول راښی ، همدارنګه د هغوی د حالت څرنگوالی او تجربی خواص د ایډیال گاز د حالت معادلې د واندر والس معادلې په وړاندې پرتله کوي. نور معادلې هم د گازونو د حالت د محاسبې په خاطر وړاندې شوي دي چې د واندر والس د معادلې په نسبت ډیرې ښه دي؛ مګر د هغوی د ثابتونو شمیر له پنځو څخه ډیر وي .



(6 - 25) شکل د حالتونو ګراف د یو مول گاز لپاره په مطلقه تودوخه کې



مشق او تمرین وکړئ

د لاندې گازونو د a او b اندازه د هرې جوړې لپاره پرته کړئ

الف - $H_2(g)$ او $NH_3(g)$ ب - $N_2(g)$ او $I_2(g)$

(6-3) جدول د گازونو، مایعاتو او جامداتو ځینې ځانګړتیاوې

جامدات	مایعات	گازونه
1 - ټاکلی شکل لري. (د شکل د بدلون مقاومت) 2 - تقریباً تراکم نه قبلوي. 3 - د هغو کتلې د مایعاتو په پرتله لویې دي. 4 - د سیال شکل نه لري 5 - د ذرو خپرېدل یې کم دي او د مالیکولونو حرکت یې ډیره وړو دي. 6 - د هغو مالیکولونه یو له بل سره نښتي دي، یوازې اهتزازي حرکت لري.	1 - ټاکلی شکل نه لري او په بیلابیلو لوبڼو کې بیلابیل شکلو ته ځانته غوره کوي. 2 - د ټاکلي حجم لرونکي دي او د تراکم کیدلو خاصیت نه لري. 3 - د هغو کثافت لږ څه لوي دي 4 - د سیال د حالت لرونکي دي 5 - د هغو ذرې په نورو مایعاتو کې د خپرېدو د وړتیا لرونکي دي. 6 - د هغو د ذرو ترمنځ خالیګا وي ډیرې لږ دي چېک او دري بعلي، بې نظمه حرکت لري.	1 - معین شکل نه لري. (د ظرف ټول حجم چې په هغه کې خالي لري په بشپړه شکل نیسي) 2 - متر اکم کیدا شي. 3 - د ډیر ټیت کثافت لري او د هغوي کتلې ډیر کوچني دي. 4 - د سیال شکل لري. 5 - چېک حرکت لري او ټیټ دي. 6 - د چېک حرکت لرونکي دي او هر لور ته په درې بعلي شکل حرکت کوي.



د سپرم څپرکي لنډيز



- هر ماده کولي شي د محيطي شرايطو له کبله د دريو حالتونو (جامد، مايع او گاز) لرونکي وي.
- گازونه هغه مواد دي چې د هغو جوړوونکي ذرې يو پر بل باندې ډيره لږه اغيزه لري ، د هغوی ذرو د جذب قوه يو پر بل باندې ډير لږه ده او د نامنظم حرکت لرونکي دي، په لوړ تودوخه او لږ فشار کې دگازونو د ذرو حرکت چټک دي.

- د جامداتو خواص د گازونو له خواصو څخه توپير لري، گازونه ډير لږ کثافت لري ، په داسې حال کې چې جامدات د لوړ کثافت لرونکي دي. گازونه د فشار په پايله کې تراکم کوي ؛ خو جامدات ډير کم د تراکم کيدلو ځانگړتياوي لرونکي دي. جامدات کلک او مايلدونکي دي ، په داسې حال کې چې گازونه دا حالت نه لري .

- مايعات د جامداتو او گازونو په پرتله ځانگړی خواص لري ؛ د بيلگې په ډول: د موادو د ذرو ترمنځ يي د جذب قوه په مايع حالت کې ډير ده ؛ خو د جامداتو په نسبت ضعيفه ده.

- په ثابت تودوخه ($T = Constant$) کې د گازونو د ټاکلي اندازې حجم له فشار سره معکوسه اړيکه لري .

- په ثابت فشار ($P = Constant$) د گازونو ټاکلی حجم له تودوخې سره نېغ متناسب دی.

- د بيلابيلو گازونو مساوي حجمونه د فشار او تودوخې د يو شان شرايطو لاندې د مساوي شمير ماليکولونو لرونکي دي (د اوگدرو لومړی قانون). د بيلابيلو گازونو ذرو (ماليکولونه، اټومونه او ايونونه) مساوي اندازه ، د فشار او تودوخې تر يو ډول شرايطو لاندې مساوي حجمونه ځانته غوره کوي.

- د گازونو دمخلوط په واسطه وارد شوي مجموعي فشار، د گازونو د مخلوطو د اجزاوو د هر جز فشار د جمعې له حاصل سره مساوي دی.

- گراهام پيدا کړه چې د گازونو د تيريدو چټکتيا د کثافت له جذرمربع سره معکوس متناسب دي.
- د گازونو د حالت معادله د يو مول گاز لپاره $PV = nRT$ عبارت ده چې په دې معادله کې V د گاز حجم دي ، د پورتنۍ معادلې څخه پايله اخلو چې:

$$\frac{PV}{RT} = Z$$



د سپرم خپرکي پوښتي څلور ځوابه پوښتي

- 1 - گازونه هغه مواد دي چې د هغوی جوړوونکي ذري پیر بل باندې.....لري.
الف- ډیر کمه اغیزه د- ټول
ج- نامنظم حرکت د- ټول
2 - جامدات هغه مواد دي چې لرونکي دي.
ب- معین شکل ب- معین حجم
ج- الف او ب دواړه د- هیڅ یو
3 - د مایعاتو خپریدل د گازونو پر نسبت..... دی او په مایعاتو کې د مالیکولونو ټکر
..... دی.
الف- ورو ب- چټک، ډیر زیات ج- نورمال، ډیر زیات د- زیات، نورمال
4 - په ثابت تودوخه ($T = const$) کې له یوې ټاکلې اندازې د گازونو حجم، له فشار سره
څه تړون لري؟
الف- مستقیم متناسب ب- معکوس متناسب
ج- تناسب نه لري د- د الف جز درست دي.
5 - په ثابت فشار کې د سانتي گراد د یوې درجې تودوخې په زیاتوالي، د گاز حجم په نسبت
له $0^{\circ}C$ څخه انبساط حاصلوي.
الف- 1:237 ب- 1:1 ج- 2:3 د- 100:1
6 - د بیلابیلو گازونو مساوي حجمونه د فشار او تودوخې د یوشان شرایطو لاندې د مساوي شمیر
لرونکي دي.
الف- ایونونه ب- مالیکولونه ج- اټومونه (په هغه گاز کې چې عنصر وي) د- ټول
7 - یو مول د هر گاز په STP شرایطو کې حجم نیسي.
الف- 28,4L ب- 22 mL ج- 22,4mL د- 22,4m³
8 - که چېرې د یو مول گاز مولې کتله د یو مول گاز په حجم تقسیم شي، په ستنډرډ شرایطو کې د
..... په نوم یادوي.

الف- نسبتی کتله ب- ترکیبی کثافت
ج- مولې کثافت د- مخصوص وزن



9 - واندروالس د ریښتیني گازونو معادله په ښودل:.....

الف) $RT(p - b) = Z \frac{pV}{RT}$ (ب) $(p + \frac{a}{V^2})V = ZRT$ (ج) الف و ب (د) هېڅ یو

10 - گازونه د فیرو وړو زرو څخه..... تشکیل شوي دي.

الف) اټومونو (ب) مالیکولونو (ج) ایرونونو (د) ټول ځوابونه سم دي.

11 - د یو لوښی د گازونو فیرو فضا..... فضا جوړه کړي ده:

الف) دکو (ب) خالی (ج) د اټومونو (د) د مالیکولونو

تشریحي پوښتنې

د ټولو تمرینونو په حل کې باید فرض شي چې گازونه ایډیال دي.

1 - ولې ځینې مواد په عادي شرایطو کې د مایع په حالت او ځینې نور د جامد او یا گاز په حالت پیداکېږي؟

2 - یو اندازه N_2 گاز چې حجم یې 58L دی ، تر محیطي فشار لاندې دی چې پر هغه 125mmHg فشار زیات شوی دی او حجم یې 49.6ml کمښت موندلی دی ، په دې گاز باندې لومړنی محیطي فشار (په ثابت تودوخه) څومره دی ؟

3 - A د $25^\circ C$ لوښي 48.2L حجم لري ، چې N_2 گاز لرونکي دي ، دهغه تودوخه $25^\circ C$ او فشار یې 8.35atm دي. د B لوښي حجم نامعلوم دی او د He گاز په کې شتون لري چې په هغې باندې وارد شوي فشار 9.5atm او تودوخه $25^\circ C$ ده. د A او B لوښي یو له بل سره وصل شوي دي ، د گازونو د مخلوط فشار په دواړو لوښو کې 8.7atm ته لوړ شوی دی ، د B حجم پیدا کړئ.

4 - په یوه ازماښتي دستگاه $1 \cdot 10^{-15} \text{ mmHg}$ فشار شته دي ، په ازماښتي دستگاه کې یو لیتره یو لوښي په پام کې ونیسئ که چېرې تودوخه $0^\circ C$ وي ، په هغه لوښي کې چې د هوا څخه ډک دي ، د مالیکولونو اندازه به څومره وي ؟

5- په یوه ستوري کې د هایدروجن د گاز کثافت 10 g/cm^3 او د هغوی تودوخه $100K$ ده په دې ستوري کې د هایدروجن فشار به څومره وي ؟

6 - د اوبو په سطح یوه کروي پوکانه چې 2 cm قطر لري ، په $25^\circ C$ تودوخه او محیطي فشار 1atm کې به د پوکانه د اوبو د پراس څومره مالیکولونه لري ؟

7 - په $177^\circ C$ تودوخه او 2atm فشار د نایټروجن د گاز کثافت 1.25 g/L دي ، په دې




شرایطو کي هغه په پنځه لیتره لوښي کي خو مره مالیکو لونه په دي شرایطو کي موجود وي ؟

8 - په یو سلندر کي $1.5kg$ د N_2 گاز شته دی چي فشار په هغه $31.8atm$ دی، خو مره N_2 په دي سلندر کي زیات شي چي په ثابت تودوخه کي د سلندر فشار $75atm$ لوړ شي ؟

9 - خیال وکړئ چي د گاز دوه نموني A او B تاسی ته درکړل شوي دي ، د A د گاز منځني چټکتیا د B د گاز د منځني چټکتیا دوه برابره ده (البته د نوموړو گازونو د مالیکو لرونو چټکتیا) که چیري د دواړو نمونو مالیکولي کثافت یو شان او د B د گاز فشار $3atm$ وي، د A د گاز فشار پیدا کړئ.

10 - په ثابت تودوخه او $700mmHg$ فشار کي یو گاز $30L$ لیتره حجم لري ، د نوموړي گاز حجم په STP شرایطو کي پیدا کړی.

اووم چپرکی



کیمیاوي تعاملونه


په نړۍ کې زیات بدلونونه اووښتونونه ترسره کېږي چې د هغه بیلګه کېدای شي د اوبو اووښتون په نېټه او د اوبو د بېر اسونو بیا سپېدل د باران یا واورو اوږلۍ په نېټه، د ډبرو توره کېدل او د هغوی اووښتون په خاورو، شګو او نور وړاندې شوی دي، دا ډول بدلونونه فزیکي دي، د فلزونو زنگ وهل، د سون د موادو سوځېدل، د دوآګانو لاسته راوړل او د وسایلو د ډولونو او زینتی موادو جوړول او نور د کیمیاوي بدلونونو ډول دي چې دا ډول بدلونونه د کیمیاوي تعاملونو په نوم یادېږي په دې څپرکي کې د کیمیاوي تعاملونو ډولونه او د کیمیاوي تعاملونو شکلونه به زده کړئ او هم د کیمیاوي تعاملونو د معادلو سم لیکل او سمه لاره به یې مطالعه کړئ.



۷- ۱: د کیمیاوي معادلې مفهوم

کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو ښودونکی ده چې په سمبولونو او د مرکبونو فورمولونو په وسیله ښودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو یا د لومړنیو موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړنیو موادو د تعامل په پایله کې حاصلیږي، د تعامل د محصول په نوم یادېږي.

په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکو مواد کيږي لوري ته او د تعامل محصول د معادلې ښی لوري ته لیکي او د (=) علامې په عرض په معادله کې له وکتور (→) څخه ګټه اخلي، وکتور «ورکوي» معنی راښيي؛ د بیلګې په ډول:



(7-1) شکل د اوسپني او سلفر تعامل او د فیریم سلفایډ جوړیدل

مخکې له دې چې کیمیاوي معادله ولیکو، باید د تعامل ډول او د موادو فورمول وپېژنو کیمیاوي معادله د عملي تجربو د پایلو ښانودونکی ده او د هغوی مواد د لیدلو او لمس کولو وړ دي، د کیمیا د هدفونو څخه یو د اصولو او قوانینو کشف او پوره کیدل دي چې د تعاملونو د محصولونو راننوتنه کولای شي، که څه هم دکانډ په پانې لیکنې په سمبولیک ډول د تعامل کوونکو موادو او محصول د ځانګړتیاو پوره نمایندګۍ په معادله کې نه شي کولی؛ خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي، تر څو کیمیاوي معادله په سم او دقیق ډول وښيي. د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره بیلابیلې لارې په کارول شوي دي چې د هغوی د هر یو معرفي په لاندې ډول کورنې؛ مخکې د معادلو له لیکلو د لارو د وړاندې کولو باید ووايو چې په کیمیاوي معادلو کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د موادو حالتونه هم ټاکي چې په لاندې جدول کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د موادو حالت لیدلی شي:

(1-7) جدول د تعامل کونکو او د تعامل د محصول موادو حالت

مفهومونه	سمبولونه
ماده د گاز په حالت ده	(Gas=(g
ماده د مایع په حالت ده	(Liquid=(l
ماده د جامد په حالت ده	(Solid = (s
اوېلن محلول	(Aqueouse=(aq
بیلابیل محلولونه	(Solved=(sol
ورکوي	→
تفاعل دواړو لوروته د محصول مواد بیا په لومړنیو موادو اوښتي دي.	←→
تفاعل د تودوخې په شتون کې ترسره کېږي	→ ^Δ
په تعامل کې د کټلست شتون ضروري دي.	→ ^{Ni}
تفاعل د فشار او تودوخې په شتون کې	→ ^{120° C, 5 atm}

۷-۱-۱: په تورو لیکلي معادله

په دې ډول معادلو کې یوازې د تعامل کونکو او تعامل د محصول لانو د موادو نوم په تورو لیکل کېږي چې د تعامل کونکو او د تعامل محصول لانو د موادو تجارتی او یا علمي نوم وي. په دې معادلو کې تعامل کونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول د وکتور ښی لوري ته لیکل کېږي، دا ډول معادلي غیر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي؛ د بیلګې په ډول:

گاز کاربنیک + ژوندي چرڼه $\xrightarrow{\text{تودوخه}}$ د چوڼي تیره (په پښتو ممیز نومونه)
 کاربن ډای اکساید + کلسیم اکساید $\xrightarrow{\text{تودوخه}}$ کلسیم کاربونیټ (علمي نومونه)

(۷-۱-۲): سمبولیکي معادلي

په دې ډول معادلو کې له کیمیاوي موادو، سمبولونو او فارمولونو څخه ګټه اخیستل کېږي چې د تعامل کونکو او د تعامل د محصول د موادو د فزیکي حالت په پام کې نیول کېږي. څرنګه چې

له سمبولیکو معادلو څخه ډیر معلومات او اطلاعات نسبت د تورو د لیکلو معادلو حاصلیږي؛ د دې کبله هغه ډیرې په کاروړي، پورتني د تورو لیکل شوی معادله په لاندې ډول کو لاي شو چې په سمبولیک شکل ولیکو:



فعالیت

د لاندې افادو لپاره د تورو لیکل شوی او سمبولیک معادلي ولیکي:

- 1 - د میتان د گاز د سوځولو څخه، د کاربن ډای اکساید گاز او اوبه تولیدیږي.
- 2 - بور (II) اکساید جامد او کاربن (گرافیت) په لوړه تودوخه، جامد بور کارباید (B_2C_2) او د کاربن مونوآکساید (CO) گاز جوړوي.
- 3 - د نایتروجن ډای اکساید گاز د اوبو سره د تعامل په پایله کې د نایتريک اسید گاز او نایتروجن II اکساید گاز تولیدیږي.
- 4 - د امونیا گاز او فلورین گاز د تعامل څخه ډای نایتروجن تترافلوراید په لاس راځي.
- 5 - امونیم ډای کرومیت ته د تودوخې ورکولو په واسطه د نایتروجن گاز، د اوبو پراسونه او جامد کرومیم (III) اکساید حاصلیږي.

۷-۳: توصیفی معادله

په دې روښ کې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصول د عنصرونو او مرکبونو د یوې توصیفی جملې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي؛ د بیلګې په ډول: کلسیم کاربونیټ د تودوخې په اثر په کلسیم اکساید او د کاربن ډای اکساید په گاز تجزیه کیږي.

فعالیت

- 1 - له امونیم نایترایټ د تجزیني څخه د امونیا گاز او اوبه حاصلیږي، د هغوي د تورو لیکلې او سمبولیکه معادله ولیکي.
- 2 - د مالګې تیزاب د سودیم هایدروکساید سره تعامل کړي، مالګه او اوبه یې جوړې کړي دي، د تورو لیکلو او سمبولیکه معادله ولیکي.

۷-۱-۴: شکلي معادله

د معادلو د لیکلو په دې طریقه کې د شکلونو څخه د اتومونو او مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلو د لیکلو په غرض گټه اخستل کېږي؛ د بیلګې په ډول: هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کړی اوبه یې جوړوي کړېدې:



(2-7) شکل: د هایدروجن او اکسیجن تعامل او د اوبو جوړېدلو شکلي معادله

فعالیت:



د لاندې تعاملونو شکلي معادلې ولیکئ:

- 1 - د هایدروجن او نایتروجن تعامل او د امونیا تشکیل
- 2 - د کاربن او اکسیجن تعامل او د کاربن ډای اکساید تشکیل
- 3 - د هایدروجن او کاربن تعامل او د میتان تشکیل

۷-۲: د کیمیاوي تعاملونو ډولونه

زمونږ په چاپیریال (محیط) کې هره ورځ تعاملونه ترسره کېږي چې زموږ په ژوند باندې نیغه او یا په بله لاره اغیزه لري، د همدې دلیل له کبله ضروري ده چې د کیمیاوي تعاملونو په اړه معلومات حاصل شي؛ مګر کیمیاوي تعاملونه ډیر زیات دي چې زياتې مطالعې او زيات وخت ته اړتیا لري. د یادولو وړ ده چې کیمیاوي تعاملونه د کیمیاوي مطالعاتو لپاره برخه تشکيلوي، د دې کبله کیمیا پوهانو کیمیاوي تعاملونه په بیلابیلو ډولونو ویشل دي او د تقسیم بڼې د لاره یې د هغوي د میخانیکیت په پام کې نیولو سره په لاندې جدول کې لنډوو.



7-2) جدول د کیمیاوي تعاملونو چولونه

رد شمېره	طبقه بندي	چولونه	تعريفونه	مثالونه
1	د الکترون انتقال	اکسېدېشن او ريډکشن	د ځينو اتومونو د اکسېدېشن شمېر بدلون مومي	$C H_4 + 2 O_2 \longrightarrow C O_2 + 2 H_2 O$ $C a^{2+} O + H_2 O \longrightarrow C a^{2+} (O H)_2$
2	د انرژي انتقال	اگر تر ټولو کم (انرژي) تودوخو توليدونکي	په ټاکلي اندازه انرژي ازادوي	$C + O_2 \longrightarrow C O_2 + E$ $2 H g O + E \longrightarrow 2 H g + O_2$
3	بېرته گرځيدل منل	رجعي (گرځېدونکي)	د تعامل محصول بيا په لومړنيو مواد تېدلایږي	$3 H_2 + N_2 \longleftrightarrow 2 N H_3$
		غیر رجعي (نه گرځېدونکي)	د تعامل محصول بيا په لومړنيو موادو نه تېدلایږي	$C_3 H_8 + 5 O_2 \longrightarrow 3 C O_2 + 4 H_2 O + E$
	د موادو څرنگوالي	سوځېدل	د موادو تعامل له اکسيجن سره چې تودوخه او روښنایي توليدوي	$C H_4 + O_2 \longrightarrow C O_2 + H_2 O$
4		هېلډروليز	د اوبو په واسطه د يوي مادې ټوټه کيدل په څو مادو او د اوبو د ايونونو متقابل عمل د مرکب د ماليکول اېوونه سره	$N H_4 C l \xrightarrow{H_2 O} N H_4 O H + H^+ + C l^-$
	خښی شدن	د تيزاب او القلي ترمنځ تعاملونه		$H C l + N a O H \longrightarrow N a C l + H_2 O$

$O_3 \longrightarrow O_2 + O$ Radical	هغه تعاملونه چې د رادیکالونو پریښود ترسره کېږي			
$C_2H_4 + H_2 \longrightarrow C_2H_6^{+4}$	یوه ماده په بله ماده زیاتیږي	زیاتیدل		
$C_2H_6O \longrightarrow C_2H_4 + H_2O^{-2}$	له مالیکول څخه یو جز جلا کېږي	لږي کېدل	میخانیکیت	5
$HNO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow HSO_4^- + H_2O^+ + NO_2^+$	د یو الکترون خړوبونکي نږدې په تولید سره په تولید سره تعامل پیل کېږي	الکترون خړوبونکي		
$2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$	له یو مادي څخه لږې مادي حاصلېږي	تجزیه	د لوړېږنو موادو او د تعامل د محصولونو مقدار	
$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$	د څو مادو څخه یوه ماده حاصلېږي	ترکیب		6
$2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH$	یو اویا څو ائومه د یو یا څو ائومونو ځای په مالیکول کې نیسي	ساده تعویض	ځای نیول	
$HNO_3 + NaOH \longrightarrow NaNO_3 + H_2O$	د مرکبونو اېوونونو تعویض د یو بل په واسطه	دوه گړني تعویض		7

۷-۲-۱: تعویضي تعاملونه

۷-۲-۱: یو گوني يا ساده تعویضي تعاملونه: په دې ډول تعاملونو کې د یو خالص

عنصر ائومونه، د بل عنصر ائومونه په یو مرکب کې تعویضوي، یا په بل عبارت د یو خالص عنصر ائومونه د بل عنصر ائومونه له مرکب څخه بې ځایه کوي او خپله په مرکب کې د هغه ځای نیسي؛ د بیلگې په ډول: کلورین له پوتاشیم بروماید سره تعامل کوي چې په پایله کې د پوتاشیم بروماید د مرکب برومین د کلورین په واسطه له لاندې معادلې سره سم تعویض کېږي:




(د بروماید آیون د کلوراید په آیون تعویض شویږي)
المونیم د اوسپنې ځای په فیریم II اکساید نیولی دی.



په ځينو ساده تعويضي تعاملونو کې کېدای شي له لاندې اړیکو څخه د نمونې په ډول گټه واخلي:



لاندې شکل يو گوني تعويضي تعامل د جست او کاپر سلفيتو او دهغوي د تعامل معادله نښي:



(7 - 3) شکل له جستو سره د کاپر سلفيت تعامل

فعاليت :




الف- دا لاندې ساده تعويضي تعاملونه بشپړ کړئ:

1 - المونيم د مالگې له تيزاب سره تعامل کړي، المونيم کلورايډ او هايډروجن پې تشکيل کړئ دي.




4- مس د سپینو زرو د نایتر ویترو له محلول سره تعامل کړي.



ب- د مالګې له تیزاب څخه د هایدروجن بې ځایه کیدل د جستو دفلز په واسطه.

د اړتیا وړ لوازم او مواد: فلاسک، سپوږن، زنګون کوری نل، رابري نل د 50cm په اوږدوالي، د اوبو تشت، عادي اوبه، خلور عدده تست تیوبونه، پایه-گیرا (نیورونکي)، تست تیوب دانې، د جستو 5 یا 6 ټوټې، د مالګې او یا گوګړو د تیزابو د به اندازه 10mL

کړنلاره: د جستو ټوټې په یوه فلاسک کې واچوئ او د هغې له پاسه د مالګې تیزاب ور زیات کړئ د شکل سره سم بې ځایه شوی هایدروجن امتحان کړئ.



(4-7) شکل : د جستو تعامل له کاپر سلفیت سره

1- د تعامل معادله ولیکئ .

2- کوم بل فلز هایدروجن بې ځایه کولی شي ؟ لست یې کړي .

خپل ځان امتحان کړئ.

دا لاندې حروفې او په تورو لیکل شوو ساده تعویضي معادلو ته ځیر شئ:


الف- د هایدروجن ګاز + القلي $\longrightarrow$ اوبه + فعاله فلزونه

ب- ضعیف غیر فلز + نوي مالګه د $\longrightarrow$ ځینې تیزابونه + د فلزونو ځینې ټوټې

ج- د هایدروجن ګاز + نوي مالګه $\longrightarrow$ مالګه + ډیر فعاله غیر فلز

د- ډیر ضعیف فلز + نوي مالګه $\longrightarrow$ مالګه + ډیر فعاله فلز

لاندې معادلې له پورته پر تیتورو لیکل شوو معادلو له کومو یوې سره سمون لري ؟ د هغوی شمیره د هغو په مخ کې ولیکئ.




زیات پوه شي!



۲-۱-۲: دوه ګونې تعویضي تعاملونه

په دې ډول تعاملونو کې د یو مرکب ایونونه او اتومونه د بل مرکب د ایونونو یا اتومونو په واسطه تعویض کیږي او یا په بل عبارت د دواړو مرکبو ایونونه یو له بل ځایونه په مالیکول کې نیسي، د دواړو منحلو مالګو تعاملونه چې د یو غیري منحلې مالګې په تشکیل پای ته رسېږي، د دوه ګونې تعویضي تعاملونو له ډلې څخه شمېرل کېږي:




5-7) شکل تعویضي تعاملونه او شکلي معادله یي

د کټیون تعویض



د انیون تعویض



د دوه ګونو تعویضي تعاملونو عمومي شکل په لاندې ډول دی:



خلورم ترکیب درېم ترکیب لومړی ترکیب دویم ترکیب

په یاد ولرئ چې په دوه ګونو تعویضي تعاملونو کې څه نا څه یو د تعامل د محصولو لاثو غیر منحلې ماده، لویه یا ګاز ده.


فعالیت

د سپینو زرو د نایتریتو تعامل له سودیم سلفایډ سره.

د اړتیا وړ لوازم او مواد: تست تیوب، بنښنه یي میله، د تودوخې سرچینه، د سپینو زرو نایتریت، سودیم سلفایډ په یو تست تیوب کې واچوئ او پر هغه باندې د سپینو زرو نایتریت ورزیات کړئ، تست تیوب د ګیرا په واسطه ونیسي، د یوې دقیقې لپاره هغه ته تودوخه ورکړئ، په دې صورت کې به تور رسوب تشکیل شوي وي چې د سپینو زرو دسلفایډ څخه عبارت دي:



عبارت دي:



(6-7) شکل د سپینو زرو نایتریتو تعامل د سودیم سلفایډ سره

له رسوب څخه سیریره بله به کومه ماده وګورئ چې د تعامل د محیط د بلون سبب ګرځېدلي ده؟

۷-۲: انحلايت او د محلولونو جوړېدل:

کیمیاوي مواد د کیمیاوي متقابل عمل او د فزیکي متقابل عمل پرنښت یو په بل کې حل شوي دي؛ نو له دې کبله د موادو انحلايت کېدای شي یو ډول قسمی تعامل وشمیرل شي. د لاندې موادو انحلايت په اوبو کې مطالعه کوو.

منحل او غير منحل مواد په اوبو کې

مالاګي، القلي او هغه تيزابونه چې د 0.1 mol/L (مول په يو ليتر اوبو کې) څخه زيات په اوبو کې حل شي، د منحل موادو په نوم او که چيرې د $0.1 - 0.001 \text{ mol/L}$ ترمنځ په يو ليتر اوبو کې حل شوي وي، ډير کمه منحل او که چيرې د 0.001 mol/L کم په يوليتر اوبو کې حل شوي وي، د غير منحلو موادو په نوم يادېږي.

هغه مالاګي چې د نايټرېټو NO_3^- د ايونونو لرونکي دي په اوبو کې منحل دي.

ټول اسيتيټونه $(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ په اوبو کې منحل دي.

د کلورېټو (ClO_3^-) ټولې مالاګي له پوټاشيم کلورېټ څخه پرته په اوبو کې منحل دي او پوټاشيم کلورېټ په اوبو کې ډير لږ منحل دي.

ډير کلورايدونه (Cl^-) په اوبو کې منحل دي؛ پرته د PbCl_2 , CuCl , Hg_2Cl_2 , AgCl چې په اوبو کې غير منحل دي (سرب II کلورايد PbCl_2 په ايشيدلو اوبو کې حل کېږي) ډير برومايدونه (Br^-) په اوبو کې منحل دي؛ پرته HgBr_2 , PbBr_2 , CuBr , Hg_2Br_2 , AgBr چې په اوبو کې غير منحل دي او HgBr_2 ډير لږ حل کېږي.

ډير ايدوايدونه (I^-) په اوبو کې منحل دي؛ پرته AgI , Hg_2I_2 , CuI , PbI_2 او HgI_2 چې په اوبو کې غير منحل دي.

ټول سلفيټونه (SO_4^{2-}) پرته له Hg_2SO_4 , Ag_2SO_4 , CaSO_4 , SrSO_4 , BaSO_4 څخه په اوبو کې حل کېږي. ډير زيات غير منحل سلفيټونه د عناصرونو د دوره يي جدول د IIA گروپ فلزونو پورې اړه لري.

سلفايدونه (S^{2-}) په اوبو کې غير منحل دي؛ پرته له دوره يي جدول د لومړي او دويم اصلي گروپ عناصرونو سلفايدونه او امونيم سلفايد $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ چې په اوبو کې منحل دي.

کاربونيټونه (CO_3^{2-}) په اوبو کې غير منحل دي، د دوره يي جدول د لومړي گروپ (القلي فلزونه) عناصرونو او امونيم کاربونيټ $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ په اوبو کې حل کېږي.

فاسفيټونه په اوبو کې غير منحل دي؛ خو $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ په اوبو کې حل کېږي. هايډروکسيلايدونه (OH^-) په اوبو کې غير منحل دي، د لومړي گروپ د هايډروکسيلايدونو (القلي فلزونه) څخه پرته. $\text{Ba}(\text{OH})_2$, $\text{Sr}(\text{OH})_2$ او کلسيم هايډروکسيلايد ډير لږ منحل دي.

فعالیت



د لاندې تعاملونو محصولات ولیکئ.

- 1 - $\text{NaHCO}_3(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq}) \longrightarrow$
- 2 - $\text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow$
- 3 - $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s}) \longrightarrow$
- 4 - $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + \text{NaCO}_3(\text{aq}) \longrightarrow$
- 5 - $\text{NaCl}(\text{aq}) + \text{AgNO}_3(\text{aq}) \longrightarrow$
- 6 - $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{aq}) \longrightarrow$

۲-۲-۷ : تجزيوي تعاملونه


زياتره مرکبونه د تودوخې په بڼه د انرژي د جذبولو، برېښنا، رڼا او ميخانيکي ټکرونو په واسطه تجزيه او په ساده موادو بدلېږي چې د دې تعاملونو عمومي شکل په لاندې ډول دي:



د دې ډول مرکبونو د تجزيې په پايله کې ممکن د تعامل محصولات هم مرکبونه وي، نو C او A مرکبونه دي. که چيرې د تعامل محصول عنصرونه وي نو C او A عنصرونه دي، په همدې ترتيب که چيرې د تعامل د محصول مواد هم عنصر او هم مرکب وي، دلته C عنصر او D مرکب دي، پر دې بنسټ کېدای شي چې لاندې معادلې د پورتنیو نوموړو تعاملونو په ډول وليکل شي:

- 1 - مرکب + مرکب $\xrightarrow{\text{تودوخه}}$ مرکب
- 2 - عنصر + مرکب $\xrightarrow{\text{تودوخه}}$ مرکب
- 3 - (عنصرونه) عنصر + عنصر $\xrightarrow{\text{تودوخه}}$ مرکب

که چيرې د سيمابو اکسايډ ته تودوخه ورکړل شي، فلزي سيماب او د اکسيجن گاز تشکيلېږي:




شکل (7-7) د مرکبوري اکسايډ د تجزيې شکلي معادله




فعالیت

لاندې مثالونه په څیر سره وگورئ، د پورتنیو تعاملونو د ډولونو په پام کې نیولو سره د هر تعامل په مخامخ کې د 1، 2، او یا 3 شمیر چې د پورتنیو لیکل شویو تعاملونو شمېر دي، ولیکئ:




د تجزیو ډول تعاملونو ګډه ځانګړتیا د پیچلو مرکبونو څخه د ساده موادو تشکیل دي، د تجزیوي تعاملونو له پاره عمومي قاعده کېدای شي په لاندې ډول ولیکل شي:



د زیاتې پوهې لپاره :

فلزي نایتریت د تودوخې په واسطه د فلز په نایترایټ او د اکسیجن په ګاز او په لوړه تودوخه کې د فلز په اکساید د نایټروجن او اکسیجن په ګازونو تبدیلېږي.



پلټنه وکړئ


یاد تڅرښوي تعاملونو لپاره کولای شوي د نوموړو ویلیکونو څخه پرته نوري ویلیکي په دې لوست کې وړاندې کړئ؟

۷- ۲- ۳: ترکیبي تعاملونه

هغه تعاملونه چې د هغوی په پایله کې دوي یا څو ساده مادې یو له بل سره ترکیب شي او یوه پیچلي ماده یا مرکب جوړ شي چې له اتومونو د ډیرو ډولونو څخه تشکیل شوي، د ترکیبي تعاملونو په نوم یادېږي. د دې تعامل عمومي معادله په لاندې ډول ده:



په دې معادله کې CD مرکب دي، A او B کیدای شي چې عنصرونه یا مرکبونه وي یا A عنصر او B مرکب وي، لاندې ترکیبي تعامل وگورئ:



د ترکیبي تعاملونو عمومي معادلې په لاندې ډول دي:

- 1- مرکب (مرکبونه) + مرکب → مرکب
- 2- مرکب → عنصر + مرکب
- 3- مرکب → عنصر + عنصر




لاندې شکل د اوسپني او کلورین جمعې تعامل راښيي.



(9-7) شکل له اوسپني سره د کلورین تعامل



تعاملو نو د شکلو نو شمیر دی له هغه سره یې پرتله کړی:



د دې تعاملونو ډیر شکلو نه ورسره سمون لري:


$$\text{فلز اکسید} \longrightarrow \text{اکسید فلز}$$
$$\text{اکسیجن} + \text{فلز غیر فلز} \longrightarrow \text{فلز اکساید}$$

(قلوي) د فلز هايډروكسايډ → اوبه + فلز اكسايډ


اکسیجن لرونکی تیزاب → اوہ + د غیر فلز اکسائیڈ

مالگه → د غیر فلز اکساید + د فلز اکساید


پولیمیر → مونومیر
 اوبه → اکسیجن + هایدروجن



د هایدروکاربنونو اکسیجني مشتقات → H_2 + غیر مشبوع مرکبونه



مرکبونه



مرکبونه

فعالیت



د سماوارونو او چای جوړونو د منگ لیري کول

په وسایلو کې لکه سماوار او چای جوړش چې اوبه ایشول کېږي، کلسیم بای کاربونیټ او مگنیزیم بای کاربونیټ مالګې چې په عادي اوبو کې منحل دي، د ایشولو په بهیر کې ترسب کوي او په غیرو منحلو مالګو بدلېږي، دا کاربونیټونه په لوښو او وسایلو کې رسوب کوي چې له لوښو د کتلې د زیاتېدلو او د اوبو د وتلو د سموربو (شیر دهن) د بندېدو لامل ګرځي. د وسایلو څخه د منگ د لرې کولو لپاره له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې یو له دوی یې محلول برابول دي.

د اړتیا وړ لوازم او مواد: ګیلاس، هاونګ له لاستي سره، تله، منگ نیولی لوښی 10g د خوړو مالګه، 9g سودیم هایدروکساید، 0.5g پوتاشیم کاربونیټ او 0.2g د څیړی

پرستګی،

چونلاره: د خوړو مالګه، K_2CO_3 ، د څیړی پرستګی او نوموړي مواد له پورتنیو اندزوسره سم په ښه توګه وتلی اوبو له بل سره یې مخلوط کوئ، بیا یې په هاونګ کې ښه وټکوی چې په پوډر تبدیل شي. وروسته یې په یو ګیلاس کې واچوئ او له هغه څخه د منگ د منځه وړلو لپاره وکاروئ.

د چای جوړش ² برخه له حجم د اوبو څخه ډک کوئ، د اوبو د هر لیتر په مقابل کې د قلبي پوډر کوم چې په پورتنۍ ډول لاس ته راوړل شوي دي، ورنیات کوئ، لوښی د تودوخې د سرچینې په واسطه جوړش کوئ، له ایشیدو څخه وروسته هم د دوو تر څلور دقیقو پورې لري نه کوئ او تودوخې ته دوام ورکوئ، له دې څخه وروسته بیا اوبه له لوښی لرې کوئ، په عادي اوسو او د لوښو مینځلو په مایع باندې یې ومینځي، په لوښي کې بدلونونه وګورئ او په خپلو کتابچو کې یې یادداشت کوئ.



۷-۲-۳: د سون تعاملونه

د مواد و تعامل له اکسیجن سره کوم چې د تودوخې او رڼا د تولید سره پورې تړي، د سون تعامل په نوم یادېږي. د فلزونو د سون له تعامل څخه فلزي اکسایډونه او د عضوي مرکبونو له سوځولو څخه د اکسیجن په شتون کې اوبه، CO_2 او انرژي تولیدېږي. که چېرې سلفر لرونکي عضوي مرکبونه وسوځول شي، سلفر ډای اکسایډ او که نایټروجن لرونکي عضوي مواد وسوځول شي، د نایټروجن اکسایډونه، په تیره بیا NO_2 تشکیل کېږي د بیلګې په ډول: د میتان د سوځولو معادله په لاندې ډول ده:



که چېرې د اکسیجن مقدار لږ وي، له کاربن ډای اکسایډ CO_2 سره د کاربن مونو اکسایډ CO یا C لوړګی هم لیدل کېږي.

د اتموسفیر په جګو طبقو کې هایدروجن د اکسیجن په شتون کې سوځي چې په پایله کې اوبه لاس ته راځي:



د اکسیجن تعامل غبرګي فلزي عنصرونو څخه غبرګي فلزي اکسایډونه او له فلزي عنصرونو تعامل د اکسیجن سره فلزي اکسایډونه تولیدېږي د بیلګې په ډول: که چېرته د مګنیزیم فلز د اور د لمبې له پاسه کینودل شي، شعله ور (اور اخلي) کېږي او سوځېږي.



ایا د موادو سوځیدل د ترکیبي تعاملونو له ډولونو څخه دي؟ په اړوند هوا کې د فاسفورس په خپل سر سوځیدل یو د موادو د سوځیدلو له مهمو تعاملونو څخه دي. لاندې شکل د سپین فاسفورس په خپل سر سوځیدل راښيي:



په هوا کې د فاسفور سوځیدل

(10-7) شکل په هوا کې د فاسفورس سوځیدل




فعالیت

د مگنیزیم د فلز سوځول

د اړتیا وړ لوازم او مواد: د مگنیزیم او اورلگیت

کړنلاره: د مگنیزیم د فلز 20cm فینه واخلي، د اورلگیت په واسطه یې وسوځوئ، د هغې تودوخه او رڼا وگورئ سینیې اړې چې د مگنیزیم اکساید دي، وگورئ.



الف

ب
مگنیزیم له اکسیجن سره تعامل کړئ
شکل د مگنیزیم د

مگنیزیم اکساید یې جوړکړئ دي.
سیتم سوځیدل او د تودوخې تشکیل

۷- ۴: اکزوترمیک او اندوترمیک تعاملونه


کیمیاوي تعاملونه د انرژي د جذب او یا ازادولو له کبله په دوو برخو ویشل شوي دي، لومړی برخه یې هغه ډول تعاملونه دي چې د هغه دسره رسېدو په پایله کې د تعامل د محصول سر تېره انرژي د تودوخې او رڼا په شکل هم ازادېږي، دا ډول تعاملونه د اکزوترمیک (Exothermic) تعاملونو په نوم یادوي. د القلیو او تیزابونو زیاتره تعاملونه اکزوترمیک دي او د تودوخې په ازادېدلو سره ترسره کېږي؛ د بیلګې په ډول:



انرژي + اوبه + ملاګه $\longrightarrow$ د ملاګې تیزاب + سوډیم هایدروکساید

فعال فلزونه د اوبو سره تعامل کوي، رڼا او تودوخه تولیدوي؛ د بیلګې په ډول: کله چې د سوډیم

د فلزیو وړه ټوټه د اوبو په ډک تشت کې واچول شي، ډیر چټک تعامل تر سره کېږي چې د رڼا او تودوخې د تولید سره یوځای دي:



(7-12) شکل سوډیم په اوبو کې د اکزوترمیک تعامل، د تودوخې او رڼا تولید




اکزوترمیک تعاملونه هم د تعامل کوونکو موادو د فعالولو لپاره انرژي ته ضرورت لري؛ خو هغه انرژي چې د تعامل په بهیر کې ازادېږي، د انرژي د هغه اندازه څخه زیاته ده چې د تعامل کوونکو موادو د فعالولو لپاره په مصرف رسېږي؛ د بیلګې په ډول: د مګنیزیم فلز لومړی باید د اور شعلي ته نژدې کړای شي، تر څو تعامل پیل شي، کله چې تعامل پیل شو، نو ډیره زیاته انرژي ازادېږي، همدارنګه که چیرې پر پوټاشیم پرمټنګنیت باندې ګلیسرین ورزیات کړو، د تعامل په پیل کې د لمر انرژي ته ضرورت دي چې دا انسرژي د فعالونکي انرژي یا د اکتیویشن (Activation) د انرژي په نوم یادېږي، هغه تعاملونه چې د انرژي له جذب سره تر سره کېږي اویا هغه تعاملونه چې تودوخې ته اړتیا لري، د انډوترمیک تعاملونو په نوم یادېږي. ډیر تعاملونه چې په نړۍ کې ترسره کېږي، داندوترمیک تعاملونو له ډلې څخه دي؛ د بیلګې په ډول: د چوڼي له تیر و څخه د چوڼي لاسته راوړنه د زیاتې انرژي پر مصرف باندې ترسره کېدای شي:



فعالیت :

د اکزوترمیک او اندوترمیک تعاملونه

د لاندې تعاملونو معادلې وگورئ، د اکزوترمیک تعامل د (EX) او د اندوترمیک تعامل د En په تورو نښانې کړئ:




۷-۲-۵: د اکزوترمیک او اندوترمیک تعاملونو لپاره د انرژي ډیاگرام

څرنگه چې وویل شو، کیمیاوي تعاملونه د انرژي له کبله په دوو برخو اکزوترمیک او اندوترمیک ویشل شويدي. د اکزوترمیک تعاملونه د تعامل په پیل کې یوه اندازه انرژي ته اړتیا لري چې دا اندازه انرژي د فعالونکي په نوم یادوي، خو هغه انرژي چې ازاډېري د فعالونکي (Activation) له انرژي څخه زیاته ده.

په اکزوترمیک تعاملونو کې تعامل کوونکي مواد د ډیر زیاتې ذخیروي انرژي لرونکي دي او دهغوی د تعامل د محصول د موادو په پرتله د لږې ذخیروي انرژي لرونکي دي، د اکزوترمیک تعاملونه با ثباته دي او د هغوی د تجزیې لپاره په هماغه مقدار انرژي ضروري ده کوم چې د هغوی د جوړېدو په وخت کې ازاډېري.

د اندوترمیک تعاملونو د محصولو موادو د جوړېدو په بهیر کې لومړنی مواد انرژي جذب وي، چې له دې کبله د تعامل د محصولو موادو انرژي د تعامل کوونکو موادو په پرتله زیاته ده. د اندوترمیکو تعاملونو محصولونه بې ثباته دي؛ ځکه هغه اندازه انرژي چې د خپل جوړېدو په بهیر کې اخیستی ده، بیرته یې ازاډوي.



(7-13) شکل د اکزوترمیک او انډوترمیک د تعاملونو دډاگرام

الف- د هوا په شتون کې د اسیټلین سوځیدل (اکزوترمیک)
ب- دمرکبوری (II) د اکساید (انډوترمیک)



(7-14) شکل د اکسپي اسیټلین څراغ د سوځیدلو په وخت کې زیاته تودوخه تولیدوي چې په ولیدنګ کولو او د فلزونو په پرې کولو کې په کارول کېږي.



د اووم څېړکي لنډيز

- کيمياوي معادله د کيمياوي تعاملونو ښودونکې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو فورمولونو په وسيله ښودل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کونکو موادو يا د لومړنيو موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړنيو موادو د تعامل په پايله کې حاصلېږي، د تعامل د محصول په نوم يادېږي.

• کيمياوي تعاملونه د کيمياوي معادلو په واسطه ښودل کېږي.

• کيمياوي تعاملونه هغه بهيرونه دي چې په هغوی کې لومړني مواد په نويو موادو يا د تعاملونو محصول چې د نويو خواصو لرونکي دي ، بدلېږي.

• ساده تعويضي تعامل له هغه تعامل څخه عبارت دي چې په هغه کې يو يا څو اتومه د يو يا څو

اتومو ځای د هغوی په تشکيل شوي مالیکولو کې نيسي.

• دوه گونې تعويضي تعامل د هغه تعامل څخه عبارت دي چې په هغه کې يو يا څو اتومه د يو مرکب د يو يا څو اتومو له بل مرکب سره تعويض کېږي.

• تجزيوي تعامل د هغه تعامل څخه عبارت دي چې له يوي مادې څخه څو نوي مادې په لاس راځي.

• ترکيبي تعامل د هغه تعامل څخه عبارت دي چې د دوو يا څو مادو د يوځای کېدو څخه يوه نوي ماده يا مرکب تشکيلېږي.

• د سون تعامل د هغه تعامل څخه عبارت دي چې په هغه کې يوه ماده د اکسيجن په شتون کې سوځي ، اکسايډونه، تودوخه او روښناليي توليد وي.

• په اکزوتروميک تعامل کې د تعامل په بهير کې يوه اندازه انرژي ازادېږي.

• د اکزوتروميکو د تعاملو محصولات د کمسو انمازو انرژي په لرلو سره د ثبات لرونکي او د انډوتروميکو د تعاملونو محصولات د زياتې انرژي د لرلو کبله بې ثباته دي.

• که چېرې القابو ، تيزابو اوماگرو حل کيدل په اوبو کې $0.1mol/L$ وي، دمنحل موادو په نامه ، که $0.001mol/L$ ترمنځ وي ،لر منحل او که چېرې $0.001mol/L$ څخه لږ وي ، دنه حل

کيدونکي موادو په نامه يادېږي .

• اکزوتروميک تعاملونه هم د تعامل کونکو موادو د فعالولو لپاره انرژي ته اړتيا لري؛ خو هغه انرژي چې د تعامل په بهير کې ازادېږي، د انرژي له هغه اندازه ي څخه زياته ده چې د تعامل

د موادو د فعالولو لپاره په مصرف رسېږي چې دا انرژي د فعالونکي انرژي يا د اکټېشن (Activation) د انرژي په نوم يادېږي،

د اووم څپرکي تمرين : څلور خوا به پوښتي^۱

- 1 - د موادو د اولن محلول د حالت لپاره لنډه علامه --- ده .
الف- L ب- l ج- aq د- sol
- 2 - د مېتان د گاز له سوځولو څخه د کاربن ډای اکسايډ گاز او اوبه توليدېږي دا جمله څه شي ده ؟
الف- سمبوليکه معادله ده ب- ليکلي معادله
ج- توصيفي معادله ده
د- $K(s) + H_2O(l) \longrightarrow K_2O + H_2O$
- 3 - د $KOH + H_2$ ب- $K + H_2 + O_2$ ج- هېڅ يو
د- د $KOH + H_2$ تعامل محصول عبارت دی له ----
الف- $K + H_2 + O_2$ ب- $K_2O + H_2O$ ج- $K + H_2 + O_2$ د- $KOH + H_2$
- 4 - د تيزاب تعامل له القلي سره د لاندي کوم ډول تعاملونو څخه دي .
الف- خستي کول ب- دوه گوني تعريضي
ج- رسوب ورکونکي د- الف او ب دواړه
- 5 - له لاندي سلفيټونو څخه کوم يو په اوبو کې غير منحل دي .
الف- Na_2SO_4 ب- K_2SO_4 ج- $FeSO_4$ د- $BaSO_4$
- 6 - دا تعامل $CaO + CO_2 \xrightarrow{\Delta} CaCO_{3(s)}$ کوم ډول تعامل دي :
الف- ترکيبي ب- تجزيوي ج- سوځول د- اکزوترميک

سمي او فاسمي پوښتي :

- سمه جمله د (س) په توري او ناسمه جمله د (ن) په توري ښانني کړي .
- 1 - ويلي شوي مالګه د برېښنا د جريان په واسطه په فلز او په تيزابي بقيه تجزيه کېږي .
()
 - 2 - د اسټيلين تبديلول په ايتيلين باندې ترکيبي تعامل دي . ()
 - 3 - د موادو تعامل له اکسيجن سره د سوځولو په نوم يادېږي ()

- 4 - د القلي فلزونو تعامل له اوبو او تيزابونو سره اکزوترميک دي) (
- 5 - د انډوترميک محصولات بڼاښه دي) (
- 6 - د S سمبول د ميعاتو لپاره په معادلو کې استعمالېږي. (
- 7 - $\longrightarrow$ (د ورکونکي) معنی لري. (
- 8 - $C + FeO \longrightarrow Fe + CO_2$ تعامل دوه ګونه تعويضي تعامل دي.

د تشو ځايونو پوښتنې

تش ځايونه په مناسبو کليمو سره بشپړ کړئ.

- 1 - مګنيزم له مس (II) سلفيټ سره تعامل او تشکيل وي.
- 2 - $PbCl_2$ په اوبو کې دي.
- 3 - $Pb(OH)_2$ د تجزيوي تعامل محصولات عبارت دي له او دي.
- 4 - د ترکيبي تعاملونو عمومي شکل دي.
- 5 - فلز + اکسيجن محصول عبارت له څخه دي.
- 6 - سوډيم هايډروکسايډ د مالګې له تيزابو سره تعامل کوي. او جوړوي.
- 7 - هغه تعاملونه چې له خپل چاپير يال محيط څخه انرژي جذبوي..... په نوم کيږي.
- 8 - هغه تعاملونه چې محيط ته انرژي ورکوي د په نوم کيږي.

تشرېحي پوښتنې

- 1 - کيمياوي تعامل په کومو مفهومونو ښودل کيږي؟
- 2 - د کيمياوي تعاملونو د عمده ډولونو نومونه واخلئ
- 3 - توصيفي معادله د يوې بيلګې په واسطه توضيح کړئ.
- 4 - سمبوليکه معادله ډېرې بيلګې په واسطه وښايي.
- 5 - د اکزو ترميک تعامل د يوې بيلګې په واسطه توضيح کړئ.
- 6 - ترکيبي تعامل تعريف او د هغه عمومي شکل وليکئ.
- 7 - ساده تعويضي تعامل ډيوي بيلګې په واسطه توضيح کړئ.
- 8 - ايا د القلي تعامل له تيزاب سره تعويضي تعامل دي؟ ولې؟
- 9 - د اکزوترميک او دانډوترميکو تعاملونو پاګرام رسم کړئ.
- 10 - د لاندي تعاملونو محصول وليکئ او هم هغه د کيمياوي تعاملونو له ډولونو څخه له يو سره

اړیکه ورکړئ:

- 1 - $Al(s) + HCl(l) \longrightarrow$
- 2 - $Fe(s) + H_2O(l) \longrightarrow$
- 3 - $C(s) + Fe_2O_3(s) \longrightarrow$
- 4 - $NaOH(aq) + H_3PO_4(aq) \longrightarrow$
- 5 - $C_2H_5OH(l) + O_2(g) \longrightarrow$



د اکسیدیشن- ریدکشن تعاملونه

د سون د موادو سوځول د سوځولو په ځای کې، د بخار د یو ګونه، د فلزونو الکترو لټیکي رسوب، هغه بهیرونه چې د ګلوانیکي عنصرونو او بهیرونو کې ترسره کېږي او داسې نورو ټول د اکسیدیشن- ریدکشن تعاملونو پر بنسټ ترسره کېږي. د لوهریو موادو لاسته راوړل (اوسپنه، کروم، منګیز، سره زره، سپین زره، کلورین، آیودین او نور) همدارنګه کیمیاوي ټاکلو محصولاتو (امونیا، د بنسټیز تیراب، د ګوګرو تیراب او نور) د اکسیدیشن ریدکشن تعاملونو پر بنسټ لاس ته راغلی دي. د ژوندیو موجوداتو په ارګانیزم کې (نباتاتو او حیواناتو کې) د اکسیدیشن ریدکشن چیر مهم تعاملونه ترسره کېږي، چې په هغه کې انرژي تولید او یا ازادېږي، دا تولید شوي انرژي د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پیاوړتیا لپاره حتمي او ضروري ده.


په دې څپر کې به د اکسیدیشن او ریدکشن په اړه معلومات حاصل کړئ، د اټومونو د اکسیدیشن نمبر د مرکب په مالیکولونو کې او د اکسیدیشن او ریدکشن د تعاملونه معادلې توازن به زده کړئ. د اکسیدیشن - ریدکشن تعاملونو د توازن بنسټیز میتود به هم زده کړي.

۸- ۱: د اکسیدیشن او ریدکشن تعریف:

په پخړانیو وختونو کې د اکسیدیشن او ریدکشن اصطلاح په بل مفهوم په کارول کېده؛ داسې چې د اکسیجن ور دننه کول د مرکب په مالیکول کې اکسیدیشن د عملیې په نوم یادشوي دي؛ د بیلګې په ډول:



د اکسیدیشن عملیه امکان، د ازاد اکسیجن په نه شتون کې د ترکیبي اکسیجن لرونکي مادي په واسطه هم ترسره شي، لاندې تعامل وګورئ:




په پورتنۍ تعامل کې $KClO_3$ د اکسیدي کونکي په توګه عمل او سلفري ارجاع کړي دي؛ همدارنګه د اکسیجن ایستل او د هایدروجن نېټول په کیمیاوي تعاملونو کې د ارجاع یا ریدکشن په نوم یاد شوي دي؛ د بیلګې په ډول:




اکسیدیشن له هغې عملیه څخه عبارت دي چې په هغې کې د ځینو عناصرو د اټومونو د اکسیدیشن نمبر (قسمي مثبت چارج) لوړ شي، په یو کیمیاوي تعامل کې د عناصرو د اټومونو د اکسیدیشن نمبر ښکته راتللو ته د ریدکشن عملیه وايي.

زیات کیمیاوي تعاملونه د اکسیدیشن او ریدکشن د تعاملونو ډولونو څخه دي؛ د بیلګې په ډول: د کاربن د سوځولو تعامل د اکسیدیشن - ریدکشن د تعاملونو د ډولونو څخه دي:



خو لاندې تعاملونه د اکسیدیشن او ریدکشن د تعاملونو ډولونو څخه نه دي؛ ځکه د تعامل کوونکو موادو د اټومونو اکسیدیشن نمبرونه د محصو لاندو له جوړیدو څخه وروسته هم په خپل لومړني حالت پاتې کېږي:



د اکسیدیشن او ریدکشن عملیه په کیمیاوي تعاملونو کې په یو وخت کې ترسره کېږي او د اخیستل



شوو الکترولونزو شمیر د بایلل شو الکترولونزو له شمیر سره مساوي دي، که چیري بایلل شوي الکترولونه منفی او اخیستل شوي الکترولونه مثبت قبول شي، د هغه الجبری مجموعه صفر ده . داچي د یوې کیمیاوي مادې ارجاع د بلی مادې د اکسیدیشن سره په یو وخت کې ترسره کیږي ، په هر اندازه چې د عنصرونو د انومونو د الکترولیزاتیویتی اندازه زیاته وي، په هماغه اندازه د هغه اکسیدي کوونکي (اکسیدانې) خاصیت قوي وي (دا خاصیت په غیر فلزي عنصرنو کې زیات دي) برعکس هر څومره چې عنصرنو الکترولیزاتیویتی ټیټه وي، په هماغه اندازه د هغه اکسیدانې خاصیت ضعیفه او د هغه ارجاعي ځانگړتیا غښتلي وی.

فعالیت :

په لاندې تعامل کې اکسیدي کوونکي او ارجاع کوونکي وټاکي:



فکر وکړئ

الف- د برېښنا بهیر د الکترولونو د بهیر پایله ده، یا د اکسیدیشن او ریدکشن له تعاملونو څخه کیدای شی چې د برېښنا بهیر په لاس راشي؟
ب- ولې اکسیدیشن او ریدکشن یو بل سره لازم او ملزوم دي ؟

۸- ۲: د عنصرونو د اکسیدیشن نمبر

د کیمیاوي عنصرونو د ولانسونو په واسطه کیدای شي چې عنصر د کیمیاوي اړیکو د جوړېدو په وړتیا باندې پوه شي (او یا دا چې د هغه د وړتیا ډیري لوړې کچې په هکله به په اړیکو جوړولو کې پوه شي) . ولانس د کیمیاوي اړیکو هغه شمیر ټاکي کوم چې د انومونو په واسطه جوړي شوي دي. ولانسونه د انومونو د الکترولیزاتیویتی کمیت په توگه چې له ټاکلي انوم سره اړیکه لري ،نه شمیرل کیږي او مثبت (+) او منفي (-) علامي نه لري ؛ ځکه چې ولانس د اړیکو شمیر په مالیکولونو کې ټاکي،خو په مرکبونو کې الکترولونه چې کیمیاوي اړیکې جوړوي ، د لوړو الکترولیزاتیو انومونو د پاسه ځای نیسي او په پایله کې انومونه ټاکلی چارج تر لاسه کوي. په مالیکولونو کې د اکسیدیشن د درجې په واسطه قسمي برېښنايي چارج د ټاکلوانومونو د ولانسي



۲۰۴

الکترونونو دځای پرځای کیدلو له کبله چې په الکترونینګاتیفو عنصرونو کې پیدا کېږي، د دې ډول مشروطونو په ذریعه وړاندوینه کېدای شي چې په مالیکول او یا ایرن کې له اړیکو څخه هرې یوې الکترونونه له فوق العاده الکترونینګاتیف اټوم سره تعلق لري، د اټومونو د اکسیدیشن درجه د (+) او (-) علامو په واسطه افاده کېږي. د عنصر د اکسیدیشن درجه د مثبتو علامو سره د اټوم د الکترونونو له هغو شمیر سره سمون لري کوم چې د هغې څخه جلا شوی دی او د منفي اکسیدیشن درجې کمیت د الکترونونو یو ځای کیدل رابښي چې د عنصر له اټوم سره یو ځای شویږي.

۸-۲-۱ د اکسیدیشن د نمبر د ټاکلو قوانین

د عنصرونو د اکسیدیشن نمبر ټاکل په ازاد (عنصري) حالت کې او د کیمیاوي مرکبونو په مالیکول کې د عنصرونو د اټومونو الکترونینګاتیویتی او ځانګړتیاوې باید له لاندې موادو سره سم عملي شي:

- ۱- په مرکبونو کې د اکسیجن اټومونه کولای شي ، د اکسیدیشن تام او یا کسري درجې له ځان څخه وېشي ؛ د بیلګې په ډول: په اوبو کې (H_2O) د اکسیجن د اکسیدیشن درجه 2- ، په H_2O_2 کې ($1-$) ، په KO_2 او KO_3 مرکبونو کې په ترتیب سره $\frac{-1}{2}$ او $\frac{-1}{3}$ ده، خو اکسي فلوراید OF_2 په مرکب کې د اکسیجن د اکسیدیشن درجه 2+ ده ، په ټاکلي ډول د هایدروجن د اکسیدیشن درجه په کیمیاوي مرکبونو 1+ ده ؛ خو د فعالو فلزونو په هایدرایدونو (Hydride Metals) کې د هایدروجن د اکسیدیشن نمبر 1- دی.

2- د اټومونو د اکسیدیشن درجه د ساده مرکبونو د مالیکولونو په ایزونونو کې د کمیت او د هغه د علامې پر بنسټ د هغو ایزونونو له برېښنايي چارج سره مساوي دي ؛ د بیلګې په ډول: د KCl په مرکب کې د K د اکسیدیشن درجه 1+ او د کلورین Cl 1- ده چې د هغه چارج په ترتیب سره 1+ او 1- دي.

3- که چېرې مالیکول د کوولانت اړیکې او یا آیوني - کووالانسي اړیکو پر بنسټ تشکیل شوي وي ؛ د بیلګې په ډول: NH_3 ، NH_4NO_2 ، NH_4NO_3 ، HNO_3 د قوي الکترونینګاتیف اټوم د اکسیدیشن درجې منفي علامې (-) اود ضعیف الکترونینګاتیف خاصیت لرونکي اټوم له مثبتې علامې (+) سره ښودل کېږي.

د عنصرونو د ټاکلي سلسلې د اکسیدیشن درجې د پوهیدلو لپاره له مرکبونو څخه په ښه توګه لازمه ده چې د غوښتلو مرکبو ګرافیکي فرمول ولیکل شي، په نایتروجن لرونکو مرکبونو کې (NH_3 ، NH_4OH ، NH_4NO_2 ، HNO_3 ، NH_4HNO_3) په ترتیب سره نایتروجن د اکسیدیشن درجې



$3- , 5+ , 2-$ دي چې د اکسیدیشن دا درجې په ښکاره ډول د هغه په ساختماني فورمول کې لیدل کېږي. د یو شان عنصرنو د اټومونو ترمنځ د کیمیاوي اړیکو په شتون کې؛ د بیلګې په ډول: په N_2H_4 کې دوو نایتروجن د اټومونو د جوړه الکترونونو ویش چې هغوی ته یې اړیکه ورکړې ده ترسره کېږي او له دې سره سم د هر اټوم الکترونونو محاسبه عملي کېږي. د ازاد اټوم د الکترونونو د شمیر ترمنځ توپیر په لوړه کچه د اټوم د اکسیدیشن درجه شمیر رانښيي.

4- هغه مالیکولونه چې د یو شان عنصر له اټومونو څخه تشکیل شوي وي (لکه: H_2, Cl_2, Br_2, N_2 او نورو) د دې عنصرونو د اټومونو د اکسیدیشن درجه د هغوی په مالیکولونو کې صفر ده؛ ځکه د دارنگه اټومونو ترمنځ د جذب الکتروني قوه د هغو په مالیکولونو کې شتون نه لري او مشترک الکترونونه د دواړو اټومونو د هستو ترمنځ ځای لري؛ د بیلګې په ډول: د هایدروجن (H) کلورین (Cl) د هر اټوم د اکسیدیشن درجه صفر ده، لیکن کوولانس (Covalence) یې د هغوي د ولانسي جوړه الکترونونو د کمیت په پام کې نیولو یو سره سمون لري.

5- په ډیرو عضوي مرکبونو کې کیمیاوي اړیکې ضعیف قطبي خاصیت لري، د کاربن د اټوم یو ځایي کیدل له نورو اټومونو سره؛ د بیلګې په ډول: (فلورین، اکسیجن، کلورین، نایتروجن) چې د عضوي مرکبونو په اسکلیټ کې شامل دي، د کاربن او د نوموړو عنصرونو د اټومونو ترمنځ د الکتروني پرتسیال د بدلون لامل شوي او د هغوي ترمنځ د تشکیل شوو اړیکو یو لاتی (قطبیت) زياتوي، په هغوي کې د اټومونو د اکسیدیشن درجه د قطبي کوولانسي مرکبونو په شان ده.

6- فلزونه په عصري حالت کې د هستې په شاوخوا د الکتروني کثافت د منظم ویش لرونکي دي؛ له دې کبله د هغوي د اکسیدیشن درجه صفر منل شوي ده.

7- په ایون کې د اکسیدیشن د درجې الجبري مجموعه د ټولو اټومونو د ایون له چارج سره مساوي ده او د اټومونو د اکسیدیشن د درجو الجبري مجموعه چې د برقي خنثی مرکبونو په ترکیب کې شامل دي، مساوي په صفر ده.

8- په کامپلکس مرکبونو کې معمولاً د هغوي د مرکزي اټوم د اکسیدیشن درجه ټاکل کېږي؛ د بیلګې په ډول: په $[Fe(SCN)_5]$ او $K_2[SO_4]$ مرکبونو کې د اوسپنې د اکسیدیشن درجه $3+$ او د نکل د اکسیدیشن درجه مساوي $2+$ ده، د یادولو وړ ده چې د اکسیدیشن درجو پوهیدل په ظاهري بڼه لیدل کېږي او د مطلوب اټوم واقعي حالت په مرکب کې نه شي ټاکلای،

په ډيرو حالاتو کې د اکسیديشن درجه د ټاکلي عنصر د ولاس سره مساوي نه ده؛ د بيلگې په ډول: په ميتان (CH_4)، فارميک اسيد ($HCOOH$)، ميتانول (CH_3-OH)، فارم الډيهايد (CH_2O) او کاربن ډای اکسايډ (CO_2) کې د کاربن د اکسیديشن درجه په ترتيب سره د -4 ، -2 ، $+4$ ، $+4$ ده، خو د کاربن د اټوم ولاس په ټولو پورېترو مرکبو کې 4 دي. د اکسیديشن د درجو په پوهيلو په ځانگړي ډول د اکسیديشن - ريډکشن تعاملونو د مطالعې په ټولو خواوي کې ترې گټه اخيستل کېږي.

خپل ځان ازمايښت کړئ

د عنصرونو يو د اټومونو د اکسیديشن نمبر په لاندې مرکبو کې چې مجهول (X) دي، پيدا کړئ.


الف- $[Ni(NH_3)_5]SO_4$ ب- $Al_2(SO_4)_3$ ج- $NaClO^x$ د- $H_3PO_3^x$

د سلفر د اکسیديشن نمبر $4+$ ، د هايډروجن $1+$ ، نايټروجن $3-$ ، د سوډيم $1+$ او اکسيجن $2-$ دي.

۸- ۳: د اکسیديشن - ريډکشن د تعاملونو ډولونه

ټول د اکسیديشن - ريډکشن تعاملونه کېدای شي چې په لاندې ډول ووېشل شي:

1- د اټومونو او ماليکولونو ترمنځ د اکسیديشن، ريډکشن تعاملونه: د بيلابيلو ماليکولونو او بيلابيل ايونونو د بيلابيلو اټومونو ترمنځ د الکترونونو ورکړه او راکړه د بيلابيلو اټومونو، ماليکولونو او ايونونو ترمنځ تعامل دی چې ترسره کېږي؛ د بيلگې په ډول: ترکيبي او تعويضي بسط تعاملونه:




۲ - په خپل سر اکسیدیشن - ریدکشن تعامل (Disproportionation): دا ډول

تعاملو نه د مرکبونو او یا ساده موادو ځانګړتیا ده چې په یو مرکب کې د عین عنصر ځینې اتومونه اکسیدي او په یو وخت کې د همدې عنصر یو شمیر نور اتومونه ارجاع کيږي؛ د بیلګې په ډول:

$$Cl_2 + 2NaOH \longrightarrow NaClO + NaCl + H_2O$$


۳ - د مالیکولونو په داخل کې اکسیدیشن - ریدکشن تعاملونه:

په دې ډول تعاملونو کې د مرکب د مالیکول یوه برخه اکسیدي کوونکې وظیفه او دهغه بله برخه ارجاع کوونکې وظیفه ترسره کوي، د دې ډولو تعاملو ساده بیلګه کېدای شي ترکیبي پروسس د پیچلي مادې پورته کېدل د مرکب په بیلابیلو برخو کې وړاندې شي؛ د بیلګې په ډول:



فعالیت:

لاندې د اکسیدیشن - ریدکشن تعاملونه د کوم ډول تعاملونو له ډلې څخه دي؟ د هغې ډول او اکسیدي کوونکي وټاکئ.




۸ - ۴: د Oxidation- Reduction تعاملونو د بیلانس د ترتیب میتود

د اکسیدیشن او ریدکشن د تعاملونو د بیلانس او ترتیب لپاره لازمه ده چې د اکسیدي کوونکو او ارجاع کوونکو خواص چې د مرکبونو په جوړېدو پیل کوي، معلومات تر لاسه شي؛ باید پوهه تر لاسه شي چې اکسیدي کوونکي او ارجاع کوونکي تل په مجموعي ډول د فعالو عنصرونو د

معلومو خواصو پرنسنت فعالیت کوي ، لازمه ده چې په پام کې ونیول شي چې د اکسیدیشن – ریداکشن په تعاملونو کې په ښکاره ډول یوازې د معادلو (متوازن) الکترونونو ورکړه راکړه د اکسیدي کونکو او ارجاع کونکو ترمنځ ترسره کېږي ؛ یعنې په مجموع کې هغه الکترونونه چې ارجاع کونکي په واسطه ورکړ شوي دي ، د هغو الکترونونو مجموعي سره مساوي دي کوم چې د اکسیدي کونکو په واسطه اخيستل شوي دي .

په ټولو کیمیاوي تعاملونو کې د یو عنصر د اټومونو مجموعي تعداد د معادلې کتنې ځوانه د همدې عنصر د اټومونو مجموعي کمیت د تعامل د معادلې ښي خوا سره مساوي دي .

که چېرې Redox تعامل په محلولونو کې سرتړه ورسېږي ، نو دلته لازمه ده چې د محیط اغیزه د O^{2-} او H^{+} آیونو تولیدنه په پام کې ونیول شي چې دا ازاد شوي آیونونه په تیزابي محیط کې د اوبو په لږو تفکیک شویو مالیکولونو کې دجوړېدو لامل او په القلي یا خنثی محلولونو کې له منفي آیونونو سره د اویو تعامل د هایدروکساید (OH^{-}) د تشکیل لامل ګرځي:



د دوو میتود پرنسنت کېدای شي د Rodox تعاملونه ترتیب او بیلا بیل شي:

۸-۴-۱: د الکتروني بیلا بیل میتود


ددی میتود پرنسنت کېدای شي مجموعي الکترونونه تعیین کړلي شي کوم چې د ارجاع کونکو څخه اکسیدي کونکو ته ورکړل شوي دي ، د ارجاع کونکو د الکترونونو مجموعي شمیر د هغو الکترونونو د مجموعي سره مساوي دي کوم چې د اکسیدي کونکي مادي سره یوځای شوي دي .

۸-۴-۲: د نیمګړو تعاملونو میتود (د آیون الکتروني میتود)

په دې میتود کې د معادلې جلا برخې (د آیوني تعامل نیمه معادله) د اکسیدیشن ریداکشن د پروسس لپاره د هغو وروستۍ جمع کول ، په مجموعی ډول په آیوني معادلې کې په پام کې نیول کېږي ، دا میتود د نیمه آیوني تعاملونو د میتود په نوم هم یادېږي ، په دې میتود کې رېنسټنټی آیونونه چې په اوبلن محلول کې شتون لري ، یادداشت کېږي چې د آیونونو شمیر د یادداشت څخه وروسته د Rodox تعامل د معادلې له دواړو خواو سره مساوي کېږي . په دې میتود کې لازم دي چې نه یوازې د اکسیدي کونکو او ارجاع کونکو ضریب پیدا بلکې د تعامل محیط د اوبو ، تیزابو ، القلیو د مالیکولونو ضریب هم پیدا کېږي ، د الکترونونو ارقام د محیطی ځانګړتیاوې اړه لري کوم چې د اکسیدي کونکو په واسطه اخيستل شوي دي او یا دا چې د ارجاع کونکو څخه جلا شوي دي ، ددې امکان



شته چې دا الکترونونه بدلون ومومي، په دې حالت کې محیط کېمیای پروتسو د بدلون لامل هم ګرځیدلی شي:



په تیزابي محیط کې $pH < 7$ وي، هایډروجن پر اکساید د آیوډین پر عنصر اغیزه اچوي، هغه اکسیدي او که چېرې $pH \leq 1$ وي، هایډروجن پر اکساید د آیوډین پر عنصر اغیزه اچوي، هغه اکسیدي او په ترکیبي آیوډین یې بدلوي او د اکسیدي کوونکي په توګه ځان ښکاره کوي:



ستاسي د زیاتو معلوماتو لپاره:



د تعامل محیط ممکن تعامل دې ته اړ کړي چې یو لوری ته میلان ولري او تعامل همدې لوري ته بهیر لري، دا بدلونونه هم د تعامل کوونکو موادو له غلظت سره تړلي دي.

د اکسیدیشن- ریدکشن د تعامل معادله په درې پرله پسې پړاوونو کې دوام کوي:


- 1 - هغه پړاوی چې ابتدایي محصولات په لاس راځي.
- 2 - د ابتدایي محصولاتو پړاو او د هغه تمرکز
- 3 - د نهایی محصولاتو پړاو

د تعامل د دویمې ظاهري مرحلې لپاره، لازمه ده چې د محصولاتو د تولیدو په قاعده وپوهیږو:

1 - موندل شوي اتومونه د مثبت 4, +5, +6, +7 اکسیدیشن درجې په لرلو چې د اکسیدیشن- ریدکشن په تعاملونو کې تشکیل شوي وي، د اکسیدجن له آیونونو سره



تعامل کوي او رسوونه د $[RO_4]^{n-}$ او $[RO_3]^{m-}$ په شکل جوړوي؛ دیلگي په دول:



څښې وختونه Mn, S, C په خنثی محیط او تیزابی محیط کې دای اکسایدونه جوړوي چې د دا

عنصرونو اکسیدیشن نمبر 4 + وي او هغه اکسایدونه عبارت دي له CO_2, MnO_2, SO_2

امفوتر عنصرونه (Amphotric Elements) چې د $2+, 3+, 4+$ د اکسیدیشن د درجو لرونکي


وي په القلي محیط کې د هایدروکسیدونو کامپلکس مرکبونه په لاندې شکل تشکیل وي:



عنصرونه د مثبت $(+1, +2, +3)$ اکسیدیشن نمبر په لرلو سره په تیزابي محیط کې مالګی جوړوي.

2 - د زیاتي اُیون شتون او د حد څخه زیات اکسیجن (O^{2-}) په تیزابي محیط کې د هایدروجن

(H^+) سره تعامل کوي، د لږو تفکیک شوو اوبو مالیکولونه جوړوي:




3 - له حد څخه زیات د اکسیجن د اُیون شتون په خنثی یا القلي محیط کې د اوبو له مالیکولونو

سره تعامل کوي، د OH^- اُیون تشکیلوي:



4 - د H^+ زیاتي اُیون په القلي محیط کې د OH^- له اُیون سره تعامل کوي او د اوبو مالیکول په


لاندې ډول جوړوي:



5 - د اکسیجن اُیون (O^{2-}) لږوالی په تیزابي یا خنثی محیط کې د اوبو H_2O له مالیکول څخه د اکسیجن اُیون جلا کيږي او په پایله کې د H^+ اُیون تشکیلوي.



6 - د اکسیجن د اُیون نشتوالي په القلي محیط کې د (OH^-) له ګروپونو څخه د اکسیجن اُیون ایستل کيږي چې په پایله کې د اوبو مالیکول تولیدوي:



7 - د H^+ د اُیون د لږوالي او کمښت په صورت کې په القلي محیط کې د Redox تعاملونه د اوبو له مالیکول څخه H^+ اُیون جلا کيږي او د OH^- اُیون تشکیلوي:



۸- ۵: د Redox تعاملونه په بیلابیلو محیطونو کې:

۸- ۵- ۱: په تیزابي محیط کې ریدوکس تعاملونه:

لومړی مثال: هایدروجن سلفایډ (H_2S) اکسیدیشن د $KMnO_4$ د اوبلن محلول سره په

تیزابي محیط کې له لاندې معادلې سره سم بهیر پیدا کوي:




د تعامل په پروسه کې د Mn د اکسیدیشن درجه چې په MnO_4^- کې شامل دي او د سلفر د اکسیدیشن درجه چې د H_2S په مرکب کې شامل دي، بدلون کوي.

ایون- الکتروني معادله یې لیکو چې MnO_4^- ارجاع او H_2S اکسیدیشن افاده کوي:




د هرې معادلې په بنسټ او کینه خوا کې باید د عنصرونو د اتومونو عین رقمونه اود ذرو مجموعه شتون ولري، پورتنۍ ریدوکس تعامل په تیزابي محیط کې بهیر لري له دې کبله درقمونو مساوي والي په غرض د اکسیجن اتومونه د (1) معادلې کین خواته د هایدروجن 8 ایونه ورزیاتوو او دمعادلې بنسټي خواته 4 مالیکوله اوبو لیکو. د هایدروجن او اکسیجن د اتومونو کمیت د (1) معادلې په دواړو خواو کې باید مساوي شي. همدا رنگه د اتومونو د کمیت مساوي کیدل او د معادلې د حاصل شوو اینون الکترونونو الجبری مجموعه د H_2S د پروسس د اکسیدیشن په واسطه د (II) معادلې په واسطه ټاکل کېږي. د معادلې د بایلل شوو او اخیستل شوو الکترونونو له کمیت د مساوي کیدلو څخه وروسته د ایونونو الکتروني مجموعي ولیکئ (III معادله) او ضربونه د تعامل په معادله چې په مالیکولي شکل ده، ځای پر ځای کېږي؛ یعنې:



خپل ځان ازمايښت کړئ:

دسرب سلفایډ (PbS) اکسیدیشن د ښوري تیزاب (HNO_3) په واسطه چې د هغې د تعامل دمعادلې شکل په لاندې ډول دي، روښانه کړئ:





دویم مثال: لاندی معادلہ پیلائیس کریں:




حل:



دویم مثال: لاندی معادلہ توازن کریں




حل:



خیل خان آزمائشیت کریں

د ایون - الکترون او ایون - مالیکیول Oxidation - Reduction د تعامل لاندی معادلہ
ترتیب او توازن کریں.



۸-۵-۲: پتہ القلی محیط کی دتعامل Oxidation-Reduction

نوچری مثال: پتہ دی اہرہ $NaCrO_2$ (Sodium Chromite) لہ برومین سرہ د خیرنی لاندی نیسوچی




د هغه د تعامل معادله په القلي محیط کې په لاندې ډول ده :



د تعامل په بهیر کې د کروم (Cr) د اکسیدیشن درجه چې د CrO_2^- په ترکیب کې برخه لري او د Br_2 د اکسیدیشن درجه بدلون کېدی، د ایون - الکتروني د تعامل نیمګړي معادلې لیکو چې د CrO_2^- اکسیدیشن (1 معادله) او د برومین (2 معادله) ارجاعي پروسس ټاکي.

په نظر کې نیسو چې د Redox دا تعامل په القلي محیط کې ترسره کېږي:



د اکسیجن د اټومونو د مساوي کولو لپاره د 1 معادلې کینڅو ته د OH^- څلور ایونونه لیکل شوي دي ، د معادلې ښې لور ته هم لازمه دي چې دوه مالیکوله اوبه ولیکل شي ، د لیکل شوو معادلو د جمعې حاصل په لاندې ډول دی :



که چېرې د تعامل کوونکو مالیکولونو او د تعامل د محصولونو د مالیکولونو لازم ضرېونه په پورتنۍ معادلې کې ځای پر ځای شي ، لاس ته راځي چې :



دویم مثال: د سوډیم سلفایټ (Na_2SO_3) د تعامل معادله د $KMnO_4$ سره په قوي القلي محیط کې د لږ مقدار ارجاع کوونکي په اغیزه د لاندې موادو په پام کې نیولو سره توضیح کېدای شي :


1 - د تعامل معادله لیکو، اکسیدي کوونکي او ارجاع کوونکي ټاکو.



د Na_2SO_3 په مالیکول کې د SO_3^{2-} ایون د ارجاع کوونکي په بڼه کې ځان ښودلې دی، دی ایون دوه الکترونه له لاسه ورکوي او په SO_4^{2-} ایون یې بدلون موندلی دی ، د $KMnO_4$ په مالیکول کې د MnO_4^- ایون د اکسیدي کوونکي په توګه عمل کوي دی . په غلیظ القلي محیط او د ارجاع کوونکي د کموالي په پېښه کې دې مالیکول یو الکترون اخیستلی او MnO_4^{2-} ایون ته ارجاع شوی دی.



2- د تعامل نیمه معادله چې د اکسیدیشن - ریدکشن پروسس پری ټاکل کېږی، لیکل کېږي، ددی تعامل بهیر په القلي محیط کې په پام کې نیسو، د ارجاع کوونکو ایونونو د اکسیجن لږوالي د OH^- له ایونونو څخه تکه‌بیلېږي چې پردې بنسټ د اوبو مالیکول تشکیلېږي، ضربونه په نیمگړي تعاملونو کې تر څیړنې لاندې نیسو او د نیمگړي تعامل د معادلو مجموعه په ایوني بڼه لیکو:




که چیرې پورتنۍ معادله په مالیکولي شکل ولیکل شي، و به لرو چې:



۸-۳: په خنثي محیط کې د Redox تعامل

لومړی مثال: د تعاملونه په خنثي محیط کې څیړو او لاندې معادله د څیړنې په غرض لیکو:




د H^+ او د OH^- ایونونو یو له بل سره تعامل کېږی، د اوبو مالیکولونه پکې جوړ کړي دي چې په ټیټه کچه توپه کېږي:




دویم مثال: د SO_3^{2-} د ایون او CO ترمنځ د اکسیدیشن د تعامل معادله په ایوني شکل په خنثي محیط کې ترتیب کوو، د هغه د تعامل نیمگړی معادله لیکو او اړونده ضربونه د هغه پر بنسټ لاس ته راوړو، د اکسیجن لږ ایونونه د اوبو د مالیکولونو څخه پوره کېږي چې د تعامل په پایله کې ټیټي

محيط منڃ ته راڃي ، لاس ته راڃي ضريرينه د معادلي په مجموعي ڪي ليکو:



خپل ځان ازماينښت کړئ

اوږنده ضريرينه د لاندې معادلو د توازن لپاره پيدا کړئ:



۸-۶ : د اکسيديشن - ريډکشن کيمياوي تعاملونو د بيلانس ترتيب د پر اکسايډونو



د پر اکسايډونو ټول مرکبه د ($S-S$) او ($O-O$) دوه ولاسه اړين لرونکي دي؛ له دې کبله د اکسيجن او سلفر د اتومونو د اکسيديشن نمبر چې ټاکلي زنجيرېپي شکل کړي دي ، پر 1 مساوي دي ، د H_2O_2 د ټوټه کيدلو له کبله د اوبو ماليکول او د اکسيجن باثباته ماليکول تشکيلوي چې د اکسيجن د اکسيديشن درجه په اوبو او اکسيجن په ماليکول کې په ترتيب سره 2 - او 1 - ده. د اکسيديشن - ريډکشن تعاملونو کې هايډروجن پر اکسايډ د تعامل گډون کونکي او له تعامل سره سم کيډاي شى چې د اکسيډى کونکي يا ارجاع کونکي رول ولوبوي ؛ د بيلگي په ډول: د هايډروجن پر اکسايډ تعامل د نورو پر اکسايډونو مرکبونو په نماينده گي گورو:


نورې مثال: هايډروجن پر اکسايډ د اکسيډى کونکي په توگه:

الف: په تيزابي محيط کې ، د هايډروجن پر اکسايډ ماليکول دو الکترونونه اخلي او د اوبو په دو ماليکولو بدلون مومي.




ب- په ختني محيط کې: $4H_2O_2 + 2e^- \longrightarrow 2OH^-$


دويم مثال:




په پورتنۍ معادله کې د H^+ او OH^- ايزونه يو له بل سره تعامل کوي، او په جوړوي:



ج- د Redox تعامل د H_2O_2 په گډون په القلي محيط کې:




دريم مثال



د- هايډروجن پراکسايډ د ارجاع کونکي په توگه

خلورم مثال:



فعالیت :



د لاندې $Redox$ تعاملونو له پاره د تعامل نیمګړی معادلې (ایون - الکتروني) ولیکئ او توازن یې کړئ :

- 1- $KMnO_4 + H_2O_2 + CaOCl_2 \longrightarrow CaCl_2 + O_2$
- 2- $H_2O_2 + AuCl_3 + NaOH \longrightarrow Au + O_2 +$
- 3- $CrBr_3 + H_2O_2 + NaOH \longrightarrow Na_2CrO_4 + NaBr +$
- 4- $H_2O, AuCl_3 \longrightarrow Au + O,$
- 5- $BaO_2 + AgNO_3 \longrightarrow Ag + O_2 +$
- 6- $KO_2 + MnO_2 + H_2SO_4 \longrightarrow O_2 + MnSO_4$
- 7- $FeS_2 + HCl \longrightarrow FeCl_2 + S + H_2S$
- 8- $FeS_2 + HNO_3 \longrightarrow Fe_2(SO_4)_3 + NO +$

۸- ۷: د ریډوکس تعاملونو د ترتیب او توازن ځانګړی حالتونه

که چېرې په کیمیاوي تعاملونو کې هغه مواد برخه ولري کوم چې د هغوي لپاره د اکسیدیشن د درجو ټاکل ګران وي (لکه: $FeAsS$, B_3H_{11} او عضوي مرکبه) کېدای شي ، سمبولیک میتود (شکلي میتود) الکتروني بیلانس په کار واچول شي ، چې د هغه ماهیت په لاندې ډول دي:

د $Redox$ تعامل د معادلو کینڅو ته د چارجونو الجبري مجموعه د همدې معادلې د ښې خوا د چارجونو له الجبري مجموعې سره باید مساوي شي؛ مثال په توګه:



په پورتنۍ معادلې کې اکسیدیشن کوونکي او ارجاع کوونکي ټاکو او ، هم معادله د اکسیدیشن او

ریډکشن د بهیر پر بنسټ تنظیموو:



په پورتنۍ تعامل کې B_2H_6 مرکب ارجاع کوونکي دي چې په H_3BO_3 مرکب اکسیدي کېږي:



د H_3BO_3 د تشکیل لپاره د اکسیجن د ایونونو کمېدو د اونیو له مالیکولونو څخه په لاس راوړو



چې دلته H^+ هم تشکيلېږي؛ څرنگه چې ليدل کېږي د پورتنۍ معادلې کينې خواته چار جونۀ صفر دي؛ خو د هغې نسبي خواته 12 مثبت چار جونۀ شتون لري؛ نو له دې کبله د چار جونو د مساوي والي په غرض د معادلې له کينې خواخه 12 الکترونونه کم شي.


ClO_3^- ايونونه د اکسيدي کونکي په شکل عمل کوي چې د Cl^- په ايونونو تبديلي او 6





په دې بنسټ د اکسيجن ازاد شوي ايونونه د اوبو له ماليکولونو سره ترکيب کېږي، نو تعامل په اولنې محيط کې ترسره کېږي او د OH^- ايونونه تشکيلېږي:



لومړۍ مثال: د هغو مرکبونو ريډوکس تعاملونه مطالعه کوو، کوم چې په هغې کې عضوي مرکبونه برخه اخلي.



د کلورين اوکاربن داکسليشن درجې هغه مرکبونو د تعامل په پايله کې بدلون مومي:



زیات زده کړئ



هغه تعاملونه چې د تودوخې په واسطه ترسره کېږي، د دې ډول تعاملونو د معادلو توازن او تعامل کېدای شي چې د الکترون – ایون میتود په واسطه عملي کړای شي .

فعالیت: د لاندې اکسیدیشن - ریدکشن معادلو الکترون - ایوني بیلانس یې ترسره کړئ.





د اتم څپرکي لنډيز

اکسیدیشن له هغې عملیه څخه عبارت دي چې په هغه کې د ځینو عنصرونو د اټومونو د اکسیدیشن نمبر لوړیږي.

* د عنصرونو د اټومونو د اکسیدیشن د نمبر د ښکته راتللو عملیه په یو کیمیاوي تعامل کې د ریداکشن په نامه یادېږي.

* د اټوم د اکسیدیشن درجه د مثبت (+) او منفي (-) علامو په واسطه ښودل کېږي، د عنصر د اکسیدیشن مثبتې درجې علامې د اټومونو د الکترونونو د هغه رقمونو سره سمون لري کوم چې له هغه څخه جلا شوي دي او دممنې اکسیدیشن د درجې کمیت د هغه الکترونونو سره سمون لري کوم چې د عنصر له اټوم سره یو ځای شوي دي.

* د اکسیدیشن - ریداکشن ټول تعاملونه کېدای شي په لاندې ډول وویشل شي:

1 - د اکسیدیشن ریداکشن د اټومونو او مالیکولونو ترمنځ تعاملونه: دیپایلو مالیکولونو، ایونونو او اټومونو ترمنځ د الکترونونو ورکول او اخیستل، چې دهغوي ترمنځ ترسره کېږي.

2 - په خپل سر اکسیدیشن او ریداکشن تعامل (*Disproportionation*): دا ډول تعاملونه د مرکبونو او یا ساده موادو ځانګړتیا ده چې په یو مرکب کې د عین عنصر ځینې اټومونه اکسیدي او په عین وخت کې د همدې عنصر یو شمیر نور اټومونه ارجاع کېږي.

3 - د مالیکولونو په دننه کې اکسیدیشن - ریداکشن تعاملونه:

په دې ډول تعاملونو کې د مرکب د مالیکول یوه برخه اکسیدي کوونکې دنډه او دهغه بله برخه دارجاع کوونکې دنډه ترسره کوي.

* د دوو میتودو پر بنسټ کېدای شي د Redox تعاملونه ترتیب او بیلاس کړو.

۱- د الکتروني بیلاس میتود

د دې میتود پر بنسټ کېدای شي مجموعي الکترونونه وټاکل شي کوم چې له ارجاع کوونکو څخه اکسیدي کوونکو ته ورکړل شوي دي. د ارجاع کوونکو د الکترونونو مجموعي شمیر د هغو الکترونونو د مجموعي سره مساوي دي کوم چې له یو اکسیدي کوونکي مادې سره یوځای شوي دي.

د نیمګړو تعاملونو میتود (د ایون الکتروني میتود)

په دې میتود کې د معادلې جلا برخې (د ایوني تعامل نیمه معادله) د اکسیدیشن ریدکشن بهیر لپاره د هغه وروستی جمع کول په مجموعي ډول په ایوني معادلې کې په پام کې نیول کېږي، دا میتود د نیمه ایوني تعاملونو میتود په نوم هم یادوي، په دې میتود کې رېښتیني ایونونه چې په اوبلن محلول کې شتون لري، یادداشت کېږي چې د ایونونو شمیر د یادداشت څخه وروسته د $Redox$ تعامل د معادلې دواړه خواوې سره مساوي شي. په دې میتود کې لازم دي چې نه یوازې د اکسیدي کورنکو اویا ارجاع کورنکو ضریب پیدا شي؛ بلکې د تعامل د محیط د اوبو، تیزابو، القلیو د مالیکولونو ضریب هم پیدا کېږي.

د اتم خپرې پوښتنې څلور خواږه پوښتنې

- 1- د اکسیدیشن ریدکشن تعاملونه له هغو تعاملونو څخه عبارت دي کوم چې د اټومونو، مالیکولونو او ایونونو ترمنځ د تبادلي ترسره کېږي
- الف - ایونونه ب - اټومونه ج - انرژي د - الکترون
- 2- هغه تعاملونه چې په هغه کې د عین عنصر ځینې اټومونه په یو مرکب کې اکسیدي او په عین وخت کې د همدې عنصر ځینې اټومونه ارجاع کېږي په نوم یادېږي.
- الف - په خپل سر اکسیدیشن ب - په خپل سر ریدکشن
- ج - په خپل سر اکسیدیشن ریدکشن د - تعویضي تعاملونه
- 3- هغه تعاملونه چې د مرکب د مالیکول یوه برخه د اکسیدي کورنکي وظیفه او بله برخه یې د ارجاع کورنکي وظیفه سرته رسوي په نوم یادېږي؟
- الف - د اکسیدیشن تعاملونه ب - د مالیکولونو په داخل کې اکسیدیشن او ریدکشن
- ج - ریدکشن د - هېڅ یو
- 4- په ریدوکس تعاملونو کې د ارجاع شویو الکترونونو شمیر حتماً د مجموعه سره مساوي دي کوم چې له اکسیدي کورنکي مادې سره یو ځای شویږي.
- الف - الکترون ب - اټومونه ج - مالیکولونه د - پروتونونه
- 5- د اکسیدیشن- ریدکشن د تعامل معادله په پړاونو کې امکان لرونکي ده.
- الف - څلور ب - دوه ج - پنځه د - درې
- 6- په $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ معادله کې اکسیدي کورنکي عبارت دي له:

الف- Cu ب- HNO_3 ج- H_2O د- NO
 7- $2O^{2-} + 2H^+ \longrightarrow H_2O + 2e^-$ تعامل په محیط کې امکان لرونکی دي.

الف- خټي ب- تیزايي ج- القلي د- اولن
 په لاندې تعامل کې کوم عنصر ارجاع شوی دي؟



الف- کلورین ب- اکسیجن ج- هایدروجن د- کلورین او هایدروجن
 8- په لاندې معادله کې د اوبو د مالیکول ضریب دي.



الف- 3 ب- 4 ج- 6 د- 7؟

9- اکسیدیشن - ریدکشن د تعامل په معادله کې د ایونونو شمیر په دواړو خوا سره


کېږي

الف - جمع ب - منفي ج - مساوي د - تغییر ورکول

تشریحي پوښتنې :

لاندې معادلې توازن کړئ:

- 1- $H_2O_2 + KI + H_2SO_4 \longrightarrow I_2 +$
- 2- $NaCrO_2 + H_2O_2 + NaOH \longrightarrow Na_2CrO_4 +$
- 3- $S + HNO_3 \longrightarrow H_2SO_4 + NO_2 +$
- 4- $Cu + H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$
- 5- $MnO_2 + HCOOH + H_2SO_4 \longrightarrow MnSO_4 + CO_2 + H_2O$
- 6- $P_2O_4 + H_2O \longrightarrow H_3PO_4 + H_3PO_3$
- 7- $Zn + HNO_3 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + \dots$
- 8- $P + HNO_3 \longrightarrow H_3PO_4 + NO + \dots$
- 9- $KO_2 + MnO_2 + H_2SO_4 \longrightarrow O_2 + MnSO_4$
- 10- $FeS_2 + HCl \longrightarrow FeCl_2 + S + H_2S$



په ڪيميا کي قوانين او محاسبه

ڪه ڇه هم د ڪيميا هر ڇانگه دخيل ځان پوري د اړوند قوانينو لرونکي ده؛ خو په ڪيميا کي ځينې قوانين شتون لري کوم چي د ڪيميا په ټولو ځانگو کي د هغوی ځخه کبله اخيستل کيږي؛ په دې څپرکي کې هغه قوانين او محاسبه څپرل کيږي چي د هغوي په واسطه کيداي شي لاندې علمي مطالبونه زده کړل شي:

د ڪيميا د عملي کشفياتو د تاريخي بهير په پام کې نيولو سره ، پراخه نوي نظر د ڪيميا په علم کې به پيدا کړئ ،د قوانينو د کارولو د څرنگوالي پر بنسټ د علمي مسايلو او کشفياتو په اړه معلومات حاصلوي ، په ڪيميا کې له محاسبو سره اشنا کيږي.



۹- ۱: د علمي مسایلو بنسټونه

په عمومي ډول یوه علمي مساله په څلورو لاندیو بنسټیزو ستونزو لاره ده:

- 1 - قوانین
- 2 - اصول
- 3 - نظریې او فرضيې
- 4 - تړونونه او قاعدې

د ارشمیدس په نوم یوه هلې ځلې د یوې اجتماعي مسالې د حل کولو لپاره د انسانانو غلبه په فني او تخنیکي نیمګړتیاوو باندې یوه بیلګه ده. یوې اجتماعي پېښې ته پام وکړئ:

پادشاه «هیرو» یو اندازه خالص سرو زرو ته ورکړل چې د هغې څخه ورته تاج جوړ کړي، زرګر تاج جوړ کړ او پادشاه ته یې ورکړ، پادشاه سرو پوښتنه پیدا شوه چې ایا دا تاج د خالصو سرو زرو دي او یا دا چې زرګر له سرو زرو سره مس ګډ او دهغوی څخه یې تاج جوړ کړي دي؟ څرنګه کولای شې چې په دې رښتینوالي پوه شې؟ پادشاه د خپل وخت ریاضي پوه او مشهور ستورن پېژندونکی ارشمیدس ته مخ واړوه.

ارشمیدس سره له دې چې په دې اړوند یې پوره معلومات نه درلودل، له خپل تفکر او ذهني قواوو په ټکيه د پادشاه د ستور ومانه، هغه ډیره موده په دې فکر کې وه ترڅو.....



فعالیت

له لاندې علمي کړنو څخه، د علمي اصل او قانون مفهوم پیدا کړئ.

- 1 - که چېرې یو جسم په اوبو کې لامبو وهي، دهغه جسم وزن کمېږي، د جسم وزن د کمیت اندازه له بې ځايه شولونو وزن سره مساوي ده، کوم چې د همدې جسم په واسطه یې ځايه شوي دي.
- 2 - د تیزابي بارانونو اوریدل د دنیا سورونو په نوم د حیواناتو نسل د ضرر لامل کېږي.
- 3 - ټول مواد د اتومونو په نوم له کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي، د موادو بیلابیل خواص د هغه د اتومونو د توپیر له کبله دي.

فرضیه او نظریه د انسانانو څیر نه ده. انسانان وروسته له هغې چې له یوې مسالې سره مخامخ شي، د هغې د حل لپاره کوښښ کوي د هغې دحل لپاره اطلاعات راټولوي او وروسته د هغوي ترمنځ اړیکو رامنځته کولو څخه پایلې اخلي، په دې پړاو کې فرضیه مینځته راځي. که چېرې د فرضيې سموالی څو وارې په بیلابیلو وختونو کې په ثبوت ورسېږي، هغه د علمي فرضيې په نوم یادوي.

د نظریو اصلاح او ښه کیدل د پوښتنو د حل لاره ده.



فکر و کړئ!



- 1- د یوې علمي نظریې د سربې ارزښت او اعتبار د کومو عواملو سره اړیکې لري؟
 - 2- تیوري یا علمي نظریې د علمي قانون سره څه توپیر لري؟
- په نظري کیمیا کې یو د ډیرو پرمختللو تیوريو څخه د دالتن اټومي تیوري ده. د دې کتاب لوستونکي به د دالتن د تیوري سره اشنا شي ولري (په لومړۍ څپرکي کې لیکل شوي ده) د تیوري کولای شي بیلابیلې پدېدي؛ لکه: د براس، د موادو حل کېدل یو په بل کې، په تعاملونو کې د گازونو حجمي نسبتونه، د موادو د حجمي او کتلوي نسبتونو ثابتوالی او نور په کیمیاوي تعاملونو کې توضیح کوي؛ خو د ځینو پدیدو؛ لکه: د سلاکتی برېښنا، د محلولونو الکترولیز، د رادیو اکتیف موادو رادیو اکتیویتی او روښنایي ورکول او داسې نورو په هکله اړونده توضیحات نه شپې ورکولی. داندازه کولوواحدونه، فورمولونه، سمبولونه، د نوم ایښودلو لارې او داسې نور د علمي تړونونو بیلگې دي.

علمي تړون

علمي تړون څه شی دي؟

هغه مجموعې پرې کړې چې دعلومو په هکله منځ ته راځي، ترڅود یوې ځانګړې دڅېړونکو اړیکې سره او حتي دبیلابیلو څانګود پوهانو اړیکو اُسانتیا رامنځ ته کړي، دعلمي تړون په نامه یادېږي.

زیاتي معلومات



ایوپاک (IUPAC) د تجربې او خالصۍ کیمیا نړیواله کمیټی د لنډه سمبول (Internationalunionof pur AppliedChemistry) څخه عبارت دي، نړۍ د هیوادونو د کیمیا ډیر مشهور پوهان په هغه کې غړیتوب لري او د کیمیا د مسایلو په اړه علمي تړونونه سره تړي.

۹- ۲: د مادي د بقا قانون او یا د کتلې پانښت

په ۱۸م پیړۍ کې فرانسوي عالم د لاوازه په نوم (AntoineLavoisier) (1794-1843) داسې نظر ورکړ: په یو کیمیاوي تعامل کې د تعامل د محصول مجموعي کتله د تعامل کوونکو موادو له مجموعي کتلې سره مساوي ده:



دافانون د دالتن داتومي ماليکولي تيوري له نظره هم سم وي، په هر کيمياوي تعامل کي د تعامل کوونکو موادو د تشکيل کوونکو عناصرونو د اتومونو د مجموعي شمير د تعامل د محصول د موادو د اتومونو له شمير سره مساوي دي؛ خوڅرنگه چې ليدل کيږي کيمياوي تعاملونه عملاً د انرژي د جذب او يا ازاييدلو سره يو ځاي دي، هغه تعاملونه چې د هغوي په سرته رسيدلو کي انرژي ازاديږي د *Exothermic* (د تودوخې توليدونکي) تعامل په نوم ياديږي او هغه تعاملونه چې د انرژي (تودوخې) د جذب په پايله کي ترسره کيږي د (*Endothermic*) تعاملونو په نوم ياديږي د پورتنيو تعاملونو په بهير کي چې د کاربن او اکسيجن ترمنځ ترسره شوی دی، انرژي ازاده شوي او د *Exothermic* تعامل د ډول څخه دي چې د ازادي شوي انرژي اندازه $4kJ/mol$ ده، د دي ازادي شوي تودوخې اندازه د کاربن او اکسيجن د کتلې تبديليدل په انرژي باندې منځ ته راځي ده؛ پردي بنسټ د تعامل د محصول دموادو مجموعي کتله د تعامل کوونکو موادو د مجموعي کتلې څخه لږه ده. د 20° پير په پيل کي انيشتاين (*Einstein*) وويل چې په تعاملونو کي لاس ته راځلي انرژي؛ لکه په پورتنني تعامل کي د تعامل د محصول د کتلې د کمښت پورې اړه لري چې کمه شوي کتله يې د $E = mc^2$ فورمول پر بنسټ محاسبه کړه او د کتلې د پايښت او انرژي قانون يې منځته راوړ. په رښتيا سره تبديله شوي کتله په انرژي په *Exothermic* تعاملونو کي دومره کوچنی ده چې په هيڅ وسيله نه شي اندازه کيدای، له دي کبله د لاوړه د پايښت قانون پر ځای دي؛ خو کله چې د يورانيم کتله په هستوي ريکتورکي توپه کيږي، د تعامل د محصول د کتلې توپير د يورانيم لومړنۍ کتلې سره ډير زيات دی چې پنځوس ميليونه ځلي د کاربن او اکسيجن له سوځولو څخه ډيره ده.

$$^{235}_{92}U + ^1_0n \longrightarrow ^{141}_{56}Ba + ^{91}_{36}Kr + 3^1_0n + 200mev$$

په پورتنني هستوي تعاملونو کي بايد د انيشتاين قانون يعنې د مادې او انرژي دپايښت قانون په پام کي ونیول شي؛ يو ميليون الکترون ولت (*mev*) د $3.810^{-14} Kcalory$ سره معادل دي، $E = mc^2$ د فورمول پر بنسټ لاس ته راوړو چې $94Kcalory/mol$ او $200mev$ انرژۍ له کومې کتلې سره معادلت لري کوم چې په دي اندازه انرژي تبديله شوي ده.



$$\Delta m_1 = \frac{E_1}{C^2}$$

$$\Delta m_1 = \frac{94 \cdot 10^3 \text{ calory} / \text{mol}}{(3 \cdot 10^8 \text{ m/sec})^2} = \frac{94 \cdot 10^3 \text{ joule} / \text{mol}}{9 \cdot 10^{16} \text{ m}^2 / \text{sec}^2}$$

$$\Delta m_1 = 10.44 \cdot 10^{-10} \text{ g/mol}$$

په پورتنیو هستوی تعاملونو کې لږه شوي کتله په لاندې ډول لاس ته راځي:

د 235g یورانیم (یو مول) $6.02 \cdot 10^{23}$ (د وگدرو د عدد په اندازه) د یورانیم اتومونه لري؛
 څرنگه چې د هستی په هر ویشلو کې 200mev انرژي ازادېږي؛ پر دې بنسټ عمومي ازاده شوي انرژي په ارگ (erg) په لاندې ډول محاسبه کېږي:

$$E_2 = 200 \cdot 3.8 \cdot 10^{-14} \text{ calory} = 200 \cdot 3.8 \cdot 10^{-14} \cdot 4.18 \cdot 10^7 \text{ erg} = 6.02 \cdot 10^{23}$$

$$\Delta m_2 = \frac{E_2}{C^2} = \frac{1,19 \cdot 10^{20} \text{ erg} / \text{mol}}{(3 \cdot 10^{10} \text{ cm/sec})^2} = 0.21 \text{ g}$$

$$\frac{\Delta m_1 / 235}{\Delta m_2 / 12} = \frac{\text{molU}}{\text{molC}} = \frac{0.21 \text{ g} / 235 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{4,36 \cdot 10^{-9} \text{ g} / 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2.5 \cdot 10^6$$

له پورتنیو نسبت څخه حاصلېږي چې د یو مول یورانیم څخه ازاده شوي انرژي 2.5 میلیونه ځلې د کاربن د یوه مول ازاده شوي انرژۍ په پرتله زیاته ده.



ب- برېښنايي عکاسي خراغونو

کتله وروسته له سوځېدلو څخه


(9-1) شکل الف- د برېښنايي عکاسی

خراغونو کتله له سوځېد څخه د مخه

۹- ۳): ثابتو نسبتونو قانون (Proust 1807)

د قانون لومړی ځل په (1807) کال کې د Proust په نوم عالم منځ ته راوړ؛ نو له دې کبله د نوموړي په نوم هم یاد شوي دي چې په لاندې ډول دي:

د مرکب د مالیکول تشکیلونکی عنصرونه د مرکب په جوړېدو کې په ټاکلي او ثابت وزني یا کتلوي نسبت یو له بل سره تعامل کوي، د دې ترکیبي جسمونو لاسته راوړنه کېدای شي، په هره لاره وي، مهمه داده چې دوه ساده جسمونه تل په یو ټاکلي او ثابت کتلوي نسبت یو له بل سره یو ځای کېږي او مرکب جوړوي؛ د بیلګې په ډول: هایدروجن له اکسیجن سره تعامل کوي، اوبه جوړوي، د هایدروجن او اکسیجن کتلوي نسبت د اوبو په تشکیل کې 1:8 دی:



څه فکر کوي؟



د اکسیجن او نایټروجن له مرکبونو څخه یو هم N_2O_4 دی چې بې رنگه گاز دی، یا دا کتلوي نسبتونو د قانون په کومک کېدای شي چې دې کیمیاوي فورمول ته ورسېږي؟


۹- ۴: د متعددو نسبتونو قانون یا د دالتن قانون

دوه عنصرونه یو له بل سره تعامل کوي، یوازې یو ډول مرکب نه جوړوي؛ که چېرې د هغوی کتلوي نسبت ته بدلون ورکړل شي، بیلایل مرکبه تشکیلوي، د دې عنصرونو د یو کتلوي نسبت د هغه په بیلایلو مرکبونو کې یې چې ډېل عنصر ټاکلي کتلې سره جوړېږي دي، نام ثابت او کوچنی عددونه دي؛ د بیلګې په ډول: نایټروجن له اکسیجن سره تعامل کوي، پنځه ډوله اکسایدونه تشکیل کړي دي، چې د اکسیجن کتلوي نسبت په دې (پنځه) ډوله اکسایدونو کې 5:4:3:2:1 دی؛ خو د نایټروجن

N_2 :	O_2	N_2 :	O_2	كتله ثابتہ ده ؛ يعنہي :
N_2O 14.2 :	16	1 7 :	4	1
NO 14 :	16	1 7 :	8	2
N_2O_3 14.2 :	16.3	1 7 :	12	3
NO_2 14 :	16.2	1 7 :	16	4
N_2O_5 14.2 :	16.5	1 7 :	20	5

کنده ثابت ده؛ یعنې:





(9 - 2) شکل: د نایټروجن د اکسایډونو د مالیکولونو مودل

خړنگه چې لیدل کیږي، د اکسیجن نسبت د هغه په پنځه ډوله اکسایډونو له نایټروجن سره


۵: ۱: ۲: ۳: ۴: ۵ دي.

فعالیت

دمتمدوننسبتو قانون دکلوړین په څلور ډولو اکسایډونو (Cl_2O , Cl_2O_3 , Cl_2O_5 , Cl_2O_7) کې تطبیق کړئ.

۹ - ۵: د معادلتونو قانون:

دوې مادې یا عنصرونه هر یو په جلا توګه له دریم عنصر سره په یو ټاکلي کتلوي نسبت تعامل کوي، پرتله د بقیې مرکبونه تشکیلوي، دا دوه عنصرونه په خپل منځ کې هم په هماغه کتلوي نسبت چې له دریمې عنصر سره یې تعامل کړي دي تعامل، او مرکب تشکیل وي:



له پورتنیو توضیحاتو څخه پایله اخیستل کیږي چې عنصرونه په ټاکلو مقدارونو یو د بل سره تعامل کوي.


د یو عنصر معادله کتله د هماغه عنصر د کتلې هغه مقداری کوم چې د اټمه گرامه اکسیجن سره یې تعامل کړي او د پلټنیزني څخه پرته د خپل اړوند اکساید یې تشکیل کړي دي.

مثال: $1.5g$ د اوسپنې اکساید شسته دي چې په هغه کې $1.17g$ اوسپنه شامل ده، د اوسپنې معادله کتله پيدا کړئ:

$$\left. \begin{array}{l} mFe = 1.17g \\ m\text{Oxide} = 1.5g \\ mO_2 = 0.33g \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1.17gFe - 0.33gO_2 \\ X - 8gO_2 \\ X = \frac{1.17gFe \cdot 8gO_2}{0.33gO_2} = 28gFe \end{array}$$

د اوسپنې معادله کتله يا معادل گرام د $28g$ سره مساوي دي.

د يو عنصر معادله کتله د هغې عنصر د کتلې هماغه اندازه ده ،کوم چې په يو کيمياوي تعامل کې يو گرام اوا يو اټوم - گرام هايډروجن بې ځايه او يا ازاد کړي وي؛ د بيلگې په ډول: په لاندې تعامل کې د کلسيم معادله کتله 20 ده چې په لاندې ډول محاسبه کېږي:



په عمومي ډول د يو عنصر معادله کتله عبارت له همدې عنصر اټومي کتله تقسيم پر ولانس د عنصر په تشکيل شوي مرکب کې ده:

اټومي نسبتی کتله

$$\text{اټومي نسبتی کتله} = \frac{\text{مادله کتله}}{\text{ولانس}}$$

ولانس

مثال: د المونيم اټومي نسبې کتله $27amu$ ده او دهغه ولانس 3 دي ،نود المونيم معادله کتله پيدا کړئ.

حل :

$$\left. \begin{array}{l} M_{\text{Al}} = 27amu \\ \text{ValanceAl} = 3 \\ \text{EqAl} = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{EqAl} = \frac{M_{\text{Al}}}{\text{Valance}} \\ \text{EqAl} = \frac{27amu}{3} = 9amu \end{array}$$



۹-۵-۱ : د کیمیاوي مرکبونو د معادلې کتلې لاس ته راوړل

د کیمیاوي مرکبونو معادله کتله عبارت له: د مرکبونو نسبتي مالیکولي کتله تقسیم پر اغیزمن ولانس د همدې مرکب په مالیکول کې دي:

$$Eq_{Compounds} = \frac{M_{Compounds}}{Effective\ Volance}$$

پام وگرځئ

اغیز من ولانس په تیزابونو کې د هایدروجن د اتومونو د شمیر، په القلیو کې د هایدروکسیدل ګروپ له شمیر سره مساوي دي، همدارنګه په مالګو کې موثر ولانس د مالګو دفلزی کټیونونو له ولانس څخه عبارت دی؛ نو د لاندې فورمولونو پر بنسټ کېدای شي د نوموړو مرکبونو معادلې کتلې لاس ته راشي:

$$Eq_{Acide} = \frac{M_{Acides}}{\sum H^+}$$

$$Eq_{Bases} = \frac{M_{Bases}}{\sum OH^-}$$

$$Eq_{Salts} = \frac{M_{Salts}}{Cathions\ volance}$$

که د اتومونو او یا مالیکولونو معادله کتله په ګرامو وښودل شي، د اکمیت د اتوم یا مالیکول د معادل - ګرام (Equivalent – gram) په نوم یادېږي چې تل په $Eq - g$ ښودل کېږي، باید یادونه وکړو چې د متحوله ولانسونو لرونکي عنصرونه د بیلابیلو معادلو کتلو لرونکي دي؛ دیلګې په ټول په Cu_2O کې د مرکب کې د مس معادله کتله $63.4amu$ ده، خو په CuO کې د مس معادله کتله $31.7amu$ ده.

لومړی مثال: د H_3PO_4 معادله کتله پیداکړئ. د H_3PO_4 مالیکولي کتله پر $98amu$ ده.

$$M_{H_3PO_4} = 98amu$$

حل

$$Eq_{H_3PO_4} = ? \quad q_{H_3PO_4} = \frac{M_{H_3PO_4}}{\sum H^+} = \frac{98amu}{3} = 32,6amu$$

$$\sum H^+ = 3$$

دوهم مثال: د $Ca(OH)_2$ معادله کتله پيدا کړئ د $Ca(OH)_2$ نسبي ماليکولي کتله له

(74) سره مساوي ده.

$$M_{Ca(OH)_2} = 74amu$$

$$Eq_{Ca(OH)_2} = ?$$

$$\sum OH^- = 2$$

$$Eq_{Ca(OH)_2} = \frac{M_{Ca(OH)_2}}{\sum OH^-} = \frac{74amu}{2} = 37amu$$

دريم مثال: د $MgSO_4$ معادله کتله محاسبه کړئ . د $MgSO_4$ نسبي ماليکولي کتله مساوي

پر 120amu ده.

حل:

$$M_{MgSO_4} = 120amu$$

$$Effective\ Volance = 2$$

$$Eq_{MgSO_4} = \frac{M_{MgSO_4}}{Cation\ Volance}$$

$$Eq_{MgSO_4} = ? \quad Eq_{MgSO_4} = \frac{120amu}{2} = 60amu$$

هغه مرکبونه چې په Redox تعاملونو کې برخه اخلي، نو د هغوي د ماليکول د تشکیل

کوونکو عنصرونو اتومونه ارجاع او يا (Oxidation) کيږي، د هغه معادله کتله داسي لاس

ته راوړل کيږي چې ماليکولي کتله يې د هغه پريایل شورو (Lose) او يا اخيستل شورو

(gain electrons) الکترونونو تقسيم کيږي؛ داسي چې:

$$Eq_{Compound} = \frac{M_{Compound}}{Lose\ or\ gain\ e^-}$$

مثال دوهم: H_2SO_4 معادله کتله په لاندې Redox تعامل کې محاسبه کړئ.






حل



Reduction



$$Eq_{H_2SO_4} = \frac{M_{H_2SO_4}}{\text{gain}^-} = \frac{98amu}{6} = 16,33amu$$

فعاليت



1 - خرنگه کولاي شي د لاندې مرکبونو معادله کتله پيدا کړي؟
 $H_3PO_4, KOH, NaNO_3$


2 - د H_2SO_4 معادله کتله په لاندې ريډوکس تعامل کې پيدا کړئ:



۹- ۶ : د حجمي نسبتونو قانون

د حجمي نسبتونو قانون يوه عالم Gay Lussac په نامه منځ ته راغلی دی او په لاندې ډول دي:
 په ثابت توډوخه او فشار کې د تعامل کوونکو گازي موادو حجمي نسبت او د گازي محصولو يا براسو نسبت تام، کوچنی او ټاکلی عددونه دي او هم د گازي تعامل کوونکو موادو حجمي نسبت د گازي محصول په تشکيل کې هم کوچنی او ټاکلی عددونه دي؛ د بيلگې په ډول: د هایدروجن گاز او د کلورين گاز د تعامل په پايله کې، د هایدروجن کلورايډ گاز تشکيل کېږي، د هایدروجن کلورايډ په تشکيل کې د هایدروجن او کلورين د گازونو حجمي نسبت 1:1 د هایدروجن او هایدروجن کلورايډ حجمي نسبت 1:2 او د کلورين او هایدروجن کلورايډ 1:2 دی؛ يعنې:





۹-۳) شکل ځینې گازي حجمونه

۹-۷: د اوگدرو قانون

د برزیلیوس (Berzelius) په نوم عالم پر حجمي نسبتونو باندې اتمي تیوري تطبیق او پیدا کړه چې د گازونو مساوي حجمونه د فشار او تودوخې په یو شان شرایطو کې د لاندې انومونو د مساوي شمیر لرونکي دي، د برزیلیوس دا قضیه په هغو گازونو باندې تطبیق کېږي، کوم چې په نرۍ کې په اتمي شکل پیدا کېږي؛ خو په هغو گازونو چې مالیکولي بڼه لري، نه تطبیق کېږي، د دې کبله بله تیوري د اوگدرو په واسطه وړاندې شوه، چې د اوگدرو Avogadro د قضیه په (1811) کال کې وړاندې شوې ده او دا قضیه اوس د قانون بڼه لري چې په لاندې ډول ده:


د گازونو مساوي حجمونه د فشار او تودوخې په یو شان شرایطو کې د مساوي شمیر ذرو (مالیکولونو، انومونو، ایونونو او نورو) لرونکي دي، د اوگدرو فرضیې اوس د قانون بڼه غوره کړې ده او یو شمیر زیات تجربې حقیقته یې روښانه کړې دي. (د اوگدرو لومړی قانون).

څرنگه چې دوه حجمه هایدروجن کلوراید هغه وخت تشکیل کېدای شي کوم چې یو حجم کلورین او یو حجم هایدروجن سره تعامل وکړي؛ نو د کلورین او هایدروجن مالیکولونه دوه برخې کېږي او د هغوی هر برخه د سره تعامل کوي چې نوي مالیکولونه (دوه نوي مالیکولونه) د هایدروجن کلوراید تشکیلوي:



مثال: په لاندې تعامل کې د حجمي نسبتونو قانون تطبیق کوئ:





د اوگدرو قانون کېدای شي چې په معکوس ډول هم بیان شي:

د گازونو مساوي شمیر ذري (مالیکولونه او اټومونه) د فشار او تودوخې په یو شان شرایطو کې مساوي حجمونه نیسي. (د اوگدرو دویم قانون)

زیات پوه شي!



د هرې مساوي یو مول د اوگدرو د عدد ($6.02 \cdot 10^{23}$) په اندازه ذري لــــري؛ که چېرې ماده د گاز حالت ولري، د هر گاز یو مول یې په STP شرایطو کې $22.4L$ حجم اشغالوي چې د گازونو د عمومي معادلې پرنسب (یعنې: $PV = nRT$) محاسبه کېدای شي.

د اوگدرو عدد په بیلابیلو لارو پیدا شویږي چې په دې ځای کې له هغې د دوو لارو یادونه کېږي:

1 - که چېرې نسبتي اټومي او یا نسبي مالیکولي کتله په ګرام افاده شي (اټوم مول یا مالیکول مول) او دا مولی کمیتونه د عنصر د یو اټوم پر رېښتي کتلې او یا د مرکب د یو مالیکول په کتله باندې وویشل شي، په پایله کې د اوگدرو عدد حاصلېږي:

$$\begin{aligned} \text{د عنصر نسبتي کتله په ګرام} \\ \text{د عنصر د یو اټوم کتله} &= \text{د اوگدرو عدد} \\ \text{د مرکب یو مول} \\ \text{د مرکب د یو مالیکول کتله} &= \text{د اوگدرو عدد} \end{aligned}$$

مثال: د کاربن نسبتي اټومي کتله 12 او د هغه د یو اټوم کتله $1.993 \cdot 10^{23}$ ده، د اوگدرو عدد پیدا کړئ.

$$\text{د کاربن د یو اټوم کتله په ګرام} \\ \text{د کاربن د یو اټوم کتله} = \text{د اوگدرو عدد}$$



۲۳۲۶

$$\text{د اوگدرو عدد} = \frac{12g}{1.99 \cdot 10^{-26} kg} = 6.02 \cdot 10^{23}$$

ځان و ازموي

د اوبو د ماليکول کتله $2.9898 \cdot 10^{-26} kg$ او دهغه ماليکولي کتله $18amu$ ده، د اوگدرو عدد په لاس راوړي.

2- د الکترونيز په طريقه کيدای شي چې د اوگدرو عدد په لاس راوړل شي، د بيلگې په ډول:

که چيري فارادي عدد $(F = 96491Cb)$ د چارج په قيمت $(e = 1.602 \cdot 10^{-19} Cb)$

تقسيم شي ، د اوگدرو عدد حاصلېږي:

$$NA = \frac{F}{e} = \frac{96491Cb}{1.602 \cdot 10^{-19} Cb} = 6.02 \cdot 10^{23}$$

د چارج قيمت امريکايي عالم دميکان په نامه دتيلو له څاڅکوڅخه پر لاس راوړ.

۸- ۹ : نسبتې اتمي کتله :

د کيمياوي عنصرونو د اټومونو حقيقي کتلې کميتر نه کوچنی دي چې د $10^{-24} g - 10^{-22} g$ ترمنځ ځای لري، دا کوچنی کيتر نه له منفي توانونو سره په کيمياوي محاسبو کې ستونزې منځته راوړي؛ ددې کبله د ساينس پوهانو د کيمياوي عنصرونو د اټومونو لپاره اتمي نسبتي کتله ټاکلې ده. هغوی ديو عنصر د اټوم کتله پر $\frac{1}{12}$ برخي دکاربن - 12 د اټوم د ايزوټوپ $(^{12}_6C)$ پر کتلې وويشله او دويشلو حاصل يې دپام عنصر د اتمي نسبتي کتلې په توگه ومنله:

$$M_{atomic} = \frac{\text{mass} - \text{per atomic Element}}{\frac{1}{12} \text{ per - atomic of Carbon}}$$

پاڼه وکړئ :

د کاربن - 12 واحدو څخه دگټې اخېستې لامل څه دي.
که چيري د $^{12}_6C$ په عوض $^{13}_6C$ او $^{14}_6C$ ايزوټوپونه په کار وړل شي ، په محاسبو کې به کوم بدلونونه منځته راشي ؟



د کاربن-12 د اټوم د ایزوټوپ د کتلې $\frac{1}{12}$ برخه د اټومي کتلې د واحد (Atomic Mass - Unit) په توګه منل شوي دی او په (amu) ښودل شوی ؛ یعنې:

د اټومي کتلې نړیوال واحد $= \frac{1}{12}$ د کاربن - 12 د یو اټوم د کتلې برخه = amu

څرنگه چې د کاربن 12 - د یو اټوم کتله $(^{12}_6C)$ د $1.993 \cdot 10^{-26} \text{ Kg}$ ده، نو د amu قیمت عبارت دی له:

$$amu = \frac{1}{12} \cdot 1.993 \cdot 10^{-26} \text{ Kg} = 1.661 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$$

نولیکلی شو چې:

$$\text{د عنصر د یو اټوم کتله} = \frac{\text{نسبتي اټومي کتله}}{\text{amu}}$$

$$\text{د عنصر د یو اټوم کتله} = \frac{\text{نسبتي اټومي کتله}}{1.661 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}}$$

مثال: د سوډیم د یو اټوم کتله $3.8203 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$ ده، سوډیم اټومي نسبتي کتله پیدا کړئ.

حل:

$$M_{\text{atom}} Na = \frac{m_{\text{per atom}} - Na}{\text{amu}} = \frac{3.8203 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}{1.661 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} = 23 \text{ amu}$$

مثال: د هایدروجن د یو اټوم کتله $1.674 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$ ده، د هغه اټومي نسبتي کتله پیدا کړئ.

حل:

$$M_{\text{atomic}} H = \frac{\text{mass Per atom } H}{\text{amu}} = \frac{1.674 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}}{1.661 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}} = 1.008 \text{ amu}$$

زیاتي معلومات:

د عنصر وزنو په څېړنو دوره یي جدولونو کې د عنصرونو اټومي کتله لیکل شوي ده چې ښایې یو د عنصرونو د ایزوټوپونو د اټومي کتلې د مجموعې له اوسط سره برابر ده.



فعالیت:

د لاندیني جدول د عنصرونو د بیلابیلو ایزوتوپونو د اټومونو د مجموعي کتلې اوسط محاسبه کړئ.

ایزوتوپ	$^{16}_8\text{O}$	$^{17}_8\text{O}$	$^{18}_8\text{O}$
فیصلي په طبیعت کې	99.76%	0.04%	0.2%
اتومي کتله	15.99	17.00	18.00

۹- ۹ : مالیکولي کتله

د کیمیاوي مرکبونو نسبتي مالیکولي کتله د مالیکول د تشکیل کوونکو عنصرونو اټومونو د کتلو له مجموعي څخه عبارت ده؛ دیلگي په ډول :


د اکسیجن اټومي کتله + د هایدوجن د دوو اټومونو نسبتي کتله = د اوبو مالیکولي کتلې
 $2 \times 1\text{amu} + 16\text{amu} = 18\text{amu}$

مشق او تمرین :

د لاندې مرکبونو مالیکولي کتله محاسبه کړئ.

الف: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

ب: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$



(9 - 4) شکل د ایتانول مودل

د اړتیا وړ معلومات :

څرنگه چې د عنصرونو د اټومي نسبتي کتله د amu د قیمت پربنسټه موندل شوي ده نو که چیرې د مرکب د یو مالیکول کتله ولرو او هغه د amu په قیمت باندې وریشو، د غوښتل شو مرکب نسبتي مالیکولي کتله حاصلېږي؛ یعنې:

$$\text{د مرکب د یو مالیکول کتله} = \frac{\text{نسبتي مالیکولي کتله}}{\text{amu}}$$



مثال: د اوسو د یو مالیکول کتله $2.9898 \cdot 10^{-26} \text{ Kg}$ ده، د اوبو مالیکولي نسبتي کتله لاس ته راوړئ .

حل: د اوبو مالیکولي کتله

$$M_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{\text{amu}} = \frac{2.989810^{-26}}{1.661 \cdot 10^{-27}} = 18 \text{amu}$$

نوټ: که چیرې د هرې ذرې رېښتيني کتله د amu پر قیمت ووشل شي، د هغې نسبتي کتلې لاس ته راځي .

۹- ۱۰: مول (اتوم - گرام او مالیکول - گرام)

که د کیمیاوي عنصرونو اتومي نسبتي کتله په گرام وښودل شي، د اکمیت د اتوم-گرام یا مول اتوم په نوم یادوي؛ د بېلگې په توگه: د Na اتومي نسبتي کتله د 23amu ده، نو د سودیوم یو مول مساوي پر 23g دی.

همدارنگه که د کیمیاوي مرکبونو مالیکولي نسبتي کتله په گرام وښودل شي، د اکتلوي کمیت د مالیکول-گرام یا مالیکولي مول په نوم یادېږي؛ د بېلگې په ډول: د گوگړو د تېزابو (H_2SO_4) نسبتي مالیکولي کتله 98amu ده، نو پر دې بنسټ د هغه 98 گرامه یو مول دي. په عمومي ډول که د هرې کیمیاوي ذرې نسبتي کتله په گرام افاده شي، همدا اکتلوي کمیت د هماغې ذرې د مول په نوم یادېږي؛ د بېلگې په ډول: د الکترون نسبتي کتله $5.4 \cdot 10^{-4} \text{amu}$ ده، نو پر دې بنسټ د هغه یو مول $5.4 \cdot 10^{-4} \text{g}$ دی. څرنگه چې اتوم-گرام، مالیکول-گرام، ایون-گرام او داسې نور ټول د مول په نوم یاد شوي دي، د اکمیتونه ټول د اوگدرو د عدد په اندازه د ذرو لرونکي دي؛ نو پر دې بنسټ په ځانگړي توگه کېدای شي چې مول داسې تعریف شي:

مول: د اوگدرو د عدد په اندازه د ذرو کتله په گرام مول دي، یا په بل عبارت که چیرې د اوگدرو عدد په اندازه ذرو کتله په گرام ښودل شوي وي، د اکمیت د مول په نوم یادېږي.



مثال: 200g سودیوم هیدروکساید شو موله کیږي؟ د هغه مالیکولي کتله 40amu ده.

حل:

$$\left. \begin{array}{l} m = 200\text{ g} \\ M = 40\text{ amu} \\ n = ? \end{array} \right\}$$

$$40\text{ g} - 1\text{ mol} \\ 200\text{ g} - n$$

$$\left. \right\} n = \frac{200\text{ g} \cdot 1\text{ mol}}{40\text{ g}} = 5\text{ mol}$$

له پورتنی مثال څخه کیدای شي چې $n = \frac{m}{M}$ فورمول د مول د محاسبې لپاره ولیکل شي.



(9 - 5) شکل: د مس، سیماب، المونیم، برومین، اوسپنه، جست او سلفر د مول اندازه

۹- ۱۱: د مرکبونو د جوړونکو عناصرونو د سلنې لاس ته راوړل

ددې لپاره چې د کیمیاوي مرکبونو د مالیکول د تشکیلونکو عناصرونو سلنه په لاس راوړل شو، لازمه ده چې د هغې د یو مول په کمیت کې د هر عنصر اندازه د مرکب د مالیکولي کتلې په پام کې نیولو سره وموندل شي؛ نو په دې صورت کې د غوښتلې عنصر اندازه چې د مرکب په یو مول کې شتون لري، په 100 عدد سره ضرب او د همدې مرکب په مالیکولي کتلې باندې وویشل شي نو حاصل شوي کمیت د غوښتلې عنصر د سلنې اندازه رانښتي:

د عنصر مقدار

$$= \frac{\text{په مرکب کې د عنصر سلنه}}{\text{د عنصر مقدار د مرکب یو مول}}$$

لومړل مثال: د کاربن، هایدروجن او اکسیجن سلنه په گلوکوز کې محاسبه کړئ، د گلوکوز مالیکولي کتله 180amu ده، همدارنگه د هایدروجن اتومي کتله 1amu، د کاربن 12amu او د اکسیجن اتومي کتله 16amu ده.

$$MC_6H_{12}O_6 = 12 \cdot 6 + 1 \cdot 12 + 16 \cdot 6 = 180 \text{ amu}$$

حل:

$$MC_6H_{12}O_6 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ amu}$$

$$\text{mole } C_6H_{12}O_6 = 72g + 12g + 96g = 180g$$

$$\frac{180g C_6H_{12}O_6}{180g} - \frac{72g C}{100} = W\%$$

$$W\% C = \frac{72g C \cdot 100}{180g} = 40\% C$$

$$\frac{180g C_6H_{12}O_6}{100} - \frac{96g O}{100} = W\%$$

$$W\% O = \frac{96g O \cdot 100}{180g} = 53.33\% O$$

$$\frac{180g C_6H_{12}O_6}{100} - \frac{12g H}{100} = W\% H$$


$$W\% H = \frac{12g H \cdot 100}{180g} = 6.6\% H$$

نوټ: د کیمیاوي مرکبونو د مالیکول د جوړونکو اجزاو د سلنو مجموعه له 100 کېږي.

۱۲-۹ : تجربی او مالیکولي فورمول

تل د یو کیمیاوي مرکب دهغه جوړونکو عناصرونو د سمبولونو په ترتیب او د نسبتي اتومي ضریبونو په واسطه چې د سټیکيومتري (Stoichiometry) د ضریبونو په نوم هم یادېږي، بنودل کېږي د بېلګې په ډول: NaCl د خوړو مالګه او H_2O د اوبو ښودونکی دی، په مرکبونو کې د جوړونکو عناصرونو د اټومونو د سمبولونو ترتیب کېدل دهغوی له نسبتي ضریبونو سره د مالیکولي فورمول په نوم یادېږي.

داوبو یو مالیکول له دوو اټومو هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه جوړ شوی دی؛ پر دې بنسټ د اوبو مالیکولي فورمول H_2O دی.



مالیکولي فورمول کولی شوه، د کیمیاوي تجزيې پر بنسټ وټاکل شي. له کیمیاوي فورمولونو څخه یو ډول یې تجزيې فورمول دي، په دې فورمول کې د بیلابیلو عناصرونو د اټومونو نسبتي شمېر په یو مرکب کې ښودل کېږي، دلته د تجزيې کلمه په دې معنی ده چې وړاندې شوي فورمول یوازې په لیدنې او اندازه کولو یعنې د توصیفې او مقداري تحلیل پر بنسټ ټاکل شوي دي.

د گلوکوز مالیکول د 6 اټومه کاربن، 12 اټومه هایدروجن او 6 اټومه اکسیجن څخه تشکیل شوی دي او د هغې تجزيې فارمول CH_2O دي چې یوازې د کاربن، هایدروجن او د اکسیجن اټومونه د گلوکوز په مالیکول کې رانښتي؛ څرنگه چې دا نسبتونه د یوې مادې تر ټولو ساده شکل ښکاره کوي، له دې کبله دا فارمول، د ساده فارمول په نوم هم یادوي.

د دې لپاره چې د مرکبونو ساده فورمول په ښه توګه ولیکو او لاس ته راوړل شو نو لازمه ده چې د مرکبونو توصیفې او مقداري تحلیل باندې پوه شو. د مرکب د توصیفې او مقداري تحلیل په پوهیدلو کېدای شي، دهغه تجزيې فورمول د لاندې موادو په پام کې نیولو سره ولیکو:

1 - د هر عنصر مقداري کمیت چې د تجزيې په واسطه لاس ته راغلي دي، په مول بدل کړو.

2 - د مرکب د جوړونکي هر عنصر د مولونو اندازه چې د لومړي مادې پر بنسټ تر لاسه کېږي، په پوره پاملرنې سره کوچنی کمیت یې وټاکو، وروسته مطلوب مرکب د مالیکول د تشکیل کوونکو عناصرونو ټول مولې کمیتونه په همدې کوچنی مولې کمیت تقسیم کړو، اعداد پرته د قیاسي واحده لاس ته راځي.

3 - هغه ارقام چې د دوهمې مادې سره سم لاس ته راځي، په پوره پاملرنې کتل کېږي؛ که چېرې نام عددونه وي، د مرکب مالیکول د جوړونکو عناصرونو د اټومونو نسبتونه په ساده فورمول کې دي او که نوموړي رقمونه نام نه وي، هغوی د روڼداف په لاره او یا د کوم کوچنی نام عدد په ضریبونو په نامو عددونو بدل او دا نام عددونه په ساده فورمول کې د عناصرونو د اټومونو نسبت دي. د عناصرونو د اټومونو د مالیکولي فورمول د سسم لیکلو دلایې په پام کې نیولو سره د عناصرونو له سمبولونو سره یو ځای کېږي چې په دې صورت کې ساده فورمول لاس ته راځي.

4 - د مرکب د مالیکولي فورمول د سمولیکو په غرض، سربېره د توصیفې او مقداري تحلیل د مرکب مالیکولي کتنه هم معلومه وي، پر دې بنسټ د توصیفې او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره د پورتنیو موادو له استفادې سره سم ساده فورمول لاس ته راځي؛ که چېرې د مطلوب مرکب مالیکولي کتنه د ساده فورمول په نسبتي مالیکولي کتنه وویشل شي، یو نام عدد به لاس ته راشي، که چېرې دا عدد په ساده فورمول کې د عناصرونو نسبت سره ضرب شي، په پایله کې د مرکب مالیکولي فورمول حاصلېږي.



لومړۍ مثال: د یو مرکب یو ګرام کتله چې له کاربن او هایدروجن څخه جوړه شوي دی ، سوځول شوې ده او په پایله کې د 3.3g کاربن ډای اکساید (CO_2) او 0.899g اوبه لاس ته راغلي دي ، د مرکب ساده فورمول تر لاسه کوئ.

حل:

$$1\text{g} = \text{د عضوي مادې سوځول شوي مقدار}$$

$$3.3\text{g} = \text{کاربن ډای اکساید}$$

$$0.899\text{g} = \text{لاس ته راغلي اوبه}$$

په لومړۍ سرکې: په مطلوب مرکب کې د هایدروجن او کاربن مقدار پر لاس رواړو:

$$18\text{gH}_2\text{O} - 2\text{gH}_2 \quad \left. \begin{array}{l} 0.899\text{g} - m_{\text{H}_2} \\ 44\text{gCO}_2 - 12\text{gC} \\ 3.3\text{gCO}_2 - m\text{C} \end{array} \right\} m_{\text{H}_2} = \frac{0.899\text{gH}_2\text{O} \cdot 2\text{gH}_2}{18\text{gH}_2\text{O}} = 0.1\text{gH}_2$$

$$m\text{C} = \frac{12\text{g} \cdot 3.3\text{gCO}_2}{44\text{gCO}_2} = 0.9\text{gC}$$

$$nC = 0.9\text{g} \div 12\text{g/mol} = 0.075\text{mol}$$

$$n\text{H}_2 = 0.1\text{g} \div 2\text{g/mol} = 0.1\text{mol}$$

$$\text{C} = 0.075\text{mol} \div 0.075\text{mol} = 1$$


$$\text{H}_2 = 0.1\text{mol} \div 0.075\text{mol} = 1.3$$

$$\text{C} = 1 \cdot 3 = 3$$

$$\text{H}_2 = 1.3 \cdot 3 = 4$$

$$\text{C} = 3$$

$$\text{H}_2 = 4$$



مشق او تمرین

د اوسپنې د اکساید 3.2g ته د هایدروجن له ګاز سره تودوخه ورکړه شوي ده ، په پایله کې د 2.24g د اوسپنې فلز حاصل شويدي ، د اوسپنې د اکساید ساده فورمول پیداکړئ. د اوسپنې اټومي کتله 56 او د اکسیجن 16amu ده.



دویم مثال: دیو مرکب په ترکیب کې $8g$ کاربن، $1.33g$ هایدروجن او $10.667g$ اکسیجن شامل دي، د مرکب مالیکولي کتله $180amu$ ده ساده فورمول او د مطلوب مرکب مالیکولي فورمول پیدا کړئ.

حل:

$$\left. \begin{array}{l} mC = 8g \\ mH_2 = 1.33g \\ mO_2 = 10.66g \end{array} \right\} \begin{array}{l} nC = 8g \div 12g / mol = 0.667mol \\ nH_2 = 1.33g \div 1g / mol = 1.33mol \\ nO_2 = 10.667g \div 16g / mol = 0.667 \end{array}$$

$$nC = 0.667mol \div 0.667mol = 1$$

$$nH_2 = 1.33mol \div 0.66mol = 2$$

$$nO_2 = 1.667mol \div 0.667mol = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} C = 1 \\ H = 2 \\ O = 1 \end{array} \right\} CH_2O$$

$$M(CH_2O)n = 180$$

$$(30)n = 180$$

$$n = \frac{180}{30} = 6$$

$$\left. \begin{array}{l} (CH_2O)n = (CH_2O)_6 \\ C_6H_{12}O_6 \end{array} \right\}$$

د گلوکوز مالیکولي فارمول:



د نهم خپړکي لنډيز

* په یو کیمیاوي تعامل کې د تعامل محصول د کتلو مجموعه ، د تعامل کوونکو موادو د کتلو له مجموعي سره مساوي ده.

* د مرکب د مالیکول جوړونکي عنصرونه د مرکب د جوړېدو پر وخت کې د ټاکلې او ثابت وزنې یا کتلوي نسبت سره تعامل کوي.

* دوه عنصرونه یو له بل سره تعامل کوي، یوازې یو ډول مرکب نه جوړوي؛ خو که خپرې دهغوی کتلوي نسبت ته بدلون ورکړل شي، بیلایل مرکبونه تشکیلوي، د دې عنصرونو کتلوي نسبت د هغه په بیلایلو مرکبونو کې چې ډبل عنصر ټاکلي کتلې سره یې جوړکړي دي، تام ثابت او کوچنی عددونه دي

* دوه مادې او یا عنصرونه هر یو په ځانگړي ډول له دریم عنصر سره په یوه ټاکلي کتلوي نسبت تعامل کوي، پرته د پاتې شونو، مرکبونه جوړوي، دا دوه عنصرونه په خپل منځ کې هم په هماغې اندازې کتلې چې له دریم عنصر سره یې تعامل کړي دي، تعامل او مرکب جوړوي.

* د یوه عنصر معادلې کتله د هماغه عنصر د کتلې هغه مقدار دی کوم چې له اته گرامه اکسیجن سره یې تعامل کړي وی او د پاتې خڅه پرته له خپل اړوند اکساید یې تشکیل کړي وي.

د یو عنصر معادله کتله هغه کتلې خڅه عبارت ده چې په یو کیمیاوي تعامل کې یو گرام او یا یو اټوم- گرام هایدروجن یې ځایه او ازاد کړی.

* د کیمیاوي مرکبونو معادله کتله عبارت دي له: د مرکبونو نسبتي مالیکولي کتله تقسیم پر موثر ولانس، د همدې مرکب په مالیکول کې ده.

* په ثابته تودوخه او فشار کې د تعامل کوونکو گازي موادو حجمي نسبت او د گازي محصولو یا براسو نسبت تام، کوچنی او ټاکلی عددونه دي او هم د گازي تعامل کوونکو موادو حجمي نسبت د گازي محصول په تشکیل کې کوچني او ټاکلي عددونه دي.

* د هرې مادې یو مول د اوگندرو د عددونو ($6.02 \cdot 10^{23}$) په اندازه د ذرو لرونکی دي، که خپرې ماده د گازي حالت لرونکي وي، د هر گاز یو مول په STP شرایطو کې $22.4L$ حجم هم نیسي.

* مول: د اوگندرو د عدد په اندازه د ذرو کتله په گرام، مول دي، یا په بل عبارت که خپرې د ذرو کتله

د اوکړو عدد په اندازه په گرام بنډول شوي وي، دا کمیت د مول په نوم یادېږي.
 * که د مطلوب عنصر اندازه چې د مرکب په یو مول کې شتون لري، په 100 عدد کې ضرب او د هغه مرکب پر مالیکولي کتلې باندې وویشل شي، حاصل شوي کمیت د مطلوب عنصر د سلنې

اندازه رانښتي:

د نهم څپړکي تمرین څلور خوا به پوښتي:

- 1 - په عمومي ډول یوه علمي مساله په بنسټونو ولاړه ده:
 الف- یوه ب- دوه ج- درې د- څلور
- 2 - د تعامل د محصو لاتو مجموعې کتله د تعامل کوونکو موادو د کتلو له مجموعې سره --- ده.
 الف- څپړ زیات ب- څپړ کم ج- مساوي د- ځینې وختونه زیات او ځینې وختونه کم

3 - د په نامه یو عالم د ټاکلي بنسټونو یا ساده بنسټونو قانون یې منځ ته راوړ، نو له دې کبله د نوموړي په نوم هم یادېږي.

- الف- لاوازه ب- گیلوسک ج- $Prout$ د- دالتن
- 4 - اوبو او هایدروجن پر اکساید په مرکب کې د اکسیجن نسبت دی.
 الف- 1:2 ب- 3:1 ج- 2:3 د- 1:2
- 5 - د آلاندي کوم رقمونه د H_3PO_4 معادلې کتله رانښتي.
 الف- 16 ب- 15 ج- 32 د- 22
- 6 - په ثابت توکو او فشار کې د تعامل کوونکو گازي موادو حجمی نسبت او د هغو د لاس ته راغلي گازي محصول حجمی نسبت دی.

الف- تام، ثابت او کوچنی عددونه ب- کسري عددونه
 ج- نوي رقمونه د- هېڅ یو

- 7 - د هرې مادې یو مول --- په اندازه ذرې لري.
 الف- د اوکړو عدد ب- $6.02 \cdot 10^{-23} g$ ج- 22,4 لیتر د- الف او ب
- 8 - د کاربن نسبي اټومي کتله 12 او د هغه د یو اټوم کتله $1.993 \cdot 10^{23} g$ ده، د amu قیمت دی.

- الف- $6.02 \cdot 10^{-24} g$ ب- $6.02 \cdot 10^{-27} g$ ج- الف او ب د- هېڅ یو
- 9 - په گلوکوز کې د کاربن سلینیه محاسبه کړئ.

- الف- 50% ب- 23% ج- 40% د- 33%
- 10 - مول عبارت د..... ذرو د کتلې اندازه په ګرام ده.
- الف- کیلو ګرام ب- $6.02 \cdot 10^{23} \text{ g}$
- ج- او ګډو عدد د- ب او ج دواړه سم دي.

تشریحي سوالونه

- 1 - په لوړې تودوخه او فشار کې د نایتروجن او هایدروجن ګازونو سره تعامل کړی چې امونیا یې تشکیل کړی ده ، که $4.20 \cdot 10^{26}$ د نایتروجن مالیکولونو له هایدروجن سره تعامل وکړی ، د تعامل کورنۍ هایدروجن د کتلې اندازه او د تعامل کورنۍ هایدروجن د مالیکولونو تعداد به څومره وي ؟ لاسته راغلي امونیا څومره او څو مالیکولونه به لري ؟
- 2 - امونیا له اکسیجن سره تعامل کوي چې NO او اوبه لاس ته راځي ، $3.6 \cdot 10^{21}$ شمېر د اکسیجن مالیکول به کوم شمېر د NO مالیکولونه تشکیل کړي ؟
- 3 - د B سلنه د $HGa_3 Al_2 BSi_2 O_6$ ، $KCrO_4$ ، او اوبه $H_2 O$ د ټاکلو شرایطو لاندې یو له بل سره تعامل کړي ، دهغه د تعامل محصول هغه مرکب دي چې د CrO_4^{2-} ، OH^- او CrO_4^{2-} جوړ شوي دي ، مقداري تحلیل رابښتي چې په نوموړي مرکب کې پورتنی لیکل شوي ایزونونه په ترتیب سره 48.7% ، 35.6% او 15.7% شتون لري ، د دې مرکب تجربی فورمول لاس ته راوړی .
- 5 - لاندې ټاکل شوي کمیتونه لاس ته راوړئ .
 - الف- د جست $9.32 \cdot 10^{25}$ اتومونو مولی کتله
 - ب- د ارګون 3.27 موله کتله څو ګرامه ده ؟
 - ج- د سپینو زرو $(3.07 \cdot 10^{20})$ اتومي ذرې څو ملي ګرامه کتله لري ؟
 - د- 46.5 cm^3 اوسپنه څومره اټومونه لري ؟ $d_{Fe} = 7.68 \text{ g / cm}^3$ دي .
- 6 - دهغه فلز اتومي وزن لاس ته راوړي کوم چې د هغه د اړوند اکساید تجربی فورمول $Me_2 O_3$ وي او د مطلوب فلز سلنه د هغه په ټاکل اکساید کې 68.4% ده .
- 7 - عنصر له کلورین سره تعامل کوي چې په پای کې یې د XCl_4 مرکب تشکیل کړی دي په نوموړي مرکب کې د Cl د ایون سلنره 74% ده ، X کوم عنصر دي ؟
- 8 - 1.423 g د سکالندینیم اکساید له H_2 سره تعامل اوارجاع شوي دي چې په پایله کې 0.929 g د Sc فلز او اوبه حاصل شوي دي ، د اکساید فورمول پیدا کړئ .
- 9 - که چیرې $KClO_3$ ته تودوخه ورکړل شي ، له لاندې معادلې سره سم په KCl او اکسیجن



تجزیه کبری:



که چیرې نوموړي مرکب په سلوکې %50 تجزیه شي، د $KClO_3$ وزن خوږه کمېږي؟
($KClO_3$ وزن 100g دی)

10- $NaCl$ او KCl مخلوط دیو ګرام په وزن شتون لري، کله چې نوموړی مخلوط په اوبو کې حل شي او $AgNO_3$ ورزیات شي، د کلوراید ټول ایزونه په $AgCl$ تبدیلېږي او رسوب کوي، د $AgCl$ د رسوب اندازه مساوي $2.1476g$ ده، د $NaCl$ مقدار به په لومړني مخلوط کې خوږه وي؟

11- $1.35g$ کلسیم د هوا په شتون کې کاملاً په $1.8g$ کلسیم اکساید تبدیل شوي دي د کلسیم انومي کتنه پیدا کړئ، د اکسیجن انومي کتنه 16 ده.

12- که چیرې $2.75g$ ، Pb_3O_4 مرکب ته تودوخه ورکړ شي، تجزیه او $0.064g$ اکسیجن او د هغه بل اکساید جوړېږي، منځ ته راغلي د سرب اکساید فورمول پیدا کړئ.

13- د هایدرو کاربن په یو مخلوط کې %40 د C_3H_8 او %40 د $CxHy$ کتلې شاملې دي، ددې مخلوط د 10 ګرامه سوځول شوي دي، په پایله کې CO_2 او $18.8g$ اوبه لاس ته راغلي دي، د $CxHy$ هایدرو کاربن فورمول پیدا کړئ.

14- د لیتیم کاربونیټ تجربې فورمول Li_2CO_3 دي، د نوموړي مرکب د فورمول هر واحد کوم شمېر د تشکیل کوونکو عناصرونو د اټومونو لرونکې دی؟

15- د نایټروجن د ګاز نمونه چې د $4.6 \cdot 10^{22}$ اټومه نایټروجن لري، د نایټروجن د اټوم څو موله په دې انومي کمیت کې شتون لري؟

16- د چوڼي تېره (کلسیم کاربونیټ) ته تودوخه ورکول شي ده چې په پایله کې په CaO او CO_2 تبدیلېږي، که چیرې $40g$ د چوڼي تېره تجزیه شي، د $22.4g$ اندازه CaO لاس ته راځي، د CO_2 مقدار په دې تجربه کې محاسبه کړئ.



ادخلیكونه

- 1- Kotz John C., paul Treichel, Jr. Chemistry and Chemical Reactivity(fourth edition). Harourt Barace and Company. U.S.A., 1999.
- 2- Raymony Chang. Chemistry(seventh edition). 2002.
- 3- Chemistry News are selected from chemistry in Britian, Nos. May, Jun, August/ 1998.
- 4- Hotl, Rinehart/Winston Physical Science, a Harcourt education chemistry Company 2005.
- 5- Hotl, Rinehart/Winston Modern chemistry 2005.
- 6- Chemistry stouten S.Zumdahl, third edition university of Illinois 1993.
- 7- Fuddamental of Chemistry, third edition, David E. Goldberg. Brookly College, 1998.
- 8- Kotz John C., paul Treichel, Jr. Chemistry and Chemical Reactivity(fourth edition). Harourt Barace and Company. U.S.A., 1999.
- 9 - شیمی (3) و آزمایشگاه. برهم کنش میان مواد، سال سوم دبیرستان، 1386
کود 257.1
- 10 - علوم تجربی. سال سوم دوره راهنمایی، کود 143 سال 1386.
- 11 - شیمی. شیمی برای زنده گی(1)، کود 207.1 سال 1384 .
- 12 - عمومی کیمیا. مولف: پوهندوی دیپلوم انجنیر عبدالمحمد عزیز، د کابل پوهنتون استاد، کال 1387.



Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library