




ننگرهار طبي پوهنځی

د زړه او د وینې درگونو اناتومي



پوهنمل ډاکټر محمد ناصر نصرتی

۱۳۹۴

خرڅول منع دی



Nangarhar Medical Faculty

Afghanic

Dr M. Nasir Nasraty

Anatomy of Cardiovascular System

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan




Not For Sale

2015

د زړه او د وینې د رګونو
اناتومي

پوهنمل ډاکټر محمد ناصر نصرتي



Pashto PDF
2015



Nangarhar Medical Faculty
ننګرهار طب پوهنځی

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

Anatomy of Cardiovascular
System

Dr M Nasir Nasraty

Download: www.ecampus-afghanistan.org

بسم الله الرحمن الرحيم

د زړه او د وینې درگونه اناتومی

پوهنمل ډاکتر محمد ناصر نصرتی

دغه کتاب په پی دی اف فورمت کی په مله سی دی کی هم لوستلی شی:



د کتاب نوم	د زړه او د وینې درگونو اناتومي
لیکوال	پوهنمل ډاکټر محمد ناصر نصرتی
خپرنډوی	ننګرهار طب پوهنځی
ویب پاڼه	www.nu.edu.af
چاپ شمېر	۱۰۰۰
د چاپ کال	۱۳۹۴
ډاونلوډ	www.ecampus-afghanistan.org
د چاپ ځای	سهر مطبعه، کابل، افغانستان

د اکتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې په جرمني کې د Eroes کورنۍ یوې خیریه ټولنې لخوا تمویل شوی دی. اداري او تخنیکي چارې یې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوي دي. د کتاب د محتوا او لیکنې مسؤلیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځی پورې اړه لري مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولنې په دې اړه مسؤلیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ:
 ډاکټر یحیی وردک د لوروزده کړو وزارت کابل
 تیلیفون 0756014640
 ایمیل textbooks@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي

ای اس بی ان: ISBN:978 9936 500 563

د درسي کتابونو د چاپ پروسه

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه گڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نوي معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه ګټه اخلي چې زړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

تراوسه پورې مونږ د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپیسا د طب پوهنځیو او کابل طبي پوهنتون لپاره ۱۵۶ عنوانه مختلف طبي تدریسي کتابونه چاپ کړي دي. د ننگرهار طب پوهنځی لپاره د ۲۰ نورو طبي کتابونو د چاپ چارې روانې دي. د یادونې وړ ده چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هیواد ټولو طب پوهنځیو ته په وړیا توګه ویشل شوي دي. ټول چاپ شوی طبي کتابونه کولای شي د www.afghanistan-ecampus.org ویب پاڼې څخه ډاونلوډ کړي.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لویو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې: "د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په درې او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انګریزي ژبې څخه درې او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي".

د لوړو زده کړو د وزارت، پوهنتونونو، استادانو او محصلینو د غوښتنې په اساس په راتلونکې کی غواړو چې دا پروګرام غیر طبي برخو لکه ساینس، انجنیري، کرهنې، اجتماعي علومو او نورو پوهنځیو ته هم پراخ کړو او د مختلفو پوهنتونونو او پوهنځیو د اړتیا وړ کتابونه چاپ کړو.

کوم کتاب چې ستاسې په لاس کې دي زمونږ د فعالیتونو یوه بېلګه ده. مونږ غواړو چې دې پروسې ته دوام ورکړو، تر څو وکولای شو د درسي کتابونو په برابرولو سره د هیواد له پوهنتونو سره مرسته وکړو او د چپتر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړینه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ کړل شي.

له ټولو محترمو استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چپټرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي. زموږ په واک کې يې راکړي، چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوندې پوهنځۍ استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د يادو شويو ټکو په اړوند خپل وړاندیزونه او نظريات زموږ په پټه له مونږ سره شريک کړي، تر څو په گډه پدې برخه کې اغيزمن گامونه پورته کړو.

د يادونې وړ ده چې د مولفينو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتويات د نړيوالو علمي معيارونو په اساس برابر شي، خو بيا هم کيدای شي د کتاب په محتوی کې ځينې تيروتنې او ستونزې وليدل شي، نو له درنو لوستونکو څخه هيله مند يو تر څو خپل نظريات او نيوکې مولف او يا مونږ ته په ليکلې بڼه راوليږي، تر څو په راتلونکې چاپ کې اصلاح شي.

د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټې او د هغې له مشر ډاکټر ايروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت يې ورکړي دي دوی په تيرو کلونو کې هم د ننگرهار د طب پوهنځی د ۶۰ عنوانه طبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه درلود.

په ځانگړي توگه د جې آي زيت (GIZ) له دفتر او (CIM) Center for International Migration & Development چې زما لپاره يې په تېرو پنځو کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي دي هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو وزارت علمي معين ښاغلي پوهنوال محمد عثمان بابري، مالي او اداري معين ښاغلي پوهنوال ډاکټر گل حسن وليزي، د ننگرهار طب پوهنځی رييس ښاغلي ډاکټر خالد يار، د ننگرهار طب پوهنځی علمي مرستيال ښاغلي ډاکټر همايون چارديوال، او استادانو څخه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ يې هڅولې او مرسته يې ورسره کړې ده. د دغه کتاب له مولف څخه مندوی يم او ستاينه يې کوم، چې خپل د کلونو کلونو زيار يې په وړيا توگه گرانو محصلينو ته وړاندی کړ.

همدارنگه د دفتر له همکارانو حکمت الله عزيز، احمد فهيم حبيبي او سبحان الله څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې يې نه ستړې کيدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر يحيی وردگ، د لوړو زده کړو وزارت مشاور
کابل، جنوري ۲۰۱۵

د دفتر تيليفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ايميل: textbooks@afghanic.org
wardak@afghanic.org

اهداء

دا کتاب د خپلو گرانو او مهربانو والدينو پاک روح ته چه زما په
تربيت کي ئي له خپل اقتصادي مشکلاتو سره سره زيات زيار
ايستلي او زه ئي دي حد ته رسولي يم اهداء کوم

سريزه

په اول ځل مونږ د قلبي وعايې ، تنفسي ، هضمي او بولي تناسلي سيستمونو داناتومي تر عنوان لاندې کتاب جدا د افغانستان اسلامي پوهنتون د طب پوهنځي د مالي بوديجي نه په ۱۳۷۷ هجري شمسي کال کي چاپ کړي وه او د محترم استاد پوهنوال دکتور حبيب الرحمن (يوسفزي) پواسطه ددې کتاب تشويق ، ترغيب او همدارنگه نوموړي استاد له ما سره ددې کتاب په تشکيلاتو کي پوره همکاري کړي او پوهاند صاحب شيرزاد يعقوبي او مرحوم پوهاند صاحب عبدالواحد الکوزي د نوموړي کتاب ټولي برخي کتلي او خپل تقريظ ئي د کتاب په هکله ورکړي او هم ئي زه ددې کتاب اول ځل چاپولو ته تشويق کړي وم ددوي څخه مننه کوم له دې وروسته بيا همدا کتاب دويم ځل زما په خپل شخصي لگښت په ۱۳۸۸ هجري شمسي کال کي چاپ شوی چون د کتاب حجم زيات وه او د کتاب د ورقو د تيت پاشان کيدو خطر موجوده وه ما صرف اوس نوموړي کتابونه سره يو جدا کړي او کومه نسخه د کتاب چي اوس له تاسو سره ده د زړه او د ويني د رگونو اناتومي تر عنوان لاندې ليکل شوی نوی معلومات له معتبرو ټکس کتابو څخه په کي ځاي په ځاي شوي دي او د چاپ لگښت يې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کميټي په جرمني کي د Eroes کورني يوي خپريه ټولني له خوا ترسره شوی مننه تری کوم ددې کتاب په ټايپ او کمپوز کي زما زوي وثيق الله (نصرتي) پوره همکاري کړي مننه تري کوم کيداي شي په نوموړي کتاب کي په زياته اندازه نيمگړتياوي موجودي وي نو که هرهم مسلک ورور يا خور چي نوموړي کتاب مطالعه کوي که څه کتبي يا طباعتي غلطې پکښي پيدا کړي نو د مهرباني له مخي د ماته خبر راکړي تر څو په اينده چاپو کي د هغي اصلاح صورت ونيسي

په درنښت

پوهنمل دوکتور محمد ناصر نصرتي

تقریظ

د زړه او د وینې درگونو اناتومی کتاب چي د دکتور محمد ناصر نصرتي له خوا لیکل شوی په پوره غور سره مطالعه کړ او ددی کتاب په هکله خپل نظریات په لاندی ډول لیکم
۱- نوموړی کتاب چي په (۱۳۷) صفحو کی لیکل شوی دی د طب پوهنځی د زده کوونکو لپاره ډیر ضروری دی.

۲- دا کتاب چی په روانه پښتو ملی ژبه لیکل شوی په کافی اندازه معلومات لری
۳- د کتاب په تهیه کولو کی د نړی د نوو ټکس کتابو څخه استفاده شوی چی په ریفرنس کی لیکل شوی دی.

۴- په کتاب کی د موضوعاتو د روښانه کولو په خاطر چی کوم شکلونه تهیه شوی دی په ډیره ښه توگه ترتیب او ددی کتاب په پوره علمی توب دلالت کوی.
په اخر کی د کتاب لیکوونکي لپاره د خدای (ج) له درباره پوره کامیابي او موفقیت غواړم.

والسلام

پوهنوال دکتور حبیب الرحمن (یوسفزی)

تقریظ

د زړه او د وینې د رگونو داناتومی کتاب چي د دکتور محمد ناصر نصرتي له خوا لیکل شوی دی لاندی توگه ارزیابي کوو.

۱- نوموړی کتاب چي په (۴) فصلونو او (۱۳۷) صفحو کی لیکل شوی دی د طب پوهنځی د زده کوونکو لپاره ډیرگټور او ضروری دی.

۲- دا کتاب چی په ساده ملي پښتو ژبه په واضح کلمو او جملو لیکل شوی چی ټول محصلین او محترم ډاکتر صاحبان ورڅخه پوره علمی استفاده کولای شی.

۴- د موضوعاتو د ښه تشریح له پاره په زیاتو ځایونو کی شکلونه هم موجود دی چی د موضوعاتو په علمی توب دلالت کوی .

۳- ددی علمی اثر په برابرولو کی کی د نړی د نوو ټکس کتابونو څخه استفاده شوی کوم چی د نړی په پوهنتونونو کی د اناتومی د تدریس په برخه کی ورڅخه استفاده کیږی چی په ریفرنس کی لیکل شوی دی.

۴- باید ذکر کړو چی ددی علمی اثارو په چاپولو او تکثیر څخه وروسته د محصلینو د لکچر له پاره زمینه برابره چی ډاکار له یوی خوا د وخت له ضیاع څخه مخنیوی کوی او له بلی خوا گران محصلین د لکچر او ددی چاپ شوی موضوعاتو څخه اعظمی علمی استفاده کولای شی.

۵- په اخر کی په ډاډ سره لیکو چی دا موضوعات پوره علمی ښه لری او د محصلینو د تدریس له پاره خورا مفید او د ډاکتر صاحب محمد ناصر ددی علمی موضوعاتو تهیه کول د ستاینی وړ بولو او د خدای تعالی (ج) څخه ورته نور د علمی خدمت کولو توفیق غواړو.

والسلام

پوهاند دکتور شیرزاد (یعقوبي) پوهاند دکتور عبدالواحد (الکوزی)

فهرست


عنوان	مخ
عمومیات.....	۱
اول فصل.....	۵
زړه	
د زړه بیرونی منظره	
د زړه داخلی ساختمان	
د زړه والونه	
د زړه تنبهي سیستم	
د زړه اروا	
وریدی تخلیه	
تعصیب او لمفاوی تخلیه	
دویم فصل.....	۲۶
شریانونه	
Pulmonary trunk	
Aorta	
دریم فصل.....	۹۸
وریدونه	
Pulmonary veins	
Systemic veins	
Portal veins	
خلورم فصل.....	۱۳۲
لمفاوی سیستم	

قلبي وعائي سيستم

عموميات

څرنگه چه د نامه څخه ئي معلومېږي دا سيستم د قلب او اوږو څخه متشکل دي، ددي سيستم پواسطه Oxygenated وينه د بدن ټولو انساجو ته انتقالېږي او Deoxygenated وينه چه د کاربن داي اکسايډ لرونکي دي دوباره د تصفيه په خاطر قلب او بالاخره د قلب څخه سږو ته انتقالېږي. قلب ددي سيستم اساسي عضوه دي چه د دموي مایع د پمپ وظيفه په غاړه لري او اوږي چه عبارت له شريانو، وريدو او شعريه عروقو څخه دي. د قلب څخه ددموي مایع د وړولو او بيرته راوړلو وظيفه په غاړه لري.


د ويني دوران په بدن کي: اکسيجن لرونکي وينه د سږو څخه د Pulmonary veins له لاري د زړه چپ دهليز (Atrium) ته راوړل کېږي او د زړه د چپ دهليز څخه نوموړي وينه د ميترال د سام له لاري چپ بطين (Ventricle) ته انتقالېږي او د زړه له چپ بطين څخه نوموړي وينه د Aorta له لاري ټول بدن ته انتقال مومي او له بدن څخه ناپاکه وينه د S.V.C او I.V.C په لارو بنسې دهليز ته او د بنسې دهليز څخه د ترای کوسپيد د سام له لاري بنسې بطين ته او له بنسې بطين څخه د Pulmonary trunk له لاري سږو ته د تصفيي په خاطر انتقال مومي چه په سږو کي نوموړي وينه کاربن داي اکسايډ له لاسه ورکوي او اکسيجن اخلي او بيرته د Pulmonary veins له لارو قلب ته انتقالېږي او په همدې ترتيب د ژوند تر اخري سلگي پوري وينه په بدن کي جريان لري مونږ په دي مبحث کي ددي سيستم هره عضوه په جداگانه ډول تر بحث لاندې نيسو لکن مخکي له دي چه مونږ اول د قلبي وعائي سيستم اعضاء چه عبارت د قلب، شريانو او وريدو څخه دي وڅيړو نو بنه به داوي چه مونږ اول ميډياسټينوم او Pericardium وپيژنو ځکه چه قلب د Pericardium پواسطه پوښل شوي او په ميډياسټينوم کي موقعيت لري.



۱- شکل

THE MEDIASTINUM: مونږ په دې ځاي کي ميډياسټينوم په خلص ډول ليکو ځکه چه تفصيلي شرحه ئي په تنفسي سيستم کي بيانېږي. ميډياسټينوم د سيني د جوف هغه برخه چه د دواړه سږو د انسي سطحو تر مينځ قرار لري د ميډياسټينوم پڼوم يادېږي. ميډياسټينوم په قدام کي د سټرنوم هډوکي پواسطه، په خلف کي د ستون فقرات پواسطه، په علوي کي د صدر د دخولي فوهي پواسطه، په سفلي کي د حجاب حاجز پواسطه او په دواړو خواو کي د ميډياسټينال پلورا پواسطه چه د سږو انسي سطحي پوښوي احاطه شوي دي. ميډياسټينوم د هغه خيالي خط پواسطه چه د Sternal angle څخه د څلورمې صدري فقري د جسم تر سفلي کنار پوري امتداد لري په دوه برخو ويشل کېږي چه عبارت له علوي ميډياسټينوم او سفلي ميډياسټينوم څخه دي.

سفلي ميډياسټينوم بيا په خپل مينځ کي د Pericardium پواسطه په دري برخو ويشل کېږي، هغه برخه د سفلي ميډياسټينوم چه د Pericardium په قدام کي قرار لري د قدامي ميډياسټينوم په نوم او هغه برخه د سفلي ميډياسټينوم چه د Pericardium په خلف کي قرار لري د خلفي ميډياسټينوم په نوم او خپله Pericardium او د هغه محتويات وسطي ميډياسټينوم جوړوي.



۲- شکل


THE PERICARDIUM : Pericardium یوه فبروس پروژ کڅوړه ده چه قلب او د غټو او عیو بیخونه پوښوي Pericardium په وسطي میدیاستینوم کې موقعیت لري او لرونکي دوه برخو دي چه عبارت دي له فبروز Pericardium او سیروز Pericardium څخه.

THE FIBROUS PERICARDIUM : دا یوه مخروطي شکله کڅوړه ده چه له فبروز نسج څخه جوړه شوي ده. د سیروز Pericardium جداري صفحه د فبروز Pericardium له عمیقه سطحې سره نښتي ده دا چه وموویل فبروز Pericardium مخروطي شکل لري چه زړه ئې پورته واقع ده او د سترنل انگل برابر موقعیت لري چه د غټو او عیو له بیخو او د غاړې د عمیقه صفاق له پریترایخال لایر سره نښتي ده. قاعده ئې د حجاب حاجز له مرکزي برخې (د حجاب حاجز دا برخه وتري ده) سره یوځای شوي دي.

فبروز Pericardium په قدام کې دسترونوم هډوکي د جسم د خلفي وجهې سره د علوي او سفلي Sternopericardial اړبطو پواسطه په خلف کې دښي او چپ برانکسو، مري او Descending thoracic aorta سره او په دواړو خواو کې د Mediastinal pleura سره چه د دواړو سږو انسي سطحې پوښوي، Phrenic nerve او Pericardiophrenic او عیو سره ارتباط لري.

THE SEROUS PERICARDIUM: سیروز Pericardium له دوه صفحو څخه تشکیل شوي چه بیروني پوښ ئې Parital pericardium نومېږي چه د فبروز Pericardium سره نښتي او داخلي صفحه ئې چه د Visceral pericardium یا Epicardium په نوم یادېږي د قلب د سطحې سره نښتي ده. دغه دواړه صفحي د غټو او عیو د بیخو په برخو کې یو د بل په متداد قرار لري.

د پورته دواړو صفحو ترمینځ کمه اندازه فاصله قرار لري چه د Pericardial cavity په نوم یادېږي او په نوموړي خلا کې کمه اندازه سیروز مایع قرار لري ترڅو ددې مایع په موجودیت کې ددې صفحاتو سطحې بنوي وساتل شي او قلب پکې په اسانې سره انقباض او انبساط وکولای شي.



۳- شکل

د Pericardium محتویات: د Pericardium محتویات په لاندې ډول سره دي.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Heart with cardiac vessels -1 | Ascending aorta -2 |
| Pulmonary trunk -3 | Sup vena cava نیمایي سفلي قسمت. -4 |
| Inf Vena cava اخري قسمت. -5 | Pulmonary وریدو اخري قسمتونه -6 |

اول فصل


زړه (The Heart)

د زړه شکل او موقعیت: قلب چه یوه مجوفه عضلي عضوه ده مخروطي شکل لري او په وسطي ميډیاستینوم کي موقعیت لري نوموړي عضوه د Pericardium پواسطه پوښل شوي او د عضویت مختلفو برخو ته وینه پمپوي ترڅو د هغوي غذائي ضروریات پوره کړي. د قلب یوناني نوم کارډیا او لاتین نوم ئي Cor دي چه د Cardiac او Coronary صفات له پورته نومو څخه اخیستل شوي دي. قلب په وسطي ميډیاستینوم کي دسترونم هډوکي د جسم او د اضلاعو د غصروفي برخو شاته په مایل ډول داسي موقعیت لري چه 1/3 برخه ئي د متوسط خط بني خواته او 2/3 برخه ئي د متوسط خط چپ خواته واقع ده. د قلب اندازه په کاهلو اشخاصو کي 9x12 سانتی متره دي او وزن ئي په نارمل ډول په نارینه وکي 300 گرامه او په ښځو کي 250 گرامه دي.

د قلب ساختمان او خارجي منظره: د قلب جدار د یوي ضخیمي عضلي طبقي څخه چه د Myocardium په نوم یادېږي جوړ شوي دي نوموړي طبقه خارجاً د Epicardium او داخلاً د Endocardium پواسطه پوښل شوي ده. قلب څلور جوفونه لري چه دوه دهلیزونه او دوه بطينات دي دواړه دهلیزونه د Interatrial septum او دواړه بطينات د بین البطيني حجاب پواسطه سره جدا شوي دي.

د بین البطيني حجاب ښکتنی قسمت ضخیم او د عضلي الیافو څخه جوړ شوي ده او پورتنی قسمت ئي نازک او غشائي دي پورتنی برخه د Interventricular septum چه غشائي ده د Atrioventricular والونو د فبروز زنگ سره نښتي ده. د زړه دواړه دهلیزونه د بطيناتو په علوي خلفي قسمت کي قرار لري. د زړه دهلیزونه له بطيناتو څخه د اتریوینتریکولار گرو پواسطه چه د قلب په سطحه قرار لري جدا شوي دغه میزابه تقریباً دایروي شکل لري د قلب په قدامي سطحه کي په دي میزابه Ascending aorta او Pulmonary trunk راوښتي دي. دواړه دهلیزونه د انتراتریال گرو پواسطه یو له بل څخه جدا شوي دي دغه میزابه په خلف کي د لیدلو وړ لکن په قدام کي د Aorta او Pulmonary trunk پواسطه پټه شوي ده. دواړه بطينات په خپل مینځ کي د

Intervenricular groove پواسطه سره جدا شوي دي Intervenricular groove دوه برخي لري چه عبارت دي له قدامي او خلفي برخو څخه. قدامي برخه ئي د قلب چپ کنار ته نژدي قرار لري دغه ميزابه چه بنکته او چپ ته ميلان لري سفلي نهايت ئي د قلب زروه د قلب له سفلي کنار څخه جدا کوي. خلفي Intervenricular groove د قلب په سفلي وجه باندې قرار لري او دا ميزابه د قلب بني کنار ته نژدي موقعيت لري. دواړه بين البطيني ميزابي د قلب په بيروني سطحه کي د قلب په سفلي کنار کي د قلب زروي ته نژدي يو د بلي سره يوځاي کيږي. د قلب دهليزونو په پورتنيو قسمتو کي ضميموي ساختمانونه وجود لري چه د Auricle په نوم يادېږي. قلب لرونکي د يوي زروي، يوي قاعدي، دري وجهو (قدامي، سفلي، چپ) او څلورو کنارو (علوي، سفلي، بني، چپ) دي.



۴- شکلونه

د قلب زروه : د قلب زروه د چپ بطين پواسطه جوړه شوي چه بنکته، قدام او چپ طرف ته تمايل لري. د قلب زروه په چه پنځمه بين الضلعي مسافه کي د Midsternal line څخه دري نيم انچه وحشي طرف ته او د Midclavicular line په انسي خواکي موقعيت لري په يو ژوندي انسان کي چه لږ څه لاغروي په همدې ناحيه کي د قلب د زروي نبضان (Pulsation) ليدل کيداي شي.

د قلب قاعده : د قلب قاعده په حقيقت کي د قلب خلفي وجه جوړوي، د قلب د قاعدي زياتره برخه د چپ دهليز او ډيره کمه برخه ئي د بني دهليز پواسطه جوړه شوي ده. د قلب په قاعده کي د پلموناري وریدو څلور سوري چه چپ دهليز ته خلاصیږي او همدارنگه د S.V.C او I.V.C سوري چه بني دهليز ته خلاصیږي موجود دي. د قلب قاعده د ملاستي په حالت کي د پنځمي صدري فقري څخه تر اتمي صدري فقري برابر قرار لري او د ولاړي په حالت کي يوه فقره پورته موقعيت نیسي. د قلب دا برخه د ستون فقرات څخه د لاندي ساختمانو پواسطه جدا شويده.

The pericardium -1

The right pulmonary veins -2

3- مري

The aorta -4

د زړه کنارونه : قلب څلور کنارونه لري چه عبارت دي له علوي، سفلي، بني او چپ کنارو څخه. د زړه علوي کنار کمه اندازه مایل موقعيت لري چه زياتره برخه ئي د چپ دهليز او کمه برخه ئي د بني دهليز پواسطه جوړه شوي دي. د زړه سفلي کنار تقريباً افقي موقعيت لري چه اصلاً د بني بطين پواسطه جوړه شوي دي ددي کنار ډيره کمه برخه د قلب زروي ته نژدي د چپ بطين پواسطه جوړه شوي ده. د زړه بني کنار نسبتاً عمودي دي او د بني دهليز پواسطه جوړه شوي او د زړه چپ کنار چه د يو منحنی مایل خط په شکل موقعيت لري زياتره د چپ بطين پواسطه او کمه برخه ئي د چپ اوريکل پواسطه جوړه شوي، نوموړي کنار د زړه قدامي او چپي وجهي سره جدا کوي.

د زړه وجهي : زړه دري وجهي لري چه عبارت دي له:

1- د زړه قدامي وجه يا Sternocostal surface

2- د زړه سفلي وجه يا Diaphragmatic surface

3- د زړه چپه وجه

د زړه د قدامي وجهي زياتره برخه د بني دهليز او بني بطين پواسطه او کمه برخه ئي د چپ بطين او چپ Auricle پواسطه جوړه شوي. سفلي وجه ئي د حجاب حاجز د مرکزي وتري برخي لپاسه قرار لري چه 2/3 برخه ئي د چپ بطين او 1/3 برخه ئي د بني بطين پواسطه جوړه شويده.

د زړه د چپي وجهي زيادتره برخه د چپ بطين پواسطه او ددي وجهي كمه برخه په علوي نهايت كي د چپ Auricle پواسطه جوړه شوي ده، د زړه د چپي وجهي پورتنې قسمت د Coronary sulcus پواسطه Crossed دي، دغه وجه د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.

The left phrenic nerve -1

The left pericardiophrenic A/V -2

The pericardium -3

THE CHAMBERS OF THE GERT : زړه څلور جوفه لري چه عبارت دي له:

The right atrium -1

The right ventricle -2

The left atrium -3

The left ventricle -4

THE RIGHT ATRIUM: نوموړي جوف د زړه په بني علوي قسمت كي موقعيت لري او له ټول بدن څخه ناپاكه وينه دي جوف ته د S.V.C او I.V.C له لارو راځي، نوموړي جوف دا ناپاكه وينه د Tricuspid valve له لاري بني بطين ته پمپ كوي. نوموړي جوف د زړه د بني كنار او همدارنگه د علوي كنار د يوي برخي په جوړولو كي برخه اخلي ددي څخه علاوه دا جوف د قلب د Sternocostal surface او د زړه د قاعدي په جوړيدو كي رول لري.

د زړه د بني دهليز خارجي منظره

1- د بني دهليز په پورتنې نهايت كي د S.V.C او په سفلي نهايت كي ئي د I.V.C اخري نهايات قرار لري.


2- ددي دهليز په پورتنې نهايت كي يو ضميموي ساختمان د Auricle په نوم قرار لري.

3- د نوموړي دهليز د بني كنار په امتداد يوه عمودي ميزابه چه د S.V.C څخه تر I.V.C پوري امتداد لري، دغه عمودي ميزابه د بني دهليز په خارجي سطحه كي Sulcus terminalis نومېږي دغه ميزابه د دهليز په داخل كي يوه برامدگي توليدوي چه كرستا ترمينالس نومېږي. ددي ميزابي پورتنې قسمت لرونكي د Sinuatrial (S.A) node دي چه د زړه د Pacemaker په حيث وظيفه اجراء كوي.

4- Right atrioventricular groove د بني دهليز له بني بطين څخه جلا كوي او دا ميزابه په عمودي شكل قرار لري او په دي ميزابه كي Right coronary artery او وړوكي Cardiac vein سير لري.

د بني دهليز داخلي منظره: مخکي مونږ وويل چه د بني دهليز د بني کنار په امتداد يوه طولاني ميزابه قرار لري چه د S.V.C څخه تر I.V.C پوري امتداد لري او وموويل چه ددغي ميزابي د موجوديت په اثر د بني دهليز په داخلي سطحه کي يوه طولاني برامدگي توليد يږي چه Crista terminalis نومېږي. د بني دهليز د داخلي سطحي هغه برخه چه ددي برامدگي په خلف کي قرار لري بنويه (Smooth) دي. دغي برخي ته Sinus venarum هم ويل کيږي او ددي برخي په علوي نهايت کي د S.V.C فوهه او په سفلي نهايت کي ئي د Inferior vena cava فوهه خلاصېږي

د Cronary sinus فوهه د I.V.C د فوهي او د Tricuspid valve ترمينځ موقعيت لري. او ددي فوهاتو څخه علاوه د Venae cardis minimae (واړه وريدونه دي چه د څلور واړو جوفونو په جدارونو کي وجود لري) فوهي په همدې ناحيه کي بني دهليز ته خلاصېږي او د بني دهليز هغه برخه چه د Crista terminalis په قدام کي قرار لري يوه اندازه زيږوالي لري چه دا زيږوالي د عرضاني عضلي برامدگيو له کبله چه Musculi pectinati نومېږي مينځ ته راځي دي برخي ته Pectinate part هم ويل کيږي ددي نه علاوه د بني دهليز او چپ دهليز ترمينځ Septum قرار لري ددي Septum هغه سطحه چه د بني دهليز خواته متوجه ده په خپل سفلي قسمت کي يوه فرورفتگي د Fossa ovalis په نوم لري چه نوموړي Fossa د جنيني حيات د Foramen oval له بقاياؤ څخه دي يعني د Foramen oval له بنديدو وروسته د همدې سوري په عوض نوموړي Fossa مينځ ته راځي.



۵- شکل

THE RIGHT VENTRICLE: بني بطين تقريباً مثلثي شکل لري چه له بني دهليز څخه ناپاکه وينه د Right atrioventricular orifice له لاري ترلاسه کوي او بيا نوموړي وينه ددي جوف پواسطه د Pulmonary trunk له لاري اول Pulmonary arteries او بيا سرپوته پمپ کېږي. بني بطين د قلب سفلي کنار، د قلب د Sternocostal وجهي زيادتره برخه او د قلب د حجاب حاجزي وجهي کمه برخه جوړوي.

د بني بطين خارجي منظره: خارجاً بني بطين دوه وجهي لري چه عبارت دي له قدامي او سفلي وجهو څخه.

د بني بطين داخلي منظره: د بني بطين داخلي منظره په دوه عمده برخو ويشل شوي.

The inflowing part-1: په نوموړي قسمت کي عضلي برامدگي گاني چه د Trabeculae carneae په نوم ياديږي وجود لري ددي عضلي برامدگي گانو موجوديت ددي باعث شوي چه د سي بطين دا برخه يو حه زيروالي بيداکري د س بطين دا برخه دري قسمه عضلي برامدگي گاني لري چه په لاندې ډول دي.

Ridges or fixed elevation (a): نوموړي برامدگي په خپل ټول امتداد کي تثبيت وي.

(b) Bridge: ددي برامدگيو دواړه نهايات تثبيت لاکن مابين برخه ئي ازاده وي.
 (c) Pillars (Papillary muscles): ددغه برامدگي گانو يو نهايت د بطين د جدار په داخلي سطحي نښتي او بل نهايت ئي د Tricuspid valve له کسب سره د Chorda tendinae پواسطه ارتباط لري، په بني بطين کي دري عدده Papillary muscles وجود لري چه عبارت دي له:

* - Ant papillary muscle


* - Post papillary muscle

* - Septal papillary muscle

2-The outflowing part: د بني بطين دا برخه لشمه ده. د بني بطين پورته دواړه برخي يو له بل څخه د يوي عضلي برامدگي پواسطه چه Supraventricular crest نومېږي جدا شوي دي. ددي پورته دواړو ساختمانو څخه علاوه د بني بطين په داخلي سطحه کي دوه سوري هم موجود دي چه عبارت دي له:

(a) Right atrioventricular orifice: د نوموړي سوري شاوخوا د Tricuspid valve پواسطه احاطه شویده.

(b) Pulmonary orifice: د نوموړي سوري شاوخوا د Pulmonary valve پواسطه احاطه کېږي.




۶- شکل

THE LEFT ATRIUM: چپ دهلیز د څلور ضلعي شکل لري چه د بني دهلیز شاته موقعیت لري، ددي جوف ضمیموي ساختمان چه عبارت له چپ Auricle څخه دي قدام خواته امتداد لري او په قدام کي د بني بطین Infundibulum برخه پوښوي. چپ دهلیز د قلب د قاعدي 2/3 چه خوا، د قلب د علوي کنار زیادتره برخه، د قلب د Sternocostal surface او Left surface یوه برخه او همدارنگه د قلب د چپ کنار څه برخه جوړوي. نوموړي جوف اکسیجن لرونکي وینه د څلورو Pulmonary وریدو پواسطه په سپرو څخه ترلاسه کوي او نوموړي جوف بیا دا وینه د Left atrioventricular orifice له لاري چپ بطین ته پمپوي.

1- د چپ دهلیز خلفي سطحه د Sinus pericardium قدامي جدار جوړوي ددي جوف د خلفي سطحې په هر طرف کي دوه Pulmonary وریدونه خلاصیږي.

2- د چپ دهلیز قدامي جدار د Interatrial septum پواسطه جوړ شوي دي.

د چپ دهلیز داخلي منظره: د چپ دهلیز داخلي برخه زیادتره ښویه دي فقط د چپ دهلیز د Auricle په برخه کي Pectinati muscles مشاهده کیدای شي.



۷- شکل

THE LEFT VENTRICLE: چپ بطین اکسیجن لرونکي وینه له چپ دهلیز څخه ترلاسه کوي او بیا دا بطین نوموړي وینه د Aorta خواته پمپ کوي نوموړي جوف د قلب د زروي،


د زړه د سترنو کوتسال سطحې یوې برخې، د چپ کنار او چپي وجهي زیادتره برخې او همدارنگه د زړه د حجاب حاجزي وجهي د 2/3 وحشي برخې په جوړیدو کې رول لري. د چپ بطن داخلي منظره: د چپ بطن داخلي برخه په دوه برخو ویشل شوي چې عبارت دي له:

1- بنکتنې قسمت 2- پورتنې قسمت

بنکتنې قسمت ئې د Trabeculae carneae د موجودیت له کبله یوه اندازه زیږدوالي پیدا کوي د بنې بطن په داخلي برخه کې دوه عدده Papillary muscles وجود لري (قدامي او خلفي) چې دواړه عضلات د Chorda tendinea پواسطه د Mitral valve له کسپو سره ارتباط لري. پورتنې قسمت ئې چې بنوي دي د Aortic vestibule په نوم یادېږي او Ascending aorta له همدې ځایه شروع کېږي. د بنې بطن په سطحه کې دوه سوري لیدل کېږي چې عبارت دي له:

The left atrioventricular (bicuspid or mitral) orifice (a): د نوموړي سوري شاوخوا د میترال د سام پواسطه احاطه شوي دي.

The aortic orifice (b): د دې سوري شاوخوا د Aortic valve پواسطه احاطه کېږي. د یادوني وړده چې د چپ بطن د جدار ضخامت د بنې بطن د جدار د ضخامت په تناسب درې چنده زیات دي د چپ بطن د جدار د ضخامت علت دادي چې په چپ طرف کې Intraventricular blood شپږ چنده د بنې طرف Intraventricular blood pressure په تناسب زیات دي.



۸- شکل

THE VALVES OF THE HEART: د قلب والونه په قلب کي د ويني له معکوس جريان څخه جلوگیری کوي. په قلب کي دوه جوړي والونه وجود لري چه يوه جوړه ئي Atrioventricular valves او بله جوړه ئي د Semilunar valves په نوم يادېږي.

THE ATRIOVENTRICULAR VALVES-I: د دې والونو تعداد دوه داني دي چه عبارت دي له:


- 1- The right atrioventricular valve (Tricuspid valve)
- 2- The left atrioventricular valve (Bicuspid or mitral valve)

هر يو د پورته والونو له دري برخو څخه جوړ شوي دي.

(a) Fibrous ring: نوموړي خلقه د Atrioventricular orifice چارپير قرار لري او په دي پوري Cusps نښتي دي.

(b) The cusps: دا هموار ساختمانونه دي چه دوه کناره او دوه سطحي لري چه د کنارو له جملي څخه ئي يو کنار په فبروز رنگ پوري نښتي او بل کنار ئي ازاد دي، د سطحو له جملي څخه ئي يوه Atrial surface ده کومه چه د دهليز د جوف خواته متوجه ده او دا سطحه بنويه ده د کسب ازاد کنار او Ventricular surface چه د بطين د جوف خواته متوجه ده درشت او غير منظم دي او د دې علت داده چه په دي باندي Chordate tendinae ارتکاز لري.

(c) Chordate tendinae: دا ساختمانونه د Cusps ازاد کنارونه او Ventricular سطحي د Papillary عضلاتو په څوکو پوري مرتبطوي او په دي اساس د Cusps د ازادو کنارونو له Eversion څخه جلوگیری کوي.



9- شکل

THE RIGHT ATRIOVENTRICULAR VALVE: نوموړي Valve د Tricuspid valve په نوم هم يادېږي، دغه Valve لرونکي ددري کسپونو (قدامي، خلفي يا سفلي او Septal) دي.

قدامي کسپ پراخه او سفلي کسپ ټي وړوکي او غيرمنظم دي. دغه پورته دري واړه کسپونه د بني بطين ددري واړو جدارو په مقابل قرار لري.

THE LEFT ATRIOVENTRICULAR VALVE: نوموړي Valve د بايکوسپيد Valve يا ميترال Valve په نوم هم يادېږي، لرونکي ددوه عدده کسپو (قدامي او خلفي) دي. قدامي کسپ ټي چه د Aortic cusp په نوم هم يادېږي د خلفي کسپ په نسبت پراخه او د ميترال او اورتيک فوهو ترمينځ قرار لري. ددي Valve خلفي کسپ د قدامي کسپ په نسبت وړوکي دي.

THE SEMILUNAR VALVE -II: Aortic او Pulmonary والونه د Semilunar valves په نوم يادېږي او دا ځکه چه ددي والو د کسپونو شکلونه نيمه خلفوي شکل لري، دواړه والونه په خپل مينځ کي سره مشابه دي او ساختمان ټي په لاندي ډول سره دي.

1- هر يو ددي والو دري کسپونه لري کوم چه مستقيماً د Aorta او Pulmonary شريانو په جدار پوري نښتي دي، او په دي والو کي فبروز رنگ وجود نلري د هر کسپ ازاد کنار په


وسطي قسمت کي Fibrous nodule لري چه ددي Nodule له دواړو خواو باريکه او ښوي ساختمان د Lunule په نوم د مربوطه کسپ تر قاعدي پوري امتداد لري دا کسپونه د Ventricular diastole په وخت کي د بطيناتو د جوفو په طرف بلجنگ پيدا کوي او نوموړي والونه بندېږي. ددي کسپونو بالمقابل د Aorta او Pulmonary شريانو جدارونه کمه اندازه توسع لري چه ددي شريانو دغه متوسع برخي د Aortic sinus او Pulmonary sinus په نومو يادېږي.

Coronary arteries له قدامي او چپ خلفي اورتيک سينسونو څخه منشاء اخلي يعني ښي کروناري شريان له Ant aortic sinus څخه او چپ کروناري شريان له Left post aortic sinus څخه منشاء اخلي.

د قلبي اوازو د پيدا کيدو ميکانيزم او د سيني د جدار لپاسه د قلب د والونو د اصغاء ناحي

قلب دوه اواز لري چه عبارت دي له لب (Lub) او دپ (Dup) څخه چه د لب اواز يا د قلب اول اواز د Atrioventricular valves له بنديدو او د دپ اواز د Semilunar valves له بنديدو څخه مينځ ته راځي Atrioventricular valves د بطيناتو د تقلص (سيستول) په وخت کي بندېږي او په همدې وخت کي Semilunar valves خلاصېږي او په نتيجه کي د Aorta او Pulmonary trunk له لارو وينه د سږو او د بدن د نورو برخو په طرف جريان پيدا کوي او د بطيناتو داسترخاء (دياستول) په وخت کي Atrioventricular valves خلاصېږي او بالمقابل Semilunar valves بندېږي چه ددي په نتيجه کي ددهليزو څخه وينه د ښي بطين او چپ بطين په طرف جريان پيدا کوي. د پورته دوه اوازو څخه بغير چه بل هر اواز د سيني د جدار لپاسه د قلب د والود اصغاء په نواحيو کي د ستاتسکوپ پواسطه واوريدل شي هغه غير نارمل اواز دي چه د غير نارملو اوازو انواع به انشاء الله په اينده کي ددخلي د مضمون په بحث کي په تفصيل سره وويل شي.

لاندي جدول د هر Valve قطر، Surface marking او Auscultatory area را په گوته کوي.



۱۰- شکلونه

د زړه د کنارونو ارتسام د سيني په جدار


علوي کنار: هغه خط چه چپ طرف دوهمي ضلعي د غضروف له سفلي کنار څخه (د Sternal margin څخه $\frac{1}{2}$ انچ وحشي تر) شروع او د بني طرف دريمي ضلعي د غضروفي برخي تر علوي کنار (د Sternal margin څخه $\frac{1}{2}$ انچ وحشي تر) پوري امتداد مومي د سيني د جدار د پاسه د قلب د علوي کنار مرتسم را په گوته کوي.

سفلي کنار: هغه خط چه د شپږمي ضلعي د غضروف د سفلي کنار څخه (د Sternal margin څخه دوه سانتي متره وحشي تر) شروع او د چپ طرف تر پنځمي بين الضلعي


مساقي (نه ساتتيمتره د Midsternal line څخه وحشي تر) پوري امتداد پيدا کوي د سيني د جدار د پاسه د قلب د سفلي کنار مرتسم را په گوته کوي.

بني کنار: د بني کنار مرتسم د سيني په جدار د هغه خط څخه عبارت دي چه د قلب د علوي کنار د مرتسم له بني نهايت څخه شروع او د سفلي کنار د مرتسم تر بني نهايت پوري امتداد مومي.

چپ کنار: د قلب د چپ کنار مرتسم د سيني د جدار د پاسه د هغه خط څخه عبارت دي چه د علوي کنار د مرتسم له چپ نهايت څخه تر د سفلي کنار د مرتسم تر چپ نهايت پوري امتداد لري. د يادوني وړه چه د قلب د علوي او سفلي کنارو مرتسم خطونه د سيني په جدار مستقيم شکل لري او دوه نورې نسبتاً منحنې شکل لري.



شکل 11-A-11



شکل 11-B-11

THE CONDUCTING SYSTEM OF THE HEART


په نارمل حالاتو کې د یو کاهل شخص قلب په یوه دقیقه کې 70 ضربانه لري په دې معنی چې په نارمل حالاتو کې نارمل قلب په یوه دقیقه کې او یا د فعي تقلص کوي. د قلب د تقلص پروسه له دهلیزونو څخه شروع کیږي یعنې اول دواړه دهلیزه همزمان تقلص کوي او په تعقیب یې همزمان د زړه دواړه بطنات تقلص کوي او دا پروسه په همدې ترتیب د ژوند تر اخره پوري ادامه پیدا کوي، هغه سیستم چې د قلب د تقلصاتو پروسه اداره کوي د Conducting system of the heart په نوم یادېږي.

نوموړي سیستم د لاندې اعضاو څخه تشکیل شوي دي.

- 1 The sinuatrial node (S.A node)
- 2 The atrioventricular node (A.V node)
- 3 The atrioventricular bundle (A.V bundle)
- The right atrioventricular bundle branch (a)
- The left atrioventricular bundle branch (b)

- *- The left ant atrioventricular bundle branch
- *- The left post atrioventricular bundle branch

Cardiac Conduction System



۱۲-شکل

THE SINUATRIAL NODE (S.A Node): دا عقده د قلب د Pacemaker په نوم هم ياديږي د اس د سوم شکل لري چه د Sulcus terminalis په علوي قسمت کي د S.V.C د فوهي په بني طرف کي قرار لري په S.A node کي Cardiac impuls توليد او بيا نوموړي سياله د Ant/Post/Middle internodal tracts له لارو A.V node ته انتقالیږي.

THE ATRIOVENTRICULAR NODE: دا عقده د S.A node څخه وړه ده او د Atrial septum په سفلي خلفي قسمت کي د Coronary sinus د فوهي څخه پورته موقعيت لري کوم وخت چه Cardiac impuls د S.A node څخه A.V node ته ورسېږي له S.A node څخه بيا نوموړي Impuls د A.V bundle ته انتقال مومي.

THE ATRIOVENTRICULAR BUNDLE: نوموړي بندل په حقيقت کي د بطين او دهليز ترمينځ عضلي ارتباط دي. نوموړي بندل له A.V node څخه شروع او د Interventricular septum د Membranous part د خلفي سفلي کنار په امتداد بنسکته سير لري د Interventricular septum د عضلي قسمت په پورتنی برخه کي په دوه شاخو ويشل کیږي چه عبارت دي له بني او چپ شاخونو څخه.


ددې بندل ښي شعبه د Interventricular septum په ښي خوا کې ښکته کېږي او بالاخره د ښي بطن قدامي جدار ته رسېږي او بيا په وړو وړو شاخونو چې د Purkenji fibers په نوم يادېږي تقسيم او د ښي بطن په جدار کې تېټېږي. او ددې بندل چپه شعبه د بين البطني حجاب له سوري کيدو بعد ددې حجاب په چپ طرف کې سیر اختياروي چې بيا دا برانچ په دوه فرعي شعباتو ویشل کېږي چې عبارت دي له:

The left post bundle branch -1

The left ant bundle branch -2

The left post bundle branch: نوموړي شعبه د بين لبطني حجاب په چپ خلفي طرف کې په متعددو وړو شعباتو او The left ant bundle branch د بين البطني حجاب به جب قدامي طرف کې په وړو متعددو اليفو ویشل کېږي چې د چپ بطن په جدار کې انتشار کوي. نوموړي سيستم د اوتونوميک اعصابو تر تاثير لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي چې د پاراسمپاتيک اعصابو تنبه ئي د Cardiac impuls rate کموي او په نتيجه کې برادي کارډيا توليدوي او د سمپاتيک اعصابو تنبه ئي Cardiac impuls rate زياتوي او په نتيجه کې تاکی کارډيا توليدوي.

د قلب اروا: قلب اصلاً د دوه شريانو پواسطه اروا کېږي چې عبارت دي له ښي او چپ کرونري شريانو څخه، دواړه شريانونه ئي له Ascending aorta څخه منشاء اخلي او په Coronary sulcus کې سیر لري.



شکل 13

THE RIGHT CORONARY ARTERY: نوموړي شريان له چپ کروناري شريان څخه وړوکی دي دا شريان له Ant aortic sinus څخه شروع کیږي قدام او بني خواته د Pulmonary trunk او Right auricle تر مينځ سير لري او بيا په Right ant coronary sulcus کې نښکته کیږي او په دې ځای کې د بني دهليز او بني بطین د اروا لپاره شعبي ورکوي د قلب په سفلي کنار کې خلف وچپ خواته خپل سیر ته په Right post coronary sulcus کې ادامه ورکوي تر هغې چه Post interventricular sulcus ته ورسیري او په دې ځای کې د چپ کروناري شريان سره تفم (Anasthomose) کوي.

د Right coronary artery شعبات:

د دې شريان جنبي شعبات په لاندي ډول سره دي.

1- The marginal branch: نوموړي شعبه بني بطين اروا کوي.
 2- The post interventricular branch: دا شعبه دواړو بطيناتو ته شعبي ورکوي.
 د پورته شعباتو څخه علاوه ځني نوري شعبي هم له نوموړي شريان څخه منشاء اخلي چه په لاتدي ډول سره دي.

- The nodal branch (a)
- The right atrial branch (b)
- The infundibular branch (c)
- The terminal branch (d)

THE LEFT CORONARY ARTERY: نوموړي شريان چه د بني کروناري شريان په تناسب پراخه دي له Left post coronary sinus څخه شروع قدام او چپ خواته د Pulmonary trunk او Left auricle ترمينځ سير لري او بيا په دوه شعبو ویشل کيږي چه عبارت دي له:

- 1- The ant interventricular branch
- 2- The circumflex branch

The ant interventricular branch: بنکته د قلب د زروي خواته به
 Ant Interventricular groove کي سير کوي د قلب د زروي برخه کي شاخواته تيريږي ترڅو د چپ کروناري شريان د Post interventricular branch سره تفمّم وکړي.
 Ant interventricular branch د دواړو بطيناتو او بين البطيني حجاب د اروا لپاره شعبات ورکوي. Circumflex branch ئي Left ant atrioventricular groove کي سير کوي د قلب د چپ کنار په برخه کي شاخواته تيريږي او په Left coronary sulcus کي خپل سير ته ادامه ورکوي خلفي بين البطيني ميزابي نژدي دا شريان د چپ کروناري شريان سره تفمّم کوي. Circumflex branch چپ دهليز او چپ بطين ته شعبات ورکوي.

BLOOD SUPPLY OF CONDUCTING SYSTEM

- 1- S.A node د چپ او بني کروناري شريانو پواسطه اروا کيږي.
- 2- A.V node او اتریووينتریکولر بندل د بني کروناري شريان پواسطه اروا کيږي.
- 3- Right terminal branch of atrioventricular bundle: د بني کروناري شريان پواسطه اروا کيږي.
- 4- Left terminal branch of atrioventricular bundle: د سي او چپ کروناري شريانو پواسطه اروا کيږي.

د زړه وريدي تخليه : د قلب وريدي وينه د لاندي وريدو پواسطه په كروناري سينوس

كي راجمع او بيا په بني دهليز كي توئيري.

The great cardiac vein -1

The middle cardiac vein -2

The small cardiac vein -3


The post vein of the left ventricle -4

The oblique vein of left atrium -5

The right marginal vein -6

او همدارنگه د Right cardiac vein او Vena cordis menemi پواسطه مستقيماً په بني

دهليز كي تخليه كيږي.



14- شكلونه

THE CORONARY SINUS: کروناري سينوس په Left post coronary sulcus کي موقعيت لري تقريباً دري سانتي متره اوږدوالي لري او ددي سينوس فوډه د بني دهليز په خلفي جدار کي نوموړي دهليز ته خلاصيري.

د قلب تعصیب: د قلب د تعصیب په خاطر عصبي الياف له Deep cardiac plexus څخه چه د تراخيا د انشعابي محل په قدام او د ابهر د قوس په خلف کي موقعيت لري او د Superficial cardiac plexus څخه چه د ابهر د قوس څخه لاندي موقعيت لري منشاء اخلي دغه پورته دواړه عصبي ضفيري د Sympathetic او Parasympathetic اليافو لرونکي دي چه Sympathetic اعصاب ئي د نخاع د Sympathetic جذعوله رقبې او علوي صدري سگمنتو څخه او Parasympathetic عصبي الياف ئي د واگوس اعصابو (بني او چپ) څخه منشاء اخلي. د Sympathetic اعصابو تنبه د قلب تنبهات زياتوي او همدارنگه د کروناري شريانو د توسع سبب کيږي د قلب د تنبهاتو د زياتوالي په نتيجه کي د قلب ضربان زياتيږي او برعکس د Parasympathetic عصبي اليافو تنبه د قلب تنبهات کموي او په نتيجه کي د قلب ضربان کميږي.

د قلب لمفاوي تخليه: د قلب لمفاوي اوغي د کروناري شريانو سره يوځاي سیر لري او دوه (بني او چپ) لمفاوي جذعي جوړوي بني لمفاوي جذع خپل لمف په Brachiocephalic لمفاوي عقداتو کي او چپه لمفاوي جذع خپل لمف په Trachiobronchial لمفاوي عقداتو کي چه د تراخيا په انشعابي محل کي قرار لري تخليه کوي.


دوهم فصل

شريانونه

شريانونه عبارت له هغه تيوبونو څخه دي چه وينه د زړه څخه د بدن ټولو انساجو ته انتقالوي. د شريانونو د جدار ضخامت د وريدونو په نسبت چه وينه له انساجو څخه زړه ته رانقلوي زيات او موقعيت يي د وريدونو په نسبت د بدن په انساجو کي عميق دي د بدن غټ شريانونه عبارت دي له:

The pulmonary trunk -I

The aorta -II



۱۵ شکل

THE PULMONARY TRUNK: پلموناري ترنک چه تقريباً پنځه سانتي متره اوږدوالي او دري سانتي متره قطر لري د Pericardium پواسطه پوښل شوي او په وسطي ميدياستينوم کي موقعيت لري. دا شريان د زړه د بني بطين له علوي نهايت څخه شروع پورته، شاته او چپ طرف ته سير لري دا بهر د قوس د مقعریت په برخه کي په دوه شعبو ويشل کيږي پلموناري ترنک دا بهر قوس له مقعري برخي سره د يوليگامنت پواسطه ارتباط لري چه د Lig arteriosum په نوم ياديږي.

د PULMONARY TRUNK ارتباطات

- 1- په قدام کي: قدامي قسمت ئي د دوهمي بين الضلعي مسافي له Sternal end څخه د پلورا، چپ سږي او Pericardium پواسطه جدا کيږي او خلفي قسمت ئي د Ascending aorta چپ کروناري شريان او چپ دهليز سره ارتباط لري.
- 2- په خلف کي: نوموړي شريان په خلف کي د تراخيا د تشعب ناحي لمفاوي عقداتو او عصبي اليافو سره ارتباط لري.
- 3- په علوي کي: د Superficial cardiac plexus سره ارتباط لري.
- 4- په دواړو خواو کي: نوموړي شرياني جذع په دواړو خواو کي د Auricles او کروناري شريانو سره ارتباط لري.

د **PULMONARY TRUNK** شعبات: لکه چه وموويل نوموړي شرياني جذع دا بهر د قوس د مقعريت په برخه کي په دوه شعبو ويشل کيږي دا شعبات چه په وسطي ميدياستينوم کي موقعيت لري عبارت دي له:

The right pulmonary artery -1

The left pulmonary artery -2

بني پلموناري شريان د پلموناري ترنک څخه شروع بني طرف ته د Ascending aorta او S.V.C شاته د بني سږي په طرف ځي تر هغي چه د بني سږي د هيلوس له لاري بني سږي ته داخل شي د دي شريان طول او پراخوالي د چپ پلموناري شريان په نسبت لږ زيات دي او همدارنگه چپ پلموناري شريان د پلموناري جذع څخه شروع چپ طرف ته د Descending aorta په قدام کي د چپ سږي په طرف ځي تر هغي چه د چپ سږي د هيلوس له لاري چپ سږي ته ور داخل شي هر يو د دي شريانو د مربو سږي په داخل کي په متعددو شعباتو ويشل کيږي .

THE AORTA: نوموړي شريان چه د بدن ټولو برخو ته اکسيجنيتيد وينه له چپ بطين څخه انتقالوي دري عمده برخي لري چه عبارت دي له:

The ascending aorta -1

The arch of aorta -2

The descending aorta -3

THE ASCENDING AORTA: نوموړي شريان چه تقريباً پنځه ساتي متره اوږدوالي لري په وسطي ميدياستينوم کي موقعيت لري او د چپ بطين له علوي نهايت څخه شروع پورته، قدام او بني خواته تر Aortic arch پوري امتداد لري. دا بهر دغه برخه چه د pericardium پواسطه پوښل شوي قاعده ئي په قدام، چپ خلفي او بني خلفي قسمتو کي يوه اندازه توسع لري چه د Aortic sinuses په نومو ياديږي.

د ASCENDING AORTA ارتباطات:

1- په قدام کي: نوموړي شريان په قدام کي د سترنوم هډوکي د جسم خلفي وجهي، چپ سږي او پلورا، د بني بطين د Infundibulum برخي، د Pulmonary trunk بيخ او Right auricle سره ارتباط لري.

2- په خلف کي: په خلف کي نوموړي شريان د Transvers sinus of pericardium، چپ دهليز، بني پلموناري شريان او بني برانکس سره ارتباط لري.

3- په بني خواکي: په بني خواکي دا شريان د S.V.C او بني دهليز سره ارتباط لري.

4- په چپ خواکي: نوموړي شريان په چپ علوي قسمت کي د Pulmonary trunk او په چپ سفلي قسمت کي د چپ دهليز سره ارتباط لري.

د ASCENDING AORTA شعبات: ددي شريان شعبات په لاندې ډول سره دي.

1- The right coronary artery: دا شريان د Ascending aorta له Ant aortic sinus څخه منشاء اخلي.

2- The left coronary artery: دا شريان د Ascending aorta له چپ خلفي اورتيک سينوس څخه منشاء اخلي.

چون پورته دواړه شريانونه د قلب د اروا په برخه کي په تفصيل سره تشریح شوي دي نو دوباره تشریح ته ئي ضرورت نشته.

THE AORTIC ARCH: دا بهر قوس په علوي ميدياستينوم کي د Manubrium sterni د نيمائي سفلي قسمت شاته موقعيت لري دا بهر دا برخه د Ascending aorta په امتداد د بني طرف دوهم Sternocostal joint د علوي کنار له شا څخه شروع پورته، شاته او چپ طرف ته د تراخيا په قدام کي سير لري او بيا د تراخيا په چپه خوا کي ښکته خپل سير ته ادامه ورکوي د Sternal angle برابر په Descending aorta ادامه مومي يعني تر Sternal angle پوري Aortic arch امتداد لري.

د Aortic arch ارتباطات:

1- په قدام او چپ طرف کي:

a- له مخي څخه شاته د چپ فرينیک عصب - د چپ واگوس عصب له سفلي رقبې قلبي شعبي او د چپ Sympathetic chain له علوي قلبي رقبې شعبي سره ارتباط لري.

b- د چپ فرينیک عصب څخه لاندي او د چپ واگوس عصب لپاسه د Sup intercostals vein سره ارتباط لري.

c- چپ پلورا او سږي.

d- د Thymus غدي يوه برخه.

2- په چپ او بني طرف کي

a- تراخيا، Deep cardiac plexus او Trachibronchial لمفاوي عقدات.

b- مري.

c- Left recurrent laryngeal nerve

d- Thoracic duct

e- ستون فقرات

3- په علوي کي:

a- Brachiocephalic art

b- Left common carotid art

c- Left subclavian art

4- په سفلي کي:

a- د پلموناري ترنک انشعابي محل

b- چپ پرانکس.

–c Lig arteriosum د Superficial cardiac plexus سره.

–d Recurrent laryngeal nerve

AORTIC ARCH شعبات: د Aortic arch شعبات په لاندې ډول سره دي.

The brachiocephalic art -1

The left common carotid art -2

The left subclavian art -3

THE BRACHIOCEPHALIC ARTERY: نوموړې شریان چه تقریباً 4-5 سانتي متره اوږدوالي لري د اورتيک اړچ له محدب قسمت څخه شروع او د تراخيا په قدام کي پورته او بيا د ترخيا په بني خواکي سیر اختیاري کوم وخت چه د بني طرف Sternoclavicular joint خلفي برخي ته ورسیري په دوه شعبو ویشل کیږي چه نوموړي شعبات ئي عبارت دي له:

The right common carotid art -1

The right subclavian art -2

BRACHIOCEPHALIC ARTERY ارتباطات

1- په قدام کي: نوموړي شریان په قدام کي د لاندې ساختمانو سره مجاورت لري.

(a) Sternohyoid او Sternothyroid عضلاتو منشاء.

(b) Right inf. thyroid vein او Left brachiocephalic vein.

(c) Thymus غدي یوه برخه.

2- په خلف کي:

(a) په خلفي علوي قسمت کي د بني پلورا سره ارتباط لري.

(b) په خلفي سفلي قسمت کي د تراخيا سره ارتباط لري.

3- په بني خواکي:

(a) Right brachiocephalic vein

(b) S.V.C علوي قسمت.

(c) پلورا

4- په چپ خواکي:

Origin of the left common carotid art (a)

Thymic gland (b)

Inf. thyroid veins (c)

Trachea (d)

د **BRACHIOCEPHALIC ARTERY** شعبات: لکه چه دمخه مووويل Brachiocephalic شريان د بني Sternoclavicular joint په خلفي برخه کي په دوه شعبو ويشل کيږي چه دا شعبات عبارت دي له Right common carotid art او Right subclavian artery څخه.

THE COMMON CAROTID ARTERIES: دغه شريانونه چه د غاړي په بني او چپ خواکي قرار لري د سر او غاړي د اروا مسئوليت په غاړه لري. د بني طرف شريان ئي د Brachiocephalic artery څخه منشاء اخلي او د تايريد غضروف د علوي کنار برابر ساحي پوري د غاړي په بني خواکي پورته او شاته سير لري دا شريان صرف د Cervical part لرونکي دي. د چپ طرف شريان ئي د Aortic arch له محدب قسمت څخه شروع او د تايريد غضروف د علوي کنار برابر ساحي پوري د غاړي په چپ خواکي پورته او شاته سير لري چون دا شريان د بني Common carotid art برعکس مستقيماً د Aortic arch له محدب قسمت څخه منشاء اخلي او Aortic arch په علوي ميدياستينوم کي موقعيت لري نو په همدې وجه دا شريان دوه عمده برخي لري چه عبارت دي له Thoracic part او Cervical part څخه.

د شريان Thoracic part دا بهر د قوس له محدبيت څخه د چپ سټرونوکلاويکولار بند تر خلفي سطحي پوري امتداد لري او ددي څخه بعد ددي شريان دوهمه برخه چه عبارت له Cervical part څخه دي شروع او د تايريد غضروف تر علوي کنار پوري امتداد لري. د هر يو Common carotid شريان اخري نهايت لږ څه توسع لري چه دغه متوسع برخه ئي د Carotid sinus په نوم ياديږي. هر يو ددي شريانو په خپل ټول سير کي د Internal jugular vein او Vagus nerve سره يوځاي د Carotid sheath پواسطه پوښل شوي دي.

د **COMMON CAROTID ARTERIES** ارتباطات

1- د Cervical part ارتباطات: د بني او چپ Common carotid شريانو د رقبې برخو ارتباطات سره يوشان دي او په لاندې ډول سره دي.

(A) په قدام کي: د هريو Common carotid شريانو له مخي نه د کريکويډ غضروف برابر د Omohyoid عضلي Intermediat tendon تيريږي. ددي وترنه لاندې هريو ددي شريانو له سطحي څخه عميق ته د پوستکي، د غاړې سطحي صفاق، پلاتسما عضلي، د غاړې د عميق صفاق د Investing layer، د Sternocleidomastoid عضلي انسي کنار، Sternohyoid او Sternothyroid عضلاتو پواسطه پوښل شوي دي.

د Omohyoid عضلي له Intermediat tendon نه پورته هريو ددي شريانو نسبتاً سطحي سير لري او له سطحي نه عمق ته د پوستکي، د غاړې سطحي صفاق، پلاتسما عضلي، د غاړې د عميق صفاق د Investing layer او د Sternocleidomastoid عضلي د انسي کنار پواسطه پوښل شوي دي. د يادوني وړه چه ددي شريانو له جملې د هريو شريان له قدام نه په مايل ډول د انسي نه وحشي خواته د Sup. thyroid art يوه شعبه چه د Sternocleidomastoid branch په نوم ياديږي سير لري.

(B) په خلف کي :

(a) د څلورو بنکتنیو رقبې فقراتو Transvers process

(b) Longus coli او Longus capitis عضلات

(c) د Scalineus ant عضلي منشاء

(d) Symphathetic trunk او Ascending cervical art د مربوطه Common carotid شريان او د رقبې فقراتو د قدامي قسمت عضلاتو ترمنځ قرار لري.

(e) د شپږمي رقبې فقري څخه لاندې هريو ددي شريانو د Thoracic duct په چپ خواکي او د Vertebral vessels، Inf. thyroid، Subclavian art او Symphathetic trunk په قدام کي چه د Scalineus ant او Longus coli عضلاتو ترمنځ کومه زاويه جوړيږي په هغه کي قرار نيسي فلهدا په دي ځاي کي د پورته ساختمانو سره مجاورت لري.

(C) په انسي کي: هريو ددي شريانو په انسي کي د حنجري، بلعوم، مري، تراخيا، Inf Recurrent laryngeal nerve، thyroid art او د تايرايډ غدي له مربوطه Lobe سره ارتباط لري.

(D) په وحشي کي: په وحشي کي د Internal jugular vein او واگوس عصب سره ارتباط لري.

2-د Thoracic part ارتباطات: چون یواځې چپ طرف Common carotied شریان د Thoracic part لرونکي دي نو مونږ هم د چپ طرف شریان ارتباطات تر بحث لاندې نیسو.

(A) په قدام کي

(a) ستړنوتايراید او ستړنوهايوئید عضلات

(b) د چپ سږي او پلورا قدامي قسمتونه.

(c) چپ Brachiocephalic ورېد او Thymic غده.

(B) په خلف کي

(a) تراخیا

(b) Left subclavian art

(c) د مري چپه خوا

(d) Left recurrent laryngeal nerve

(e) Thoracic duct

(C) په ښي خواکي: په سفلي کي د Brachiocephalic جذعي او په علوي کي د تراخیا، Inf. thyroid veins او Thymic gland سره ارتباط لري.

(D) په چپ خواکي: د چپ واگوس، چپ فرینیک اعصابو او همدارنگه د چپ سږي او پلورا سره ارتباط لري.

د COMMON CAROTIED ARTERY شعبات: هر یو د Common carotied شریانو د تایرید غضروف د علوي کنار په برخه کي په دوه شعبو ویشل کیږي چه عبارت دي له External carotied artery او Internal carotied artery څخه.

External carotied artery: THE EXTERNAL CAROTIED ARTERY چه د سر خارجي قسمت، مخ او د غاړي زیادتره برخه اروا کوي د Common carotied شریان د نهائي شعباتو له جملې څخه یوه شعبه ده چه د تایرید غضروف برابر ساحي څخه شروع او د غاړي په جنبي قسمت کي د غاړي په Carotied triangle کي اول قدام او بیا خلفي وحشي خواته میلان پیدا کوي. او بالاخره د تمپورال هډوکي د Mastoid proc د څوکي او د Mandibular angle شاته په دوه شعبو ویشل کیږي چه عبارت دي له Superficial temporal art او Maxillary art څخه.

د EXTERNAL CAROTIED ARTERY ارتباطات

1- قدامي وحشي ارتباطات : ددي شريان په شروع يا هغه برخه چه دا شريان ورڅخه منشاء اخلي په هغي باندي د Sternocleidomastoid عضله راوښتي ده چه له همدې کبله نسبتاً عميق او د جس وړندي او له دې پورته دا شريان تقريباً سطحي سير لري چه د پوستکي - د غاړې سطحي صفاق - د وجهي عصب رقبې شعبه، Transvers cutaneus nerve او د غاړې د عميقه صفاق د Investing layer پواسطه پوښل شوي دي. ددي شريانو له مخي څخه Hypoglossal nerve ، Facial او Lingual وريدونه، د ډايگاسټريک عضلي خلفي برخه او سټيلو هايويډ عضله تيريږي د Parotid gland په برخه کي ددي شريان له مخي څخه وجهي عصب تيريږي Internal jugular vein اول د شريان په وحشي خوا او بيا په خلف کي موقعيت اشغالوي.

2- په انسي کي: نوموړي شريان په انسي کي د لاندي ساختمانو سره ارتباط لري

(a) د بلعوم جدار

Styloid proc (b)

Internal carotied art (c)

(d) د سټيلو فارينجيوس عضله، گلوسوفارينجيال عصب او د واگوس عصب فارينجيال

شعبه د External carotied او Internal carotied شريانو ترمنځ سير لري.

EXTERNAL CAROTIED ARTERY شعبات: ددي شريان شعبات په لاندي ډول سره دي.

Sup. thyroid art -1

Ascending pharyngeal art -2

Lingual art -3



Facial art -4

Occipital art -5

Post. auricular art -6

Superficial temporal art -7

Maxillary art -8



۱۶- شکلونه

THE SUPERIOR THYROID ARTERY: نوموړي شريان د External carotied شريان له قدامي سفلي قسمت څخه شروع او ښکته د غاړې په جنبي قسمت کې د Ext laryngeal nerve سره موازي د Omohyoid ، ستړنو هايوئيد او ستړنو تايرايډ عضلانو لاندې سیر لري تر هغې چې د تايرايډ غدې د وحشي لوب پورتنې سرحد ته وه رسيږي. ددې شريان ارتباط د Ext laryngeal nerve سره د جراحي له نظره د اهميت وړېدي يعنې کوم وخت چې جراح د جاغور عمليات کوي نو په دې بايد وپوهيږي چې په علوي کې دا شريان او عصب سره ډير نژدې لکن په سفلي کې سره يوه اندازه لري شوي نو جراح بايد کوشش وکړي چې نوموړي شريان غدي ته نژدې غوټه کړي.

SUPERIOR THYROID ARTERY شعبات: نوموړي شريان په خپل سیر کې لاندې شعبات ورکوي.

- 1- Sternocleidomastoid art: دغه شريان خپله هم نام عضله ارواء کوي.
 - 2- Sup. laryngeal art: د Internal laryngeal nerve سره يوځای تايرايډ ممبران سوري کوي او حنجره ارواء کوي.
 - 3- Cricothyroid art: د مقابل طرف هم نام شريان سره د Cricovocal lig په قدام کې تفم کوي.
 - 4- انفراهايوئيد ارتري: يوه وړه شعبه ده چې د هايوئيد هډوکي د جسم په سفلي کنار کې د تايروهايوئيد عضلي لاندې سیر لري او د مقابل طرف هم نام شريان سره تفم کوي.
- THE ASCENDING PHARYNGEAL ARTERY**: نوموړي شريان د Ext. carotied art انسي قسمت نه سفلي نهايت ته نژدې شروع او عموداً پورته د بلعوم د جنبي جدار او Int. carotied art ترمنځ د قحف تر قاعدې پورې امتداد لري په اخر کې دا شريان د Facial art د Ascendig platin branch سره تفم کوي. د نوموړي شريان څخه ددې شريان په سیر کې لاندې شعبات منشاء اخلي.
- 1- Pharyngeal arteries: دغه شريانونه چې تعداد ئې درې يا څلور وټه رسيږي واړه شريانونه دي چې د بلعوم جنبي جدار او همدارنگه تانسلونو ارواء کوي.
 - 2- Inf. tempanic art: نوموړي شريان د وسطي غوږ انسي جدار او Auditory tube ارواء کوي.

3- Meningeal arteries : واره شریانونه دي چه Craneal cavity ته د Lacerum foramen ، جوگولار فورامين او Hypoglossal canal له لارو داخل Duramater او له دي سره همجوار هډوکي ارواء کوي او همدارنگه له کومو لارو چه دا شریانونه Craneal cavity ته داخلېږي ددوي په مسیر کي چه کوم اعصاب د پورتنیو سوریو له لاري راوړي د هغوي ارواء او د هغوي چارپیر چه کوم نسج قرار لري د هغوي د ارواء مسولیت په غاړه لري.

THE LINGUAL ARTERY : دا شریان د Ext. carotid art د هغه برخي څخه چه هائیوئید هډوکي د غټ شاخ د څوکي برابر قرار لري منشاء اخلي ددي شریان سیر ئي په دري برخو ویشلي دي. د شریان اوله برخه په Carotid triangle کي قرار لري او دا برخه په دي مثلث کي یوه حلقه چه انحنی ئي پورته خواته قرار لري جوړوي او ددي حلقی له مخي څخه د Hypoglossal nerve تیرېږي ددي شریان نوموړي حلقه د هائیوئید هډوکي ته اجازه ورکوي چه ازادانه حرکت وکړي یعنې ددي هډوکي په پورته کیدو یا بنکته کیدو ددي شریان دا برخه نه متضرره کیږي. د شریان دوهمه برخه Hyoglosseus عضلي لاندې د هائیوئید هډوکي د علوي کنار برابر قرار نیسي. د شریان دریمه برخه چه د Deep lingual art په نوم یادېږي د Hyoglosseus عضلي په امتداد پورته او بیا مخي خواته د ژبي په لاندیني سطحه کي سیر لري چه بالاخره د ژبي په څوکه کي د مقابل طرف شریان سره تفمّم کوي.

LINGUAL ARTERY شعبات : ددي شریان جنبي شعبات په لاندې ډول سره دي.

1- سپراهایوئید ارتري : دا یو وړوکی شریان دي چه د هائیوئید هډوکي د پورتنی کنار په امتداد سیر لري تر هغې چه د مقابل طرف له هم نام شریان سره تفمّم وکړي.

2- Dorsal lingual arteries : ددي شریانو تعداد دوه یا دري داني وي چه د هایوگلو سوس عضلي په انسي قسمت کي د Lingual art څخه منشاء اخلي او د Lingual dorsum خلفي قسمت ته پورته کیږي تر څو ددي برخي مخاطي غشاء Platoglossal arch ، تانسِل ، سافت پلیټ او اپیگلوتس عضله ارواء کړي او بالاخره د مقابل طرف له هم نامو شریانو سره تفمّم کوي.

3- Sublingual art : نوموړي شریان د Lingual art څخه د Hyoglosseus عضلي د قدامي کنار په برخه کي شروع او بیا قدام خواته د Genioglosseus او Mylohyoid

عضلاتو ترمنځ Sublingual غدي ته ورځي چه نوموړي غده، Mylohyoid عضله او د خولي د مخاطي غشاء يوه برخه ارواء کوي.

THE FACIAL ARTERY: دا شريان د Ext. carotid art له هغې برخې څخه چه د هايپوئيد هډوکي د غټ شاخ د څوکي نه لږ پورته قرار لري منشاء اخلي وروسته له منشاء څخه د Digastric عضلي د Post. belly او Stylohyoid عضلاتو لاندې پورته سير لري کوم وخت چه د Submandibular غدي خلفي کنار ته ورسېږي خپل سير ته تغير ورکوي او ددې غدي او د مانديبولاهډوکي سفلي کنار ته په رسيدو د يو چنگک په شکل د مانديبولاسفلي کنار احاطه او د Masster عضلي په قدامي قسمت کې قرار نيسي له دې بعد نوموړي شريان د پلاتسما او Resorius عضلاتو لاندې د Oral angle په طرف ځي د Oral angle څخه پورته دا شريان د Zygomatic عضلاتو او Levator labi superior عضلي لاندې پورته سير لري او بالاخره د پوزي د خنګ په امتداد د سترګې د اجفانو د انسي زاوي په طرف سير لري او د سترګې دا جفانو په انسي زاويه کې د Ophthalmic شريان له اخري شعبي سره تفم کوي که ددې شريان سير ته ملتفت شوو به گورو چه دا شريان دوه عمده برخې لري چه عبارت دي له رقبې او وجهي برخو څخه.

د FACIAL ARTERY شعبات

1- Cervical part شعبات: د وجهي شريان ددې برخې شعبات په لاندې ډول سره دي.
Ascending palatin artery (a): دا شريان د وجهي شريان له هغې برخې چه ددې شريان (Facial art) د منشاء ځاي ته نژدې قرار لري شروع کېږي وروسته د منشاء څخه دا شريان د Styloglosseus او ستيلوفارينجيوس عضلاتو ترمنځ پورته د بلعوم د جدار په طرف پورته کېږي او بيا د بلعوم د Sup. constrictor او Middle constrictor عضلاتو ترمنځ د قحف تر قاعدي پوري سير لري بيا دا شريان په دوه شعبو ويشل کېږي يوه شعبه ئې د بلعوم د Sup. costicctor عضلي لپاسه تيرېږي چه دا شعبه سافټ پليټ ارواء کوي او د بالمقابل خپل هم نام شريان او Maxillary art له Greater palatin branch سره تفم کوي بله شعبه ئې د بلعوم د Sup. constrector عضله سوري کوي او مربوطه تانسېل، Pharyngiotympannic tube او د ژبي قاعده ارواء کېږي او په اخر کې د Ascending pharyngeal artery سره يوځاي کېږي.

(b) Tonsilar artery : دا شريان د Facial art د Ascending palatin شعبي څخه منشاء اخلي.

(c) Glandular arteries : ددي شريانو تعداد دري يا څلور عددوته رسيږي د وجهي شريان څخه منشاء اخلي او تحت الفكي غده او له دي غدي سره نژدي لمفاوي عقدات، عضلات او پوستکي ارواء کوي.

(d) Submental artery : نوموړي شريان د Facial art د رقبې قسمت اوږده شعبه ده چه وروسته له منشاء څخه قدام خواته د مانديبولاهډوکي د جسم د سفلي کنار په امتداد سير لري د زني په برخه کي دا شريان پورته په مانديبولاخليل سیر ته تغير ورکوي او په دوه شعبو (سطحي او عميق) ويشل کيږي کوم چه د Inf. labial او Mental شريانو سره تفمم کوي. نوموړي شريان لاندیني شونډه او زنه ارواء کوي.

2- د Facial part شعبات :

(a) Inf labial art : دا شعبه د Facial art څخه Oral angle ته نژدي منشاء اخلي مخي خواته د Depressor anguli oris عضلي لاندی سير لري او بيا Orbicularis oris عضله سوري کوي او په معوج ډول د لاندیني شونډي په کنار کي د عضلي او مخاطي غشاء ترمنځ سير لري.

دا شريان Inf. labial glands ، مخاطي غشاء او ورسره همجوار عضلات ارواء کوي او د مقابل طرف له هم نام شريان او د Inf. alvolar art له Mental branch سره تفمم کوي. (a) Sup. labial art : دا شريان په علوي کي عیناً لکه Inf. labial art غوندي سير لري، نوموړي شريان پورتنی شونډه او د Nasal septum قدامي قسمت ارواء کوي او په اخر کي له خپل هم نام شريان سره تفمم کوي.

(b) Lat. nasal art : دا شريان د Facial art اخري شعبه ده چه د پوزي په څنگ کي پورته سير لري د پوزي Ala nasi او د پوزي Dorsum برخه ارواء کوي په اخر کي دا شريان د مقابل طرف له خپل هم نام شريان، د Sup. labial art له Septal او Alar شعباتو، د Ophthalmic شريان له Dorsal nasal branch او د Maxillary art له Infraorbital branch سره تفمم کوي.

THE OCCIPITAL ARTERY : نوموړي شريان د Ext. carotied art له خلفي قسمت (د Facial art د منشاء بالمقابل خوا) څخه شروع شاته، پورته د ډايگاسټريک عضلي د

Post. belly لاندې سیر لري دا شریان په خپل سیر کې د Int. jugular ، Inf. carotied art ، واگوس او Asscesory اعصابو له مخې تیرېږي د اطلس فقري په Transvers proc او تمپورال هډوکي د ماستوئید پروسس ترمنځ تیرېږي او بالاخره د Rectus capitis lat عضلي وحشي کنارته له رسیدو بعد د تمپورال هډوکي په Occipital sulcus کې د Mastoid proc او د Sternocliedomstoid ، سپلینوس کاپیتس، لانگیسموس کاپیتس او ډایگاسټریک عضلاتو د ارتکازي محل په انسي کې د Rectus capitis lat ، Obliques capitis sup او Semispinalis capitis عضلاتو لپاسه قرار نیسي بالاخره دا شریان پورته خپل سیرته ادامه ورکوي ترڅو د تراپیزیوس او سټرنوکلویډو ماستوئید عضلاتو ارتکازي محل سوري او د سر د صفاق لاندې په زیاتو شعباتو ویشل کیږي.

OCCIPITAL ARTERY شعبات : ددې شریان شعبات په لاندې ډول سره دي.

1- Sternocliedomastoid branches : ددې شریانو تعداد دوه دانې دي چې یو ئې پورته او بل ئې لاندې قرار لري دواړه شریانونه د Sternocliedomastoid عضلي د ارواء وظیفه په غاړه لري ددې شریان د شعباتو له جملې سفلي شعبه ئې د Sup. thyroid art سره تفمّم کوي.

2- Mastoid branch : دا ددې شریان یوه وړوکی شعبه ده چې د Maastoid formen له لاري Craneal cavity ته داخل Mastoid air cells او Duramater ارواء کوي.

3- Stylomastoid branch

4- Auricular branch : د شریان دغه شعبه د Auricle انسي قسمت ارواء کوي او د Post. auricular artery سره تفمّم کوي.

5- عضلي شعبات : دا شعبات د ډایگاسټریک، سټیلوها یوئید، Longus capitis او له دي سره نور هم جوار عضلات ارواء کوي.

6- Descending branch : دغه شریان وروسته د منشاء څخه په دوه شعبو (سطحي او عمیق) ویشل کیږي سطحي شعبه ئې د Splineus عضلي لاندې سیر لري او د Transvers cervical art له سطحي شعبي سره تفمّم کوي عمیقه شعبه ئې د Semispinalis capitis او Semespinalis cervicis عضلاتو ترمنځ بنکته کیږي او د Vertebal او Deep cervical شریانو سره تفمّم کوي.

7- Meningeal branches : دا شریانونه د Jugular foramen او Condylar canal له لارو Craneal cavity ته داخل او داخل او Post cranial fossa ، Duramater او Caudal craneal اعصاب ارواء کوي.

8- Occipital branches : دا شریانونه د Occipitofrontal عضلي د Occipital belly د سر د پوستکي ترمنځ سیر لري او بالاخره د مقابل طرف له هم نامو شریانو، Post. auricular او تمپورال شریانو سره تفم کوي او د Occipitofrontal عضلي Occipital belly ، پوستکي او Pericranium ارواء کوي.

THE POST AURICULAR ARTERY : دا شریان د Ext. carotid art له خلفي قسمت څخه (د ایگاستریک عضلي د خلفي قسمت نه لږ پورته) شروع پورته او شاته د Parotid gland او Styloid proc ترمنځ هغې میزابي ته چه د Auricular cartilage او Mastoid proc ترمنځ قرار لري پورته کیږي او په Auricular او Occipital شعباتو ویشل کیږي. د POST AURICULAR ARTERY شعبات : د دې شریان شعبات په لاندې ډول سره دي.

1- Stylomastoid branch : دا شریان د Post. auricular art د تشعب ناحي لاندې او د منشأ له ناحي پورته قسمت څخه منشأ اخلي له منشأ نه بعد Stylomastoid foramen ته داخل او متوسط غوږ، Mastoid antrum ، Mastoid air cells ، Semicircular canals او Facial nerve ارواء کوي.

2- Auricular branch : دا شعبه د Post. auricular عضلي لاندې پورته خواته سیر لري او د Auricle د Craneal aspect لپاسه په متعددو شعبو ویشل کیږي چه د Auricle د Craneal aspect د ارواء مسولیت په غاړه لري.

3- Occipital branch : دا شعبه د Mastoid proc د پاسه پوستکي، د Occipitofrontal عضلي Frontal belly او د دې عضلي د همدې قسمت په سرپوستکي او د غوږ د شا پوستکي ارواء کوي او په اخر کي د Occipital art سره تفم کوي.

THE SUPERFICIAL TEMPORAL ARTERY : دا شریان د Ext. carotid art له نهائي شعباتو څخه یوه شعبه ده چه د Parotid gland په برخه کي د مانډیولا هډوکي د غاړي شاته د Ext. carotid art څخه منشأ اخلي دا شریان وروسته د منشأ څخه عموداً پورته سیر لري د تمپورال هډوکي د Zygomatic proc د بیخ له مخي تیریږي او په دې ځای کي دا شریان سطحي سیر لري چه د جس وړ دي او په ډیره اساني سره جس کیدای شي له

Zygomatic proc څخه پنځه سانتي متره پورته دا شريان په دوه شعبو ويشل کيږي چه عبارت دي له قدامي (Frontal branch) او خلفي (Parital branch) شعباتو څخه کوم چه د تمپورال او Scalp ناحي او همدارنگه Auricle ، Parotied gland او Facial muscle ارواء کوي. ددي شريان قدامي شعبه په اخر کي د Ophthalmic شريان له Supraorbital او Supratrochlear شعباتو سره تفم کوي د پورته دوه شعبو څخه علاوه ددي شريان په سير کي ددي شريان څخه لاندي شعبات هم منشاء اخلي.

1- Transvers facial art: دا شريان وروسته د منشاء نه په وړو شعباتو تقسيميږي چه د نوموړي شريان واړه شعبات پاروتيد گلاند ، پاروتيد ډکته ، Masseter muscle او پوستکي ارواء کوي او په اخر کي د Facial ، Buccal ، Lacrimal ، Infraorbital شريانو سره تفم کوي.

2- Middle temporal art : دا شريان په Temporal fossa کي سير لري او د تمپورالس عضله ارواء کوي او په اخر کي د Maxillary art له Deep temporal branch سره تفم کوي.

3- Ant. auricular branches : دا واړه شعبات دي چه د Auricle قدامي قسمت، د غوږ نرمي او Ext. auditory meatus ارواء کوي.

THE MAXILLARY ARTERY : څرنگه چه دمخه مو وويل چه په پاروتيد گلاند کي د مانديبولاهو کي د غاړي شاته Ext. carotied art په دوه نهائي شعبو ويشل کيږي چه يو له نهائي شعباتو څخه ئي Maxillary art دي دا شريان وروسته د منشاء څخه د مانديبولاهو د غاړي په انسي کي مخي خواته يا قدام خواته سير لري ترهغي چه د Lat pterygoid عضلي سفلي کنار ته ورسيري بيا دا شريان پورته او قدام خواته خپل سير بدلوي چه بالاخره د Pterygomaaxillary fissure له لاري Ptergopalatin fossa ته داخل او هلته په متعددو شعباتو ويشل کيږي.

د MAXILLARY ARTERY شعبات

1- Post. Sup. alveolar art : نوموړي شريان Maxillary air sinus ، مولار او پريمولار غاښونه ارواء کوي.

2- Infraorbital art : دا شريان په وړو متعددو شعباتو ويشل کيږي چه Orbital branche ئي د Orbit د جوف ساختمانونه ارواء کوي، Ant. Sup. alveolar branches

Maxilla د سوريو له لاري انسيسور او کابين غاښونو ته ورځي او هغوي ارواء کوي او همدارنگه دا شريان د Lcrimal sac ، پوزي او پورتنې شونډي د ارواء لپاره هم شعبات ورکوي.

3- Greater palatin art : دا شريان د Greater palatin عصب سره يوځاي د Greater palatin canal له لاري Hard palate ته رسېږي او د Hard palate مخاطي غشاء او وري ارواء کوي.

4- Pharyngeal branch : دا شعبه د انفي بلعوم يوه برخه ، Auditory tube او Sphinoid air cells ارواء کوي.

5- Sphinopalatin art : دا شريان د Sphinopalatin foramen له لاري د پوزي جوف ته ځي او د پوزي د جوف مخاطي غشاء او Paranasal sinuses ارواء کوي.

6 – Art of the pterygoid canal : دا شريان په خپل هم نومي کانال کي سیر لري او د Auditory tube او د Tympanic cvity په ارواء کي کمک کوي.

THE INTERNAL CAROTID ARTERY : د Common carotid art د نهائي شعباتو څخه يوه شعبه ده چه د تايرايډ غضروف د علوي کنار برابر شروع او د دماغ تر قاعدي پوري امتداد لري دا شريان د دماغ ، سترگي او همدارنگه د دماغ چارپير هډوکو او سحاي د اروا مسوليت په غاړه لري. دا شريان نظر ددي شريان وسير ته په څلورو برخو ويشل شوي.

1- Cervical part

2- Petrous part

3- Cavernous part

4- Cerebral part

THE CERVICAL PART : د شريان دا برخه عموداً په غاړه کي د تايرايډ غضروف له علوي کنار څخه د قحف تر قاعدي پوري امتداد لري د شريان دا قسمت کاملاً د Internal jugular vein او واگوس عصب سره يوځاي د Carotid sheath پواسطه پوښل شوي دي. د شريان لډي برخي هيڅ فرعي شعبه نه جدا کېږي.

ارتباطات

1- په قدام کي

(A) په Carotied triangle کي.

(a) د Stenocleidomastoid عضلي قدامي کنار

Hypoglossal nerve (b)

Occipital art (c)

Common facial and lingual veins (d)

Ext. carotied art (e)

(B) له Carotied triangle څخه پورته.

Post. belly of digastric muscle (a)

Stylohyoid muscle (b)

Post. auricular artery (c)

Stylopharyngeus muscle (d)

Styloid proc (e)

Parotid gland (f)

Glossopharyngeal nerve (g)

(h) د Auditory tube غضروفي قسمت.

2- په خلف کي

Longus capitis muscle (a)

Prevertebral fascia (b)

Sup. cervical ganglion (c)

Sup. laryngeal nerve (d)

Pharyngeal vein (e)

Vagus nerve (f)

(g) گلو سوفارينجیال، Accessory او Hypoglossal اعصاب د قحف د قاعدې په برخه

کي ورسره ارتباط لري.

3- په انسي کي

(a) بلعوم

Ascending pharyngeal art (b)

Ext./Int. laryngeal nerves (c)

4- په وحشي کي

Int. jugular vein (a)

(b) Auditory tube هډوکینه برخه.

Tympanic palate (c)

Temporomandibular joint (d)

THE PETROUS PART : د شریان دا برخه د تمپورال هډوکي د Petrous part په Carotid canal کې پورته او بیا قدامي انسي خواته په یوه قایمه زاویه خپل سیر ته تغیر ورکوي بیا د Foramen lacerum په خلفي جدار کې علوي انسي خواته خپل سیر اختیاري.

ارتباطات : نوموړي شریان په پاروتید کانال کې د وریدي ضفيري او Sympathetic plexus پواسطه احاطه شوي دي دا شریان په علوي کې د Trigeminal ganglion سره، په قدامي وحشي کې د Auditory tube او Tensor tympanic muscle سره او په خلفي علوي برخه کې د متوسط غوږ او Cochlea سره ارتباط لري. د شریان جنبي شعبات:

- 1- Corticotympanic branches : دا شعبات متوسط غوږ ته داخل او د غوږ ددې برخې له اروا کولو بعد د قدامي او خلفي تمپورال شریانو سره تفم کوي.
- 2- Pterygoid branch : دا شعبه Pterygoid canal ته داخل او د Greater palatin art سره تفم کوي.

THE CAVERNOSE PART : د شریان دا برخه په Cavernose sinus کې قرار لري او د اندوتیلیوم پواسطه پوښل شوي ده ددې برخې فرعي شعبات عبارت دي له:

- 1- Cavernose branches : دا شعبات Trigeminal ganglion اروا کوي.
- 2- Hypophysal branches : دوه (علوي او سفلي) شعبي دي چه د نخامیه غدي د اروا مسولیت په غاړه لري.

THE CEREBRAL PART : د شریان دا برخه د Cavernose sinus څخه تیر او د دماغ په قاعده کې قرار نیسي یعنی د Internal carotid شریان هغه برخه چه د Cavernose sinus او د دماغ د قاعدې یا سفلي وجهي ترمینځ قرار لري د Cerebral part په نوم یادېږي او لاندې شعبات ورکوي.

1- Ophthalmic art

2- Ant. cerebral art

3- Middle cerebral art

Post. communicating art -4

Ant. choroidal art -5

ددي پورته شريانو له جملې صرف Ophthalmic شريان د Orbital fossa مربوطه
ساختمانونه اروا کوي نور ټول ئي د دماغ په اروا کي رول لري.

د دماغ اروا BLOOD SUPPLY OF THE BRAIN

د دماغ اروا د دوه عددده Int. carotied شريانو او دوه عددده Vertebral شريانو پواسطه
صورت نيسي چه دغه څلور شريانونه د دماغ په سفلي وجه کي سره تفمّم کوي او يوه حلقه
د Circle arteriosum په نوم جوړوي مخکي له دي چه دا حلقه تشریح کړو بڼه به داوي چه
اول Basilar art چه د دوه عددده Vertebral arteries له يوځاي کيدو مينځ ته راځي او
ددي پورته شرياني حلقې په جوړيدو کي رول لري وپيژنو.

THE BASILAR ARTERY : نوموړي شريان د دوه عددده Vertebral شريانو له يوځاي کيدو
څخه چه هر يو ددي شريانو د مربوطه Subclavian art څخه منشاء اخلي جوړيږي.
Basilar art په هغه ميزابه کي چه د Pons په قدامي سطحه قرار لري پورته سير لري او د
Pons په علوي کنار کي په دوه شعبو ويشل کيږي چه د Post. cerebral arteries په نوم
ياديږي ددي دوه شعبو څخه علاوه ددي شريان څخه لاندي شريانونه هم منشاء اخلي.

Sup. cerebral art -1

Pontin arteries -2 : په هر طرف کي دري عددده دي او Pons اروا کوي.


Laberinthin art -3 : په هر طرف کي يو يو عدد دي چه داخلي غوږ اروا کوي.

Ant. Inf. cerebelar art -4 : په هر طرف کي يو يو عدد دي چه د Cerebellum د اروا
مسوليت په غاړه لري.

THE CIRCLE OF WILLIS : دغه شرياني حلقه چه د دماغ په قاعده کي قرار لري په لاندي
ډول جوړيږي.

Basilar art دوه شعبي چه عبارت له Post. cerebral arteries څخه دي د بني او چپ
طرف Int. carotied شريان د Post. communicating شعباتو سره تفمّم کوي او
همدارنگه د بني او چپ طرف د Int. carotied شريانو Ant. cerebral شعبات د Ant.



communicating art پواسطه يو د بل سره ارتباط پيدا کوي چه په نتيجه کي نوموړي شرياني حلقه چه د دماغ د اروا مسوليت په غاړه لري تکميلېږي.




۱۷- شکل

THE SUBCLAVIAN ARTERY: نوموړي شريان د علوي طرف يو اساسي شريان دي چه قسماً د غاړي او همدارنگه د دماغ د اروا مسوليت په غاړه لري. د دې شريان منشاء په بني اوچپ خواکي سره فرق لري په دي معني چه په بني خواکي دا شريان د Sternoclavicular

joint په خلفي برخه کې د Brachiocephalic art څخه منشاء اخلي او په چپه خوا کې دا شریان د Manubrium sterni د خلفي سطحي په وسطي برخه کې د Left common carotid art په وحشي خوا کې د Aortic arch څخه منشاء اخلي له منشاء څخه بعد د Left sternoclavicular joint د خلفي سطحي برابر د غاړې خواته پورته کېږي چه د غاړې په برخه کې د دواړو شریانو سیر یو رنگ دي یعنې هر یو د دې شریانو د یو مقوس خط په شکل د Sternoclavicular joint نه وحشي خواته د اولي ضلعي تریروني څنډې پورې د Scalinous ant عضلي شاته سیر لري د دې نه بعد دا شریان په Axillary art ادامه پیدا کوي چون د سکالینیوس انتیریور عضله د شریان له مخې نه تیریږي په همدې وجه دا شریان په درې برخو ویشي چه د شریان اوله برخه د دې عضلي په انسي خوا کې، دوهمه برخه ئې د عضلي په خلف او دریمه برخه ئې د عضلي په وحشي خوا کې قرار نیسي.



18-A شکلونه



شکل 18-B-18

ارتباطات

I- د شریان د اولي برخي ارتباطات

1- په قدام کي:

Immediat relations (A): له انسي خڅه وحشي خواته په لاندي ډول سره دي.

Common carotied art (a)

Ansa subclavia (b)

- Cardiac branches of vagus and sympathetic trunk (c)
- Vagus nerve (d)
- Vertebral vein (e)
- Internal jugular vein (f)
- Left phrenic nerve (g)
- Thoracic duct (h) (يوآزي په چپ خواکي)
- Superficial relations (B)
- The sternothyroid and sternohyoid muscles (a)
- Ant. jugular vein (b)
- Sternocleidomastoid muscle (c)
- 2- په خلف کي: د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.
- Supraplural membrane (a)
- Apex of lung (b)
- Right recurrent laryngeal nerve (c)
- Ansa subclavia (d)
- II- د دوهمي برخي ارتباطات:
- 1- په قدام کي:
- Scalenus ant (A)
- (B) هغه ساختمانونه چه د سکالينيوس انتيريور عضلي په قدام کي قرار لري. او دا ساختمانونه په لاندې ډول سره دي.
- Right phrenic nerve (a)
- Transvers cervical art (b)
- Suprascapular art (c)
- Subclavian vein (d)
- Ant. jugular vein (e)
- Sternocleidomastoid muscle (f)
- 2- په خلف کي: په خلف کي د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.
- Supraplural membrane (a)
- Cervical plura (b)
- Apex of the lung (c)
- 3- په علوي کي: په علوي کي د Upper and middle trunk of the brachial plexus سره ارتباط لري.
- III- د دريمي برخي ارتباطات
- 1- په قدام کي

- Suprascapular vessels (a)
- Nerve to subclavius muscle (b)
- Prevertebral fascia (c)
- Subclavian vein (d)
- Ext. jugular vein (e)
- Ant. jugular vein (f)
- Transvers cervical vein (g)
- Investing fascia (h)
- Subclavius muscle (i)
- د کلاویکولا ډیوکي دریمه وسطي برخه. (j)

Post. border of sternocleidomastoid muscle (k)
 2- په خلف کي: په خلف کي د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.

- Scalenus medius muscle (a)
- Lower trunk of brachial plexus (b)
- Suprascapular membrane (c)
- Cervical plexus (d)
- Apex of lung (e)
- 3- په علوي کي: په علوي کي د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.

- Upper and middle trunk of brachial plexus (a)
- Inf. belly of omohyoid muscle (b)

SUBCLAVIAN ARTERY د شریان عمده شعبات په لاندې ډول سره دي.

- Vertebral art -1
- Internal thoracic art -2
- Thyrocervical trunk -3
- Inf. thyroid art (a)
- Suprascapular art (b)
- Superficial cervical art (c)
- Costocervical trunk -4
- Sup. intercostal art (a)
- Deep cervical art (b)
- Dorsal scapular art -5

Vertebral artery: دا شعبه د Subclavian art له اوږدو شعباتو څخه یوه شعبه ده چه د Subclavian art د اولي برخي څخه منشاء اخلي. دا شریان د دماغ، سڅایا، Spinal cord

او د دماغ چارپير هډوکي او عضلات اروا کوي. دا شريان ئي نظر د دي شريان سیر ته په څلورو برخو ویشلي دي.

1- First part of vertebral art: د شريان دا برخه د Subclavian art د منشاء له ځايه تر د شپږمي رقبي فقري تر Transvers proc پوري امتداد لري.

2- Second part of vertebral art: د شريان دا برخه د پورتنیو شپږو رقبي فقرو په Foramen transversarium کي سیر لري د شپږمي رقبي فقري څخه Axis فقري پوري عمودي سیر لري او د Axis فقري څخه د اطلس تر Foramen transversarium پوري پورته او وحشي خواته تمایل پیدا کوي.

3- Third part of vertebral art: د شريان دا برخه له هغه قسمت څخه شروع کیږي چه کوم وخت دا شريان د اطلس فقري د Foramen transversarium له سوري څخه ووزي چه له دي بعد دا شريان د اطلس د فقري د Lat. mass په خلفي قسمت کي انسي خواته د همدې فقري تر خلفي قوس پوري او له دي ځايه د Post. atlantooccipital membrane سفلي کنار پوري امتداد مومي.

4- Fourth part of vertebral art: د شريان دا برخه د Post. atlantooccipital membrane د سفلي کنار له لاري Vertebral canal ته داخل د دوراماتر او اراکنوئید له سوريکیدو بعد د فورامين ماگنوم له لاري کرانیل کاويټي ته داخل او د حدبي (Pons) تر سفلي کنار پوري امتداد مومي د حدبي په سفلي کنار کي د مقابل طرف شريان سره یوځای کیږي او په نتیجه کي Basilar art جوړوي.

د VERTEBRAL ARTERY شعبات:

I- Cervical branches

1- Spinal branches: دا شریانونه Vertebral canal ته د Intervertebral foramen له لاري داخل Spinal cord، سحابا او فقرات اروا کوي.

2- Muscular branches: دا شعبات د Suboccipital عضلاتو د اروا مسولیت په غاړه لري.

II- Craneal branches

1- Meningeal branches: دا شعبات فورامين ماگنوم ته نژدي له Vertebral art څخه منشاء اخلي او د Post. cranial fossa مربوطه سحابا او هډوکي اروا کوي.

2-Ant. spinal art: دا شريان هغه ځاي ته نژدې په کوم کي چه نوموړي شريان د مقابل جانب شريان سره يوځاي کيږي منشاء اخلي وروسته له منشاء د دواړو طرفو شريانونه سره يوځاي کيږي او يو واحد Ant. spinal art جوړوي کوم چه د نخاع په قدام کي بنکته کيږي او د نخاع 2/3 قدامي قسمت اروا کوي او همدارنگه دا شريان د Medula oblongata په اروا کي هم رول لري.

3-Post. Inf. cerebellar art: دا شريان چه د Vertebral art يوه اوږده شعبه ده د ميدولا خلفي وحشي قسمت، د حدي بنکتنې قسمت او Cerebellum اروا کوي. ددي نه علاوه دا شريان يوه شعبه د Post. spinal art په نوم ورکوي چه د نخاع 1/3 خلفي قسمت اروا کوي.


4-Medullary arteries: دا شريانونه د Medula oblongata د اروا مسؤليت په غاړه لري.

THE INTERNAL THORACIC ARTERY: دا شريان د Subclavian art د اول قسمت له سفلي برخي د Thyrocervical trunk د منشاء بالمقابل ساحي څخه شروع د اولي ضلعي د غضروفي برخي نه پورته دا شريان بنکته، قدام او انسي خواته د اولي ضلعي د غضروفي برخي نه لاندي تر شپږمي بين الضلعي مسافي پوري عموداً بنکته کيږي او په شپږمه بين الضلعي مسافه کي دا شريان په دوه شعبو ويشل کيږي چه عبارت دي له Sup. epigastric art او Musculophrenic شريان څخه.

Sup. epigastric art د اوومي ضلعي د غضروف شاته بنکته سير لري او د رکتوس شپټ د دواړو پوښو ترمينځ نوموړي شپټ ته داخل د رکتوس ابدومين عضله اروا او په اخر کي د Inf. epigastric art سر تفمم کوي. ددي شريان Musculophrenic شعبه بنکته او وحشي ته د اوومي، اتمي او نهمي ضلعي د غضروفي برخو شاته بنکته سير لري نوموړي شريان په خپل سير کي دوه قدامي بين الضلعي شعبات د اوومي او اتمي بين الضلعي مسافو لپاره ورکوي او بالاخره ددي شريان اخري نهايت د نهمي ضلعي غضروفي برخي ته نژدې حجاب حاجز سوري کوي او د حجاب حجاب حاجز په لانديني سطحه کي چه کوم شريانونه دي د هغوي سره تفمم کوي. د پورته دوه شعباتو څخه علاوه نوموړي شريان په خپل سير کي لاندي شعبات هم ورکوي.

1-Pericardiophrenic art

- 2-Mediastinal arteries : دا شریانونه چه د Thymus غده، د پیریکارډ قدامي برخه او په میدیاستینوم کې چه کوم شحم قرار لري هغه اروا کوي.
- 3-Perforating branches : دا شعبات په بنځو کې په دوهمي، دریمي او څلورمې بین الضلعي مسافو کې یوه اندازه پراخه دي او د Breast د اروا مسؤلیت په غاړه لري.
- 4- قدامي بین الضلعي شریانونه : د هر یو پورتنیو شپږو بین الضلعي مسافو لپاره یعنې د هري بین الضلعي مسافي لپاره دوه شریانونه ورکوي.
- نوت: قدامي بین الضلعي شریانونه د خلفي بین الضلعي شریانو سره د Costochondral مفاصلو په برخو کې تفمّم کوي.



۱۹- شکل

THYROCERVICAL TRUNK : نوموړي شرياني جذع د Subclavian art د اول قسمت څخه (د Scalineus ant عضلي انسي کنار ته نژدې) شروع او بيا په دري شعبو ويشل کېږي چه عبارت دي له :

1- Inf. thyroid art : د تايرايډ او پاراتايرايډ غذاواتو په اروا کي رول لري.

2- Suprascapular art : نوموړي شريان د سکاږولا، کلاويکولا هډوکو او همدارنگه د اکروميو کلاويکولار او اوږي بندونو په اروا کي رول لري.

3- Superficial cervical art : نوموړي شريان تراپيزيوس عضله او لډي سره همجواري عضلي، د غاړي لمفاوي عقدات اروا کوي او په اخر کي د Occipital art له Descending branch سره تفمّم کوي. 22- شکل

COSTOCERVICAL TRUNK : نوموړي شرياني جذع په بني خواکي د سبکلاويان ارتري دوهيمې برخي له خلفي قسمت څخه او په چپه خواکي د Subclavian art د اولي برخي له خلفي قسمت څخه منشاء اخلي هر يو ددي جذعو د Cervical plura لپاسه، شاته د يو قوس په شکل سير لري او د اولي ضلعي د غاړي په برخه کي په دوه شعبو ويشل کيږي چه عبارت دي له Sup. intercostal art او Deep cervical art څخه.

Sup. intercostal art د اولي ضلعي د غاړي په قدام کي بنسخته کيږي چه بيا په اول او دوهم Post. intercostal شريانو ويشل کيږي. Deep cervical art د اوومي رقبې فقري د Transvers proc او د اولي ضلعي د غاړي په مابين کي شاته تير او بيا د Semispinalis capitis او Semispinalis cervicis عضلاتو تر مينځ پورته تر Axis فقري پوري سير لري او بالاخره د Occipital او Vertebral شريانو سره تفمّم کوي.


DORSAL SCAPULAR ARTERY : نوموړي شريان د Subclavian art له دريمي برخي څخه نشئت کوي خلف او وحشي خواته د Brachial plexus په مينځ کي د Scalinous medius عضلي له مخي او بيا د Levator scapula عضلي لاندې تير او د سکاږولا هډوکي علوي زاوي ته له رسيدو بعد د Dorsal scapular nerve سره يوځاي د Rhomboid عضلاتو لاندې د Scapula د انسي کنار په امتداد بنسخته د سکاږولا هډوکي تر سفلي زاوي پوري امتداد لري او په اخر کي د Suprascapular، subscapular او د ځني خلفي بين الضلعي شريانو د خلفي شعباتو سره تفمّم کوي.

نوموړي شريان د Rhomboide عضلاتو، Latismus dorsi او Trapezius عضلاتو په اروا کي رول لري.

THE AXILLARY ARTERY : نوموړي شريان د Subclavian art په امتداد قرار لري چه د اولي ضلعي له بيروني څنډي څخه شروع او د Teres major عضلي تر سفلي

کنار پوري امتداد لري چه لږي بعد نوموړي شريان د براخيال ارتري په شکل امتداد پیدا کوي. د Pectoralis minor عضله ددي شريان له مخي څخه تیريږي او د سکاپولا هډوکي په کوراکوئید پروسس ارتکاز کوي چه د نوموړي عضلي تیریدل ددي شريان له مخي نوموړي شريان په دري برخو ویشي.

First part of axillary art: د شريان دا برخه د اولي ضلعي د بیروني څنډي څخه د Pectoralis minor عضلي تر علوي کنار پوري امتداد لري.



۲۰- شکل

ارتباطات

A- په قدام کي

(a) پوستکي

Superficial fascia, Platysma muscle and supraclavicular nerve (b)

Deep fascia (c)

Clavicular part of pectoralis major muscle (d)

Clavipectoral fascia with cephalic vein (e)

Lat. pectoral nerve and thoracoacromial vessels (f)

B- په خلف کي

Post. cord of brachial plexus (a)

Subscapular muscle (b)

C- په وحشي کي

Lat. cord of brachial plexus (a)

Coracobrachialis muscle (b)

D- په انسي کي

Med. cord of brachial plexus (a)

Axillary vein (b)

Med. pectoral nerve (c)

II- د Axillary art دوهمه برخه : د شريان دا برخه د پيکتورالس مينور عضلي شاته قرار

لري.

A- په قدام کي

(a) پوستکي

(b) سطحي او عميق صفاقونه

(c) پيکتورالس ماجوراوپيکتورالس مينور عضلات

(B) په خلف کي

Post. cord of brachial plexus (a)

Subscapular muscle (b)

(C) په وحشي کي

Lat. cord of brachial plexus (a)

Coracobrachialis muscle (b)

(D) په انسي کي

Med. cord of brachial plexus (a)

Med. pectoral nerve (b)

Axillary nerve (c)

Axillary art د دريمه برخه

د شريان دا برخه د پيکتورالس مينور عضلي لاندې قرار لري (Pectoralis minor)

عضلي له سفلي کنار نه د Teres major عضلي سفلي کنار پوري

ارتباطات

(A) په قدام کي: په قدام کي د شريان دا برخه د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.

The skine (a)

The superficial fascia (b)

The deep fascia (c)

(B) په خلف کي: په خلف کي د شريان دا برخه د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.

In the upper part (1)

Axillary nerve (a)

Radial nerve (b)

Subscapular muscle (c)

In the lower part (2)

Tendons of latismus dorsi & teres major muscles (a)

(C) په وحشي کي: په وحشي کي د شريان دا برخه د لاندې ساختمانو سره ارتباط لري.

In the upper part (1)

Coracobrachialis muscle-a

Musculocutaneous nerve -b

Lat root of median nerve-c

In the lower part (2)

Trank of median nerve-a

(D) په انسي کي د شريان دا برخه د Axillary vein سره ارتباط لري او علاوه له دي د

Medial cutaneous nerve of the formarm سره چه د Axillary vein او اکزيلاري

ارترې ترمينځ سير لري او د Medial cutaneous nerve of arm سره چه د اکزيلاري وين په

انسي کي قرار لري هم ارتباط لري.

BRANCHES OF AXILLARY ARTERY : له Axillary art څخه شپږ شعبات منشاء اخلي

چه ددي شپږو شعباتو له جملې څخه ئي يوه شعبه د شريان له اولي برخې، دوه شعبي د شريان له دوهمې برخې او درې شعبي د شريان له دريمې برخې څخه منشاء اخلي.

Branch from the first part -I

1- Sup thoracic art : نوموړي شريان Pectoral muscles اروا کوي.

Branches from the second part -II

2- The acromiothoracic art : نوموړي شريان چه د Axillary art له دوهمې برخې څخه

منشاء اخلي د پيکتورالس مينور عضلي د پورتنۍ کنار له تيريدو بعد Claviopectoral fascia سوري کوي او په څلورو شعبو ويشل کيږي.

(a) Pectoral branch : دا شعبه د Pectoral عضلاتو په مابين کي بنکته ځي د Pectoral عضلاتو او ثديه (Breast) په اروا کي رول لري په اخر کي دا شعبه د Lat, thoracic art او Int. thoracic art د Intercostal شعباتو سره تفم کوي.

(b) Acromial branch : د شريان دا شعبه د Coracoid proc له مخي تير او بيا د Deltoid عضلي له مابين نه تير او اخري نهايت ئي د Scapula هډوکي Acromion پوري رسيږي چه په دي برخه کي دا شعبه بيا د Thoracoacromial شريان له Deltoid branch او له Post. circumflex humeral art سره تفم کوي.

(c) Clavicular branch : د شريان دا شعبه د Subclavius عضلي او د Sternoclavicular joint په اروا کي رول لري.

(d) Deltoid branch : د شريان دا شعبه د Pectoralis major او Deltoid عضلاتو په اروا کي رول لري.

3- Lateral thoracic art : دا شريان د Pectoralis minor عضلي د بنکتنۍ کنار په امتداد بنکته سير لري د Pectoral عضلاتو په اروا او همدارنگه د Breast په اروا کي رول لري.

Branches of the 3rd part -III

4- Sub scapular art : د شريان دا شعبه د Latissimus dorsi او Seratus ant عضلاتو په اروا کي رول لري.


5-Ant. circumflex humeral art: دا د Axillary art وره شعبه ده چه د عضد هډوکي په غاړه د يوي حلقي په شکل دورخوري او د Post. circumflex humeral art سره تفمم کوي چه ددي دواړو شريانو د تفمم په نتيجه کي د عضد د غاړي په برخه کي يوه شرياني حلقه جوړيږي دا شريان د اوږي د بند په اروا کي رول لري.

6-Post circumflex humeral art: دا شريان د يوي حلقي په شکل د عضد هډوکي په غاړه دور خوري او د انتيريور ټرکمپلکس هوميورال ارتري سره تفمم کوي د Deltoid او Triceps عضلاتو او د اوږي د بند په اروا کي رول لري

Brachial artery: **THE BRACHIAL ARTERY** د Axillary art په امتداد قرار لري چه د Teres major عضلي له سفلي کنار نه شروع د بازو په قدامي قسمت کي ښکته او وحشي خواته د Elbow joint د قدامي قسمت تر هغه ځايه پوري چه د Radial neck برابر قرار لري امتداد مومي لډي بعد دا شريان په دوه شعبو ويشل کيږي چه عبارت دي له Radial art او Ulnar art څخه.

ارتباطات

- (A) په قدام کي: د بازو په علوي برخه کي نوموړي شريان د Bicipital apponeurosis او Median cubital vein پواسطه پوښل شويده.
- (B) په خلف کي: په خلف کي دا شريان د لاندي ساختمانو سره ارتباط لري.
- Triceps muscle (a)
- (b) د Coracobrachial عضلي ارتکازي محل.
- Brachialis muscle (c)
- Radial nerve (d)
- (C) په انسي کي: په پورتنی قسمت کي د Ulnar nerve او Basilic vein سره او په سفلي قسمت کي د Median nerve سره ارتباط لري.
- (D) په وحشي کي: په پورتنی قسمت کي د Biceps brachii ، Coracobrachialis عضلاتو او Median nerve سره او په سفلي کي د Biceps عضلي وتر سره ارتباط لري.



۲۱- شکل

BRANCHES OF BRACHIAL ARTERY: ددي شريان شعبات په لاندې ډول سره دي.

Muscular branches -a: د بازو د قدامي علوي قسمت ساختمانونه اروا کوي.

The profound brachial artery -b: د براخیال ارتري د شروع ځای ته نژدې له براخیال ارتري څخه منشاء اخلي او د Radial nerve سره یوځای بنکته سیر لري.

The sup. ulnar collateral branch -c: دا شریان د بازو په وسطي قسمت کې د Brachial art څخه منشاء اخلي او د Ulnar nerve سره یوځای بنکته سیر لري.

Nutrient artery -d: د شریان دغه شعبه د عضد هډوکي خواته ورځي او ددي هډوکي په اروا کې رول لوبوي.

-e The inf. ulnar collateral branch : نوموړي شريان د Brachial art له سفلي قسمت

څخه شروع کېږي.

-f Radial artery

-g Ulnar artery

THE RADIAL ARTERY: دا شريان د Brachial art د نهائي شعباتو څخه يوه شعبه ده چه

Cubital fossa کې د Radial neck برابر د Brachial art څخه شروع ښکته او وحشي خواته د ساعد په قدامي قسمت کې سیر لري.

ارتباطات

(A) په قدام کې: د شريان په پورتنی قسمت کې د Brachioradialis عضله په شريان را اوښتي ده معني دا چه د ساعد په پورتنی برخه کې دا شريان د نوموړي عضلي لاندې قرار لري لکن د ساعد په نیمایي سفلي قسمت کې نوموړي شريان صرف د پوستکي او صفاق پواسطه پټ شوي دي.

(B) په خلف کې: لاندې ساختمانونه د راډيال شريان لاندې د ساعد په قدامي قسمت کې قرار لري.

Tendon of biceps muscle (a)

Supinator muscle (b)

Insertion of pronator teres muscle (c)

Radial origin of flexor digitorum superficialis muscle (d)

Radial origin of flexor pollicis longus muscle (e)

Pronator quadratus muscle (f)

Lower end of radius (g)

(C) په انسي کې: په 1/3 علوي انسي کې د Pronator teres عضلي او په 2/3 سفلي انسي

کې د Flexor carpi radialis عضلي له وتر سره ارتباط لري.

(D) په وحشي کې: د براخيوراډياليس عضلي سره سرترسره او په 1/3 وسطي برخه کې د راډيال عصب سره ارتباط لري.

د ساعد په برخه کې د Radial artery شعبات: په ساعد کې د راډيال شريان شعبات په لاندې ډول سره دي.

-1 Muscular branches : نوموړي شعبات د دې شريان همجوار عضلات اروا کوي.

2- Radial recurrent branch : نوموړي شعبة د څنگلي د بند چارپير شرياني انستوموز کي برخه اخلي.

3- Palmar carpal branch : نوموړي شعبة د Wrist joint چارپير شرياني انستوموز کي برخه اخلي.

4- Superficial palmar branch : نوموړي شعبة د Superficial palmar arch په تکميليدو کي رول لري.

THE ULNAR ARTERY: دا شريان د براخيال ارتري د نهائي شعباتو له جملې څخه يوه شعبة ده چه په Cubital fossa کي د Radial neck برابر د Brachial art څخه منشاء اخلي او د ساعد د قدامي قسمت په 1/3 علوي برخه کي بنځته او انسي خواته او په 2/3 سفلي برخه کي عموداً بنځته سير لري، نوموړي شريان د Flexor retinaculum له مخي نه بنځته د لاس د ورغوي خواته سير لري چه د لاس په برخه کي ددي شريان سير به انشاء الله وروسته تشرېح شي.

ارتباطات

1- ددي شريان نيمائي علوي برخه عميق سير لري او د لاندي ساختمانو پواسطه پوښل شوي.

The pronator teres muscle (a)

The flexor carpi radialis muscle (b)

The palmaris longus muscle (c)

The flexor digitorum superficialis muscle (d)

The flexor carpi ulnaris muscle (e)

2- د شريان نيمائي سفلي برخه سطحي سير لري او پوستکي، صفاق او د Palmar cutaneus branch of ulnar nerve پواسطه پوښل شوي دي.


(B) په خلف کي: د شريان په شروع کي نوموړي شريان د Brachial عضلي لپاسه او نور بنځته د Flexor digitorum profundus عضلي لپاسه قرار لري.

(C) په انسي کي: په انسي کي نوموړي شريان د Ulnar nerve او Flexor carpi ulnaris عضلي سره ارتباط لري.

(D) په وحشي کي: په وحشي کي دا شريان د Flexor digitorum superficialis عضلي سره ارتباط لري.



په ساعد کي د اولنار ارتري شعبات

- 1-Muscular branches: ددي شريان سره چه کوم همجوار عضلات قرار لري د هغوي په ارواء کي رول لري.
 - 2-The ant./post. ulnar recurrent arteries: نوموړي شريانونه د څنگلي د بند چارپير شرياني تفمم کي برخه اخلي.
 - 3-The palmar/dorsal carpal branches: نوموړي شريانونه د Wrist joint چارپير شرياني تفمم کي برخه اخلي.
 - 4-The common interosseus branch: نوموړي شريان په Cubital fossa کي د Ulnar artery نه منشاء اخلي او ډير ژر په دوه شعبو باندي ويشل کيږي چه عبارت دي له:
 - Ant interosseus branch (a)
 - Post interosseus branch (b)
- THE ULNAR ARTERY IN THE HAND**: اولنار ارتري د لاس د ورغوي خواته د فلکسور ريتينا کولوم له مخي د لاس ورغوي ته تير او د لاس په ورغوي کي په دوه شعبو ويشل کيږي چه عبارت دي له:
- 1-Superficial palmar branch
 - 2-Deep palmar branch
- پورتني دواړه شعبات په ترتيب سره د Superficial palmar arch او Deep palmar arch په جوړيدو کي برخه اخلي.



۲۲- شکل

THE SUPERFICIAL PALMAR ARCH: نوموړي شرياني قوس د راډيال او اولنار شريانو له تفمّم نه مينځ ته راځي په دې ډول چه د Flexor retinaculum له مخي نه Ulnar art راساً د لاس د ورغوي خواته بنسټه كيږي او په وحشي خواكي د Radial art د لاندي شعباتو له جملې له يوي شعبي سره تفمّم کوي او شرياني قوس تکميلېږي.
Principis pollicis-c Radialis indicis-b Superficial palmar branch-a



۲۳- شکلونه

BRANCHES OF SUPERFICIAL PALMAR ARCH: له نوموړي شرياني قوس څخه

څلور Digital braches منشاء اخلي کوم چه دري نيمې انسي گوتي اروا کوي.
دري وحشي Digital branches د همدې گوتو د مربوطه Palmar metacarpal شريانو
پواسطه سره ارتباط لري.

RADIAL ARTERY IN THE HAND: کوم وخت چه Radial art د لاس بند يا Wrist joint

ته ورسپري د لاس د بند په وحشي خواکي د Abductor pollicis longus او Ext. pollicis brevis عضلاتو تر اوتارو لاندي د لاس د ورسال سطحې ته ځان رسوي د لاس
Dorsal surface ته په رسيدو نوموړي شريان د Ext. pollicis longus عضلي وتر لاندي
بنکته کيږي تر هغه چه د اولي Dorsal interosseus عضلي

د دواړو سرونو ترمينځ ساحي ته ورسپري په دې ځاي کي نوموړي شريان قدام خواته خپل
سير بدلوي تر هغي چه د لاس ورغوي ته داخل شي د لاس په ورغوي کي د Adductor pollicis عضلي د Oblique head او Transvers head ترمينځ انسي خواته کيږي او د
Deep palmar arch په نوم امتداد پيدا کوي.

په لاس کي د راډيال ارتري شعبات

(A) د لاس په ظهري وجه کي د Radial art نه لاندي شعبات منشاء اخلي.
The first dorsal metacarpal art (a): نوموړي شريان د Pollex او د Index گوتي
اروا کوي.

Dorsal carpal branch (b): دغه شعبه د Wrist joint چارپير شرياني تفمم کي برخه
اخلي.

(B) د لاس په ورغوي کي

(a) Radial indicis art: د Index گوتي د Radial side د ارواء لپاره.

(b) Princeps pollicis art: د غتي گوتي د ارواء لپاره.

DEEP PALMAR ARCH: نوموړي Arch په حقيقت کي Radial art او Ulnar art يو د بل
سره مرتبطوي دا شرياني قوس د لاس په ورغوي کي د Long flexor tendones لاندي
موقعيت لري.

نوموړي قوس د لاس په ورغوي کي د Radial art له امتداد نه چه د پنځم Metacarp په هډوکي په قاعده کي د Ulnar art د Deep branch سره د Connection په نتیجه کي تکمیلېږي مینځ ته راځي (26- شکل)

BRANCHES OF THE DEEP PALMAR ARCH

(1) Palmar metacarpal arteries: تعداد ئي دري داني دي چه د ډیپ پالمراج له محدب قسمت نه منشاء اخلي او په اخر کي Superficial palmar arch له Common digital branche سره یوځای کیږي.

(2) Perforating branches: ددي شریانو تعداد دري داني دي چه دا شریانونه ددري انسي گوتو د بین العظمي خلاو له مابین څخه تیریږي او د Dorsal metacarpal شریانو سره تفم کوي.

(3) Recurrent branches: دا شعبات پورته خواته د Palmar carpal arch په طرف سیر لري.

THE DESCENDING AORTA: د Descending aorta په امتداد د څلورمي صدري فقري د جسم د سفلي کنار برابر شروع او د دولسمي صدري فقري د جسم تر سفلي کنار پوري په Post medistinum کي امتداد لري. (28- شکل)

ارتباطات

(A) په قدام کي

- 1- Root of left lung
- 2- Pericardium and heart
- 3- Oesophagus
- 4- Diaphragm


(B) په خلف کي

- 1- Vertebral column
- 2- Hemiazygos vein

(C) په بني خوا کي

- 1- Oesophagus
- 2- Azygos vein
- 3- Thoracic duct
- 4- Right lung & pleura

(D) په چپ خواکي
Left lung & pleura -1



۲۴- شکل

BRANCHES OF DESCENDING AORTA

1- په هر طرف کي Nine posterior intercostal arteries

(For the 3rd to 11 intercostal spaces)

2- په هر طرف کي The sub costal art

3- Two left bronchial arteries : پورتنی چپ Bronhial art د Right bronchial art په

طرف کوم چه معمولاً د دریم بني خلفي بين الضلعي شريان نه منشاء اخلي پورته کیږي.

4- Oesophageal branches : دا شعبات د مري 1/3 وسطي قسمت اروا کوي.

5- Pericardial branches : د Pericardium خلفي سطحه اروا کوي.

6- Mediastinal branches : میډیاسټینل لمفاوي عقدات او د خلفي میډیاسټینوم Areolar tissue


اروا کوي.

7- Sup. phrenic arteries : دا شریانونه د حجاب حاجز د علوي سطحي خلفي قسمت اروا کوي.

THE ABDOMINAL AORTA: Abdominal aorta په حقيقت کي د Descending aorta ادامه ده
 چه د دولسمي صدري فقري د جسم د سفلي کنار برابر شروع او د بطن په جوف کي عموداً د Mid line په
 چپ خوا کي تر څلورمي قطني فقري پوري امتداد لري د څلورمي قطني فقري برابر په دوه شعبو ويشل
 کيږي چه د چپ او بني Common iliac arteries څخه عبارت دي.

BRANCHES OF ABDOMINAL AORTA



- : Ant branches -I
- Celiac trunk -1
- Sup. mesenteric art -2
- Inf. mesenteric art -3
- Lat. branches -II
- Middle suprarenal arteries -1 (بني او چپ)
- Renal arteries -2 (بني او چپ)
- Testicular or ovarian arteries -3 (بني او چپ)
- Inf. phrenic arteries -4 (بني او چپ)
- Dorsal branches -III
- Lumbar arteries -1 (په هر طرف کي څلور عدد دي)
- Median sacral art -2
- Terminal branches -IV
- Common iliac arteries -1 (بني او چپ)
 - Ext. iliac art -a
 - Int. iliac art -b



۲۵ - شکل

VENTRAL OR ANTERIOR BRANCHES

THE CELIAC TRUNK: نوموړي شرياني جذع د بطني ابهر له هغه قسمت څخه چې د حجاب حاجز Aortic opening ته نژدې قرار لري (داولي قطني فقري او د دولسمي صدري فقري د بين الفقري ډسک برابر ساحي) شروع کيږي، نوموړي شرياني جذع تقريباً د نيم انچ په اندازه اوږدوالي لري چې له دې بعد نوموړي جذع په درې شعبو وېشل کيږي. نوموړي شرياني جذع دمري د سفلي قسمت، د معدې او اثنا عشر د پورتنې قسمتو، جگر، توري او د پانکراس په ارواکي رول لري.



۲۶- شکلونه

ارتباطات: نوموړي شرياني جذع د Celiac عصبي ضفيري پواسطه احاطه شوي دي او
ارتباطات يې په لاندي ډول سره دي
A- په قدام کي
Lesser sac -1

Lesser omentum -2

B- په بني خواکي

Right crus of diaphragm -1

Right celiac ganglion -2

Caudate process of the liver -3

C- په چپ خواکي

Left crus of diaphragm -1

Cardiac end of the stomach -2

D- په سفلي کي

Tuberomentalis of the pancreas -1

Splenic vein -2

BRANCHES OF THE CELIAC TRUNK : نوموړي شريان له منشاء نه بعد د معدي د Cardiac orifice په برخه کي د Oesophageal arteries په نوم شعبات ورکوي چه نوموړي شعبات د مري سفلي قسمت اروا کوي او له دي بعد بني طرف ته د معدي د وري انخني په طرف سیر اختیاري، د معدي په وړه انخني کي بنکته سیر لري چه په اخر کي په همدې انخني کي د Right gastric art سره تفم کوي.

THE HEPATIC ARTERY-A : نوموړي شريان وروسته د منشاء نه بنکته ، قدام او بني طرف ته سیر لري د اثنا عشر پورتنی څنډي ته له رسیدو بعد Omentum minor ته داخل او د Omentum minor په بني ازاد کنار کي پورته د Portal vein په قدام او د Common bile duct په چپه خواکي سیر اختیاري پورتا هیپاتس ته په رسیدو نوموړي شريان په دوه شعبو ویشل کیږي.

Branches of hepatic artery

1- The gastroduodenal art : نوموړي شريان له Hepatic art نه د اثنا عشر د اولي قطعي په علوي کنار کي شروع او د اثنا عشر د اولي قطعي شاته بنکته سیر لري د همدې قطعي په سفلي کنار کي دا شريان په دوه شعبو ویشل کیږي چه عبارت دي له Right gastroepiploic art او Sup. pancreaticoduodenal art څخه.

د دي دواړو شعبو له جملې Right gastroepiploic شريان Greater omentum ته داخل او د معدي د لويي انخني په امتداد پورته سیر لري او بالاخره د معدي په لويه انخني کي د Left gastroepiploic art سره تفم کوي. بله شعبه ئي چه عبارت د Sup.

pancreaticoduodenal art څخه دي بنځته سیر لري او بالاخره د Inf.

pancreaticoduodenal art سره چه د Sup. mesenteric art يوه شعبه ده تفمّم کوي.

2- Right gastric art : دا شريان د معدي د پيلور په علوي کنار کي د هيپاتيک شريان څخه منشاء اخلي او له منشاء نه بعد د معدي په وړه انحنې کي پورته سیر اختياري او بالاخره د معدي په وړه انحنې کي د Left gastric art سره تفمّم کوي.

3- Right/left hepatic arteries: دا دواړه شريانونه د هيپاتيک شريان اخري شعبات دي چه د پورتا هيپاتس په برخه کي جگر ته داخل او د جگر د بني او چپ لوبو خواته ورځي.

د يادوني وړ ده چه بني هيپاتيک شريان مخکي له دي چه جگر ته داخل شي يوه شعبه د Cystic artery په نوم ورکوي او دا شعبه د کيسه صفرا د اروا مسئوليت په غاړه لري.

B- Splenic artery : دا شريان وروسته له منشاء څخه د معدي شاته د پانکراس د علوي کنار په امتداد چپ طرف ته سیر لري تر هغي چه د توري د هيلوس برخي ته ورسېږي.

Splenic artery شعبات


a- Pancreatic branches : نوموړي شريانونه د پانکراس مختلفي برخي اروا کوي.

b- Left gastroepiploic art : نوموړي شعبه وروسته له منشاء څخه Omentum major ته داخل او د معدي د لويي انحنې په امتداد سیر اختياري او بالاخره د معدي په لويه انحنې کي د Right gastroepiploic art سره تفمّم کوي.

c- Short gastric arteries : ددي شريانو تعداد تقريباً د (5-7) عدده پوري رسېږي او د معدي د Fundus د اروا مسئوليت په غاړه لري.

C- Left gastric artery : نوموړی شريان د Right gastric artery سره چی د هيپاتيک ارتري يوه شعبه ده د معدي په وړه انحنې کي انستوموز کوي.

THE SUP MESENTERIC ARTERY: دا شريان د Ab. Aorta د قدامي قسمت له هغي برخي چه د Celiac trunk د منشاء ناحي نه لږ بنځته موقعيت لري (تقريباً يو سانتې لاندي) شروع کيږي وروسته له منشاء دا شريان د پانکراس د Head په خلف او د اثنا عشر د دريمي قطعي په قدام کي تير او د وړو کلمو Mesentery ته داخل او بني طرف ته د Mesentery د دواړو ورقو ترمينځ امتداد مومي چه بالاخره په Right iliac fossa کي د Ileocolic artery له يوي شعبي سره تفمّم کوي. دا شريان د Duodenum، Appendix، Ileum، Jejunum، Common bile duct (سوري نه لاندي)، Caecum، صاعده کولون، د عرضاني کولون 2/3 بني طرف او د پانکراس د سر برخه اروا کوي.



شکل-27

ارتباطات

(A) د میزنتري د بیخ نه پورته

1- په قدام کي

Body of pancreas (a)

Splenic vein (b)

2- په خلف کي

Aorta (a)

Left renal vein (b)

Third part of duodenum (c)

(B) د میزنتري د بیخ په برخه کي: د Mesentery د بیخ په برخه کي دا شریان د Inf. vena

cava ، د بني حالب او بني طرف Psoas عضلي له مخي تیریري قابل د یاد اواړي دي چه

د دې شريان په سير کي Sup. mesenteric vein د شريان په بني خوا کي سير لري او هم دا شريان په خپل سير کي Sup. mesenteric nerves plexus پواسطه احاطه شوي دي. د Sup. mesenteric art شعبات : د Sup. mesenteric art په لاندې ډول دي.

Inf. pancreaticoduodnal art (1)

Middle colic artery (2)

Right colic artery (3)

Iliocolic artery (4)

Jejunal & ilial branches (5)

INFERIOR MESENTERIC ARTERY: دا شريان د Ab. Aorta د شعب له ناحي نه 3-4

ساتي متره پورته منشاء اخلي.


وروسته له منشاء ښکته او چپ طرف ته د پريتوان په شا کي په داسي حال کي چه د چپ حالب په انسي طرف کي د common iliac art له مخي نه تير او د سگموئيد ميزو کولون په مينځ کي د Sup. rectal art په حيث امتداد پيدا کوي نوموړي شريان د عرضاني کولون 1/3 چپه خوا، نازله کولون، Sigmoid colon، Rectum او د Anal canal د پورتنۍ قسمت د اروا مسئوليت په غاړه لري.

د Inf. mesenteric art شعبات: د Inf. mesenteric art په لاندې ډول سره دي.

Left colic artery -1

Sigmoid arteries -2

Superior rectal art -3



28 شکل

LATERAL BRANCHES

MIDDLE SUPRA RENAL ARTERIES: دا شریانونه چه تعداد ئي دوه دانې دي د Ab. aorta له دواړو خواو نه د Sup mesenteric art د منشاء نه پورته شروع او د مربوطه طرف فوق الكلیه غدې خواته ورځي او د نوموړې غدې په برخه کې د Inf. phrenic art او د مربوطه Renal art له Suprenal شعباتو سره تفمّم کوي.

RENAL ARTRIES: ددې شریانو تعداد هم دوه دانې دي چې هر یو ئې د بطني ابهر له دواړو خواو د Sup mesenteric artery د منشاء نه لږ لاندې شروع کیږي. ښې کلیوي شریان چه د چپ کلیوي شریان په نسبت لږ اوږد دي د I.V.C، Right renal vein، د پانکراس د سر او د اثناعشر د دوهمې قطعي له شانه تیرېږي. چپ کلیوي شریان د چپ کلیوي ورید، د پانکراس د جسم او Splenic vein له شانه تیرېږي. د مربوطه پښتورگي هیلوس ته نژدې هر یو ددې شریانو د Inf. suprarenal art او Uretral art په نوم شعبات ورکوي او په

تعقيب ئي د مربوطه پښتورگي د هيلوس په برخه کي هر يو کليوي شريان په پنځه سگمتال شريانو ويشل کيږي چه د پښتورگي هر سگمنت ته يو يو شريان ورځي.

THE TESTICULAR OR OVARIAN ARTERIES: په نارينه جنس کي Testicular arteries

او په ښځينه جنس کي Ovarian arteries زموږ د بحث موضوع ده.

THE TESTICULAR ARTERIES: د دې شريانو تعداد دوه دانې دي چه د بطني ابهر له دواړو

خواو څخه د کليوي شريان د منشاء نه لږ لاندې شروع، د پريتوان شاته د Psoas major

عضلي لپاسه وحشي خواته سير لري بالاخره د Inguinal canal د Deep ring له لاري

Inguinal canal ته داخل او په داخل د کانال کي د کانال د نورو محتوياتو سره د خصيه

په طرف سير اختياروي د خصي په علوي نهايت کي په متعددو شعباتو ويشل کيږي

نوموړي شريانونه د خصيو او Epididymis د اروا مسئوليت په غاړه لري.

OVARIAN ARTERIES: دا شريانونه هم لکه د نارينه و تستيکولار شريانو غوندي د ښځو

د بطني ابهر له دواړو خواو نه د کليوي شريان د منشاء لاندې شروع او عينا

تستيکولار شريانو غوندي د بطن په خلفي جدار کي د پريتوان شاته د Psoas major

عضلاتو لپاسه سفلي وحشي خواته سير لري لکن دا شريانونه د تستيکولار شريانو پر

خلاف د Inguinal canal له لاري نوموړي کانال ته نه داخلېږي بلکه د حوصيلي د څنډي

په برخه کي د Ext. iliac vessels له مخي تير او د حوصلي جوف ته داخلېږي د حوصيلي

په جوف کي د مربوطه تخمدان Suspensary lig ته داخل او په تعقيب ئي Broad lig ته

داخل او د Uterin tube لاندې سير اختياروي تر څو د Mesoo ovarian له لاري مربوطه

تخمدان ته ورسېږي. نوموړي شريانونه د تخمدانو، Uterin tubes او همدارنگه دا حليل د

حوصلي برخي د اروا مسئوليت په غاړه لري.

INFERIOR PHRENIC ARTERIES: هر يو د دې شريانو د بطني ابهر له دواړو خواو د

Celiac trunk له منشاء نه لږ پورته شروع علوي وحشي خواته د حجاب حاجز د سويق په


قدام او د مربوطه فوق الكلويه غدي انسي کنار ته نژدې سير لري، حجاب حاجز ته نژدې

چپ فرينيك شريان د مري شاته او ښي فرينيك شريان د I.V.C شاته سير لري د حجاب

حاجز د وتري برخي خلفي کنار ته نژدې هر يو د دې شريانو په دوه شعبو ويشل کيږي چه

عبارت دي له انسي او وحشي شعباتو څخه د دواړو شريانو انسي شعبات د حجاب حاجز د

وتري برخي په قدام کي يو د بل سره او همدارنگه د Musculophrenic او Pericardiophrenic شريانو سره تفمم کوي او وحشي شعبات ئي د سيني جدار ته نژدي کيږي او د Lower post intercostal او Musculophrenic شريانو سره تفمم کوي. ددي دوه شريانونه علاوه د هريو سفلي فرينیک شريان څخه يو بل شريان د Sup. suprarenal art په نوم هم منشاء اخلي چه د مربوطه فوق الکلمه غدي په اروا کي رول لري




۲۹- شکل

DORSAL BRONCHES

LUMBAR ARTERIES: دا شريانونه د بطني ابهر نه د څلورو پورتنیو قطني فقراتو د جسمونو له بالمقابل ساحي نه منشاء اخلي تعداد ئي په هر طرف کي څلور عددو ته رسيږي چه دا شريانونه وروسته له منشاء څخه د پورتنیو څلورو قطني فقراتو په قدام کي خلفي وحشي خواته سير لري د Psoas major او Quadratus lumborum عضلاتو لاندې تير او بالاخره د Transvers abdomine او Obliques internus عضلاتو تر مينځ په وړو شعباتو ويشل کيږي د يادوني وړده چه هريو ددي شريانو د پورتنیو څلورو قطني فقراتو د Transvers process په بيخ کي يوه يوه شعبه د Dorsal branch په نوم ورکوي. د شريان

Dorsal branch یوه شعبه د Spinal art په نوم ورکوي چه دا شعبه Vertebral canal ته داخليږي او باقي قسمت د شريان خلف ته تيريږي او د شا عضلات او پوستکي اروا کوي. MEDIAN SACRAL ARTERY: نوموړي شريان د بطني ابهر له خلفي قسمت څخه ددي شريان د تشعب له محل نه لږ پورته شروع او د سکروم د هډوکي په قدام کي بنسټه تر Coccyx هډوکي پوري امتداد لري. نوموړي شريان د رکتوم په اروا کي رول لري او د Iliolumbar او Lat. sacral شريانو سره تفمم کوي.



۳۰- شکل

TERMINAL BRANCHES

COMMON ILIAC ARTERIES: دا د بطني ابهر نهائي شعبات دي چه د څلورمي قطني فقري د قدامي قسمت نه د Sacroiliac joint تر قدامي قسمت پوري په دواړو خواو کي امتداد لري. د Sacroiliac joint په قدامي قسمت کي هريو ددي شريانو بيا په دوه شعبو ويشل کيږي چه عبارت د Ext. iliac art او Int. iliac art څخه دي.

INTERNAL ILIAC ARTERY: نوموړي شريان د Common iliac art د نهائي شعباتو نه يوه شعبه ده چه د Common iliac art نه د Sacroiliac joint په قدام کي منشاء اخلي وروسته له منشاء نه نوموړي شريان سفلي خلفي خواته سير لري او کوم وخت چه د Greater sciatic notch (Incisura ischiadica major) علوي کنار ته ورسيږي په دوه شعبو ويشل کيږي چه عبارت دي له Ant. trunk او Post. trunk څخه.

نوموړي شريان د حوصيلي د جوف ساختمانونه (په استثني د هغه ساختمانونو چه د Sup. Ovarian art، rectal art او Median sacral art پواسطه اروا کيږي) د Perineum ناحيه، د Gluteal region زياد تره برخه او د Iliac fossa ساختمانونه اروا کوي.

ارتباطات

(A) په قدام کي

Ureter -1

2- مربوطه تخمدان او د Uterin tube وحشي نهايت (په بنځو کي)

(B) په خلف کي

Int. iliac vein -1

Sacroiliac joint -2

(C) په وحشي کي

Ext. iliac vein -1

Obturator nerve -2

(D) په انسي کي: په انسي کي د پريتوان سره ارتباط لري.


د INT ILIAC ART شعبات

I- د Ant trunk شعبات

(A) په نرانو کي: په نرانو کي د Int. iliac art قدامي جذع لاندې شعبات ورکوي.

Sup. vesical art -1

- Obturator art -2
- Middle rectal art -3
- Inf. vesical art -4
- Inf. gluteal art -5
- Int. pudendal art -6
- (B) په بنځو کي : په بنځو کي د Int. iliac art قدامي جذع لاندې شعبات ورکوي.
- Sup. vesical art -1
- Obturator art -2
- Middle rectal art -3
- Vaginal art -4
- Inf. vesical art -5
- Inf. gluteal art -6
- Int. pudendal art -7
- Uterine art -8
- II- د Post trunk شعبات : د Int. iliac art خلفي جذع لاندې شعبات ورکوي.
- Iliolumbar art -1
- Lat. sacral arteries -2
- Sup. gluteal art -3



۳۱- شکل

EXTERNAL ILIAC ARTERY: نوموړي شريان د Common iliac art له شعباتو نه يوه شعبه ده چه د Common iliac art نه د Sacroiliac joint په قدام کي منشاء اخلي د Psoas major muscle په انسي کنار کي بنکته تر Inguinal lig پوري امتداد لري له Inguinal lig نه لاندي دا شريان په Femoral art امتداد پيدا کوي.


BRANCHES OF EXT ILIAC ARTERY: له نوموړي شريان څخه دا لاندي شعبات منشاء اخلي.

1- INF EPIGASTRIC ART: نوموړي شريان د Ext. iliart نه Inguinal lig ته نژدي منشاء اخلي او په مايل ډول د Deep inguinal ring دانسي کنار په امتداد پورته سير لري

او خپل سیر ته پورته ادامه ورکوي چه بالاخره د Fascia transversalis له سوري کیدو بعد Rectus شیت ته داخل چه بیا په متعددو وړو شعباتو تقسیم او بالاخره وار په شعبات ئي د Sup. epigastric art له شعباتو سره تفمم کوي.

2- DEEP CIRCUMFLEX ILIAC ART: نوموړي شریان د Ext. iliac art له هغې برخې چه د Inf. epigastric art د منشاء بالمقابل قرار لري شروع د **S.I.A.S** په وحشي او د Inguinal lig په خلف کي هغه شیت ته داخلېږي چه د Fascia transversalis او Iliac fascia د یوځاي کیدو په نتیجه کي جوړېږي په دې ځاي کي دا شریان د Lat circumflex femoral art له Ascending branch سره تفمم کوي.

FEMURAL ARTERY: Femoral art په حقیقت کي د Ext. iliac art امتداد دي چه د Inguinal lig د وسطې برخې له شانه تیر او د ورانه په انسي قسمت کي د Femur هډوکي تر Adductor tubercle پوري امتداد مومي له دې بعد دا شریان د Adductor magnus عضلي د سوري له لاري Poptetial fossa ته داخل او د Poptetial art په حیث په Poptetial fossa کي امتداد پیدا کوي.



شکل-32

ارتباطات

(A) په قدام کي: په پورتنی قسمت کي دا شریان یوه اندازه سطحی سیر لري چه د پوستکي او Fascia پواسطه پوښل شوي او د Femoral sheath له قدامي جدار سره ارتباط لري.

په سفلي قسمت کي د Sartorius عضلي شاته سیر لري او له مخي ئي Medial Saphenous nerve او cataneous nerve of thigh تیر شوي دي.

(B) په خلف کي: په خلف کي دا شریان د Psoas ، Pectineus او Adductor longus عضلاتو لپاسه قرار لري.

(C) په انسي کي: دا شریان په علوي انسي قسمت کي د Femoral vein سره ارتباط لري.

(D) په وحشي کي: په وحشي کي نوموړي شریان د Femoral nerve او ددي عصب د شعباتو سره ارتباط لري.

BRANCHES OF FEMURAL ARTERY: د Femoral art شعبات په لاندې ډول دي.

Superficial epigastric artery -1

Superficial ext. pudendal artery -2

Deep ext. pudendal artery -3

Profound femoral artery -4

Superficial circumflex iliac art -5

Descending genicular art -6

POPLITEAL ARTERY: د Popliteal art د Femoral art ادامه دي چه د Adductor

magnus عضلي له سوري نه د Popliteus عضلي تر سفلي کنار پوري په Fossa

popliteus کي ښکته او لږ وحشي خواته امتداد لري د Popliteus عضلي په سفلي کنار

کي بيا نوموړي شریان په دوه نهائي شعباتو ویشل کیږي چه دا شعبات عبارت دي له

Ant. tibial art او Post. tibial art څخه

ارتباطات

A- په قدام کي

Popliteal surface of femur -1

Oblique popliteal ligament -2

Popliteal muscle -3

(B) په خلف کي

Popliteal vein -1

Tibial nerve -2

Fascia & skine -3

(C) په وحشي کي : د شريان پورتنی قسمت د Biceps femoris ، Tibial nerve ،

Popliteal vein او د Femur هډوکي د وحشي Condyl سره ارتباط لري او د شريان

بنکتني برخه د Plantaris عضلي او د Gastrocnemus lateralis عضلي سره ارتباط لري.

(D) په انسي کي : د شريان پورتنی برخه د Semimembranous عضلي او د Femur

هډوکي د انسي کونډیل سره ارتباط لري او د شريان بنکتني قسمت د Tibial nerve ،

Popliteal vein او د Gastrocnemus medialis عضلي سره ارتباط لري.

BRANCHES OF POPLITEAL ARTERY : د Popliteal art شعبات په لاندې ډول سره دي.

Muscular branches -1

Cutaneous branches -2

Genicular branches -3


(Medial & lateral) Sup. genicular arteries -a

(Medial & lateral) Inf. genicular arteries -b

Middle genicular artery -c

Post. tibial artery -5

Ant. tibial artery -4



33- شکل

ANTERIOR TIBIAL ARTERY: نوموړې شريان د Popliteal art د نښاني شعباتو له جملې څخه يوه شعبه ده چه د پنډې په خلفي قسمت کې د Popliteal muscle په سفلي کنار کې د Popliteal art نه منشاء اخلي وروسته له منشاء نه دا شريان د پنډې قدامي قسمت ته د هغه سوري له لاري چه د Interosseus membrane په پورتنۍ قسمت کې قرار لري داخل او عموداً د Interosseus membrane په قدام کې بنسټه سیر لري د Malleolus medialis او Malleolus lateralis د وسطي قسمت له تیریدو بعد د قدم Dorsal سطحي ته داخل او د قدم په Dorsal سطحه کې د Dorsalis pedis art په حیث امتداد پیدا کوي نوموړې شريان په 1/3 علوي قسمت کې د Tibialis ant او Ext. digitorum longus

عضلاتو ترمينځ، په 1/3 وسطي قسمت کي د Tibialis ant او Ext. hallucis longus او په 1/3 سفلي قسمت کي د Ext. hallucis longus او Ext. digitorum longus عضلاتو ترمينځ قرار نيسي علاوه له دې د شريان د 1/3 علوي او 1/3 سفلي قسمتو په وحشي خواو کي Deep peroneal nerve او د دې شريان د 1/3 وسطي قسمت په قدام کي نوموړي عصب سیر لري.

Tibialis ant. art د Peroneal art او Post. tibial art د Perforating شعباتو پواسطه تقويه کيږي چه د Tibialis ant شريان د متضرره کيدو په صورت کي نوموړي شعبات د Tibialis ant شريان وظيفه پرمخ وړاي شي. ۳۲- شکل

BRANCHES OF TIBIALIS ANTERIOR

1- Muscular branches: نوموړي شعبات هغه عضلات چه د شريان چارپير قرار لري اروا کوي.


2- Anastomotic branches: دا شعبات د knee joint او Ankle joint چارگرد د نورو شريانو د شعباتو سره تفمم کوي.

د دې شريان Anastomotic شعبات عبارت دي له:

a- Ant./post. recurrent tibial arteries: د Knee joint چارپير په شرياني تفمم کي برخه اخلي.

b- Anteriomedial/anteriolateral malleolar arteries: د Ankle joint چارپير په شرياني تفمم کي برخه اخلي.

DORSALIS PEDIS ARTERY: نوموړي شريان د Tibialis ant شريان ادامه ده چه د Ankle joint په قدامي قسمت کي د Malleolus med او Malleolus lat ترمينځ د Tibialis ant شريان په امتداد شروع او د قدم د ظهري وجهي د انسي کنار په استقامت قدام خواته تر Proximal end of first metatarsal space پوري امتداد مومي بيا دا شريان په همدې ځاي کي د اولي Dorsal interosseus عضلي د دواړو سرونو ترمينځ بنکته خواته سیر اختياروي چه بالاخره د خپي په تله کي د Plantar arterial arch په تکميليدو سره خاتمه پيدا کوي.



34 شکل

ارتباطات

Superficial (A)

1- Fascia ، Skine او Inf. extensor retinaculum

2- Ext. hallucis brevis muscle (دا عضله ددي شريان له مخي له وحشي نه انسي

خواته تيريږي)

Deep (B)

1- Capsular ligament of the ankle joint

2- د Talus ، Nvicular او وسطی Cuneiform هډوکي او هغه اړيکي چه دا هډوکي سره مرتبطوي.

Medial (C)

1- د Extensor hallucis longus عضله

Lateral (D)

1- د Extensor digitorum longus عضلي اول وتر

2- The medial terminal branch of deep peroneal nerve

BRANCHES OF DORSALIS PEDIS ARTERY

1- Lateral tarsal artery

2- Medial tarsal arteries (Two or three in number)

3- Arcuate artery: نوموړي شريان په اخر کي په دوهم دريم او څلورم Dorsal

metatarsal شریانو ویشل کیږي چه بیا هر یو د دي اخري شعباتو په Dorsal digital branches ویشل کیږي.

4- First dorsal metatarsal artery: دا شريان په اخر کي په Dorsal digital branches


باندې ویشل کیږي چه د خپي د غټي گوتي او دوهمي گوتي همجوار څنگونه اروا کوي. او له دي نه علاوه یوه بله شعبه هم ورکوي چه د غټي گوتي انسي خوا اروا کوي.

POST TIBIAL ARTERY: نوموړي شريان د Popliteal art د نهائي شعباتو له جملې نه یوه

شعبه ده چه د Popliteus عضلي له سفلي کنار نه شروع د پنډي په خلفي قسمت کي بنکته

اولې انسي خواته سیر لري د Ankle joint په خلفي انسي برخه کي د Flexor

retinaculum لاندې په Medial plantar art او Lateral plantar art شعباتو ویشل کیږي. (34- شکل)



۳۵- شکل

ارتباطات

Superficial (A)

(a) دا شريان د پنډې په $2/3$ علوي برخه کې د Gastrocnemus او Soleus عضلاتو لاندې او د پنډې په $1/3$ سفلي برخه کې نوموړي شريان د Achil وتر د انسي کنار په قدامي برخه کې د 2.5 سانتي مترو په فاصله د نوموړي وتر سره موازي سير لري چه په دې برخه کې د پوستکي او Fascia پواسطه پوښل شوي ده.

(b) د Ankle joint په برخه کې نوموړي شريان د Flexor retinaculum او Abductor hallucis عضلي لاندې سير لري.

Deep (B)

(a) د پنډې په $2/3$ علوي برخه کې دا شريان د Tibialis post عضلي لپاسه قرار لري.

(b) د پنډې په $1/3$ سفلي برخه کې نوموړي شريان د Flexor digitorum longus muscle او د Tibia هډوکي د پاسه قرار لري.

(c) په Ankle joint کې دا شريان مستقيماً د Ankle joint په Capsal باندې د Flexor digitorum longus او Flexor hallucis longus عضلاتو ترمنځ قرار لري.

BRANCHES OF POST TIBIAL ARTERY

Peroneal artery -1

Muscular branches -2

Nutrient art -3 (د Tibia هډوکي د پاره)

Anastomotic branches -4

(a) Circumflex fibular artery د Knee joint چارپير په شرياني تفمم کې برخه اخلي.

Medial malleolar branches (b)

Calcaneal branches (c)

Communicating branch (d)

Terminal branches -5

Medial plantar artery (a)

Lateral plantar artery (b)

د پورته شعباتو له جملې Peroneal artery، Medial plantar artery او Lateral plantar

artery شريانونه يوه اندازه مهم دي چه هر يو ئي په خلص ډول تشرېح کيږي.

PERONEAL ARTERY: دا شريان د post tibial art له هغه قسمت نه چه د Popliteus عضلي د سفلي کنار نه 2.5 سانتی متره لاندي قرار لري شروع او په مايل ډول د Fibula هډوکي په طرف بنسټه او بيا د همدې هډوکي د Medial crest په امتداد بنسټه سير اختياري دا شريان د Tibiofibular او Ankle مفاصلو شاته له تيريدو بعد په زياتو شعبو ويشل کيږي چه دا شعبات يي د Lat calcaneal branches په نوم ياديږي.

BRANCHES OF PERONEAL ARTERY

1- Muscular branches: د پنډې د خلفي او وحشي قسمت عضلاتو په اروا کي رول لري.

2- Nutrient artery: د Fibula هډوکي د پاره.

3- Anastomotic branches

Perforating branch (a)

ددي شريان دا شعبه د Ankel joint نه پنځه سانتی متره پورته Interosseus membrane سوري کوي او د Lateral maleolar شرياني شبکي سره يوځاي کيږي.


Communicating branch (b)

دا شعبه د Tibia هډوکي د سفلي نهايت نه پنځه سانتی متره پورته د Post. tibial art د Communicating branch سره تفمّم کوي.

Calcaneal branches (c)

دا شعبات د Lat. malleolar شرياني شبکي سره يوځاي کيږي.

MEDIAL PLANTAR ARTERY: دا شريان د Post. tibial art د نهايي شعباتو له جملې نه يوه شعبه ده نوموړي شريان د Flexor retinaculum لاندي د Post. tibial art نه منشاء اخلي د Abductor hallucis او Flexor digitorum brevis عضلاتو لاندي قدام خواته سير لري تر هغې چه د غټې گوتي د انسي کنار له اروا کولو بعد د غټې گوتي په انسي کنار کي خاتمه مومي ددي شريان په سير کي له نوموړي شريان نه Muscular، Cutaneus او Articular شعبات منشاء اخلي.



۳۲- شکل

LATERAL PLANTAR ARTERY: نوموړي شریان د Post. tibial art د نهائي شعباتو له جملې څخه یوه شعبه ده چه د Flexor retinaculum لاندې د Post. tibial art څخه منشاء اخلي چه وروسته له منشاء څخه قدام خواته د Abductor hallucis او Flexor digitorum brevis عضلاتو لاندې سیر لري د پنځم میتاتارس هډوکي قاعدې ته په رسیدو انسي خواته کېږي او ددې کېږدو په نتیجه کې یو شریاني قوس جوړوي چه د Plantar arch په نوم یادېږي د Plantar arch د First metatarsal space په انسي نهایت کې د Dorsalis pedis شریان سره یوځای کېږي. ددې شریان په سیر کې دا شریان په زیاته اندازه عضلي، جلدي او مفصلي شعبات او هم یوه شعبه د کوچني گوتي د اروا لپاره ورکوي.

د Plantar arch څخه څلور Plantarintermetatarsal arteries او څلور Proximal perforating arteries منشاء اخلي. څلور Plantarintermetatarsal arteries د څلورو وحشي گوتو خواته ورځي او په اخر کې هر یو ددې شریانو په دوه شعبو ویشل کېږي چه د Plantar digital arteries په نوم یادېږي.

د اول Plantarintermetatarsal artery نهائي شعبات د غټي گوتي او دوهمي گوتي همجوار څنگونه، د دوهم Plantarintermetatarsal artery نهائي شعبات د دوهمي او

دريمي گوتو همجوار خنگونه، ددريم Plantarintermetatarsal artery نهائي شعبات
ددريمي او خلورمي گوتو همجوار خنگونه او خلورم Plantarintermetatarsal artery د
خلورمي او پنځمي گوتو همجوار خنگونه اروا کوي هر يو Plantarintermetatarsal
artery علاوه له Plantar digital arteries څخه يوه يوه شعبه د Distal perforating art
په نوم ورکوي.

دریم فصل


وریدونه

وریدونه چه د وجود له انساجونه قلب ته د ویني د راوړلو وظیفه په غاړه لري نسبت شراینو ته د وجود په انساجو کي سطحي موقعیت لري او هم د جدارونو ضخامت یي د شریانو په نسبت کم دي وریدونه په دري عمده گروپو ویشل شوي چه عبارت دي له

Pulmonary veins -I

Systemic veins -II

Portal vein -III



37- شکل

PULMONARY VEINS: نوموړي وريدونه چه Oxygenated وينه د دواړو سږو نه چپ دهليز ته رانقلوي تعداد ئي په دواړو خواو کي څلور عددوته رسيږي او Valves نه لري. د هر طرف وريدونه اولاد Alveol په جدار کي د Capillary شبکي په شکل شروع او د Capillary شبکو د متعددو شعباتو له يو ځاي کيدو نه بالاخره د سږو په هر فص کي يوه وريدي جذع جوړيږي چه په دي اساس په بني سږي کي بنا پردي چه دري فسه لري دري وريدي جذعي (علوي، سفلي او وسطي) او په چپ سږي کي ددوه فسونو د موجوديت په اثر دوي وريدي جذعي (علوي او سفلي) مينځ ته راځي د بني سږي علوي او وسطي جذعي سره يوځاي کيږي او ورنه يوه واحده علوي جذع مينځ ته راځي. بنا پردي دوه وريدونه د بني سږي د Hillus نه او دوه وريدونه د چپ سږي د Hillus نه راوړي په Pulmonary hillus کي Sup. pulmonary vein د Pulmonary art په قدامي قسمت کي او Inf. pulmonary vein په خلفي سفلي قسمت کي قرار نيسي د بني خوا وريدونه د Fibrous pericardium له سوري کيدو بعد Pericardial cavity ته داخل او په Pericardial cavity کي د بني طرف وريدو له جملې Sup. pulmonary vein د Sup. vena cava له خلف نه او Inf. pulmonary vein د Right atrium له خلف نه تير او د چپ دهليز په خلفي جدار کي ئي سوري خلاصيږي. او چپ خواکي دواړه وريدونه د Descending aorta له مخي نه تيريږي او بالاخره د Fibrous pericardium له سوري کيدو بعد ئي د چپ دهليز په خلفي جدار کي سوري خلاصيږي. (4- شکل)

SYSTEMIC VEINS: وريدونه چه د ټول بدن نه ناپاکه وينه د زړه خواته راوړي د بدن په انساجو کي ددوي موقعيت يا سطحي (Superficial) وي په دي معني چه د Superficial fascia لاندې او يا د Deep fascia لپاسه موقعيت لري او يا هم ددوي موقعيت عميق وي يعني د Deep fascia لاندې موقعيت لري.

Systemic وريدونه په دري عمده گروپو ويشل شوي.

Cardiac veins -1

Veins of the head/neck/upper limbs and thorax -2

Veins of the lower limbs/abdomin and pelvis -3

Cardiac veins: CARDIAC VEINS مونږ د قلب په وريدي تخليه کي په تفصيل تشرېح کړي او دوباره تشرېح ته ئي ضرورت نشته.

VEINS OF THE HEAD/NECK UPPER LIMBS AND THORAX: د سر او غاړې وريدونه په

دري گروپونو ويشل شوي دي.

(a) د مخ او سر د خارجي برخې وريدونه

Cranial and intracranial veins (b)


Cervical veins (c)

(a) د مخ او سر د خارجي برخې وريدنه: د مخ د هر طرف وريدونه د W د توري په شان شکل جوړوي چه د W شاخونه پورته د سر د پوستکي په طرف او ښکته تر غاړې پوري امتداد لري.


د مخ د وريدو له جملې نه Facial vein غټ وريد دي چه دا وريد د سترگې د انسي زاوي په برخه کي د Angular vein په نوم د Supratroclear او Supraorbital وريدو له يوځاي کيدو نه مينځ ته راځي چه Angular vein د Facial vein په شکل د Facial art شاته خلفي سفلي خواته امتداد مومي بالاخره د غاړې د Deep fascia له سوري کيدو بعد د Submandibular gland له مخي تير او د Retromandibular vein له قدامي شعبي سره يوځاي کيدو په نتيجه کي Common facial vein جوړوي چه Common facial vein بيا په Internal jugular vein کي تخليه کيږي. د مخ يو بل وريد چه عبارت د Superficial temporal vein څخه دي د غوږ د Tragus په قدام کي ښکته تير او Parotid gland ته داخل چه په دي ځاي کي د مخ د بل وريد سره چه Maxillary vein نومېږي يوځاي کيږي او په نتيجه کي Retromandibular vein جوړيږي د Retromandibular vein خلفي شعبه د Post. auricular vein سره د يوځاي کيدو په نتيجه کي Ext. jugular vein جوړوي چه دا اخري وريد بيا په Subclavian vein کي تخليه کيږي.

Facial vein عميقاً له يوي خوا د Supraorbital او Sup. ophthalmic وريدو سره او له بلې خوا د Deep facial vein پواسطه د Pterygoid venous plxus سره ارتباط لري. چه د همدې ارتباطاتو په وسيله Facial vein د Cavernose sinus سره ارتباط پيدا کوي دا ارتباطات ددي باعث کيږي چه د مخ انتانات خصوصاً د پورتنې شونډې او د پوزي د لاندنيې قسمت انتانات په اساني سره نوموړي Sinus ته وړانتقال شي له دي کبله دا د مخ د خطرناکي ناحي په نوم مسمي کړي شوي دي او د امکان تر حده بايد کوشش وشي چه

جراحی مداخله د ضرورت په وخت کي پکښي اجراء نشي. له دي نه علاوه د سر
 Extracranial وريدونه د وړو وريدو پواسطه چه Emissary veins ورته وائي د
 Intracranial وريدي جيوبو سره ارتباط لري چه ددي وړو وريدو له لاري د سر
 Extra cranial infection داخل قحفي وريدي جيوبو ته په اساني انتقال مومي.



شکل - 38



شکل - 39

CRANEAL & INTRACRANIAL VEIN: مخکي له دي چه ددماغ او ددماغ د چارپير قسمتو وريدي تخليه تشریح کړو ضروري دي چه ددماغ د پوښ يعني سحایا (Meninge) په باره کي یو څه معلومات ولرو (ددي موضوع پوره تشریح په عصبي سیستم کي کیږي). سحایا ددري ورقو څخه جوړه شوي ده دغه دري ورقي له بیرون نه داخل خواته د دورامتر، اراکنوئید او پیامتر په نومو یادېږي.

Duramater د سحایا بیروني پرده ده چه ددماغ چارپير دا پرده له دوه صفحو نه متشکله ده بیروني صفحه ئي چه د Endosteal layer په نوم یادېږي د قحف هډوکو داخلي سطحي پوښوي او داخلي صفحه ئي چه د Meningeal layer په نوم یادېږي د سحایا نور دواړه پوښونه ددماغ د نسج سره یوځای احاطه کوي او د دورامتر دا طبقه د فورامین ماگنوم نه لاندې د Spinal duramater سره ارتباط لري د دورامتر دا دواړه طبقي ددماغ د سطحو په ټولو برخو کي یو له بل سره نښتي ده بیدون له هغه ځایو په کومو کي چه Craneal venous sinuses ددوي پواسطه پوښل شوي دي. د دورامتر داخلي صفحه ددماغ د سطحو لپاسه په ځنډ ځایو کي د التواتو لرونکي ده چه دا التوات ددماغ سطحه په څو برخو ویشي نوموړي التوات په لاندې ډول سره دي.

1- Falx cerebri

2- Tentorium cerebelli

3- Falx cerebelli


4- Diaphragma sellae

Falx cerebri: نوموړي التواء د لور شکل لري او ددماغ ددوه نیمو کړو ترمینځ موقعیت لري.

Tentorium cerebelli: دا التواء د خیمي شکل لري د Post. craneal fossa چت جوړوي او Cerebrum د Cerebellum له قفوي لوبو نه جدا کوي.

Falx cerebelli: یوه وړه لور ماننده التواء ده او په حقیقت کي دا التواء هغه وخت مینځ ته راځي چه د ورامتر مخي خواته په Post. cerebellar notch کي پورته شي.

Diaphragma sellae: دا یوه وړه دایروي، افقي شکله چین خور دگي (التواء) ده چه د Hypophyseal fossa چت جوړوي.



۴۰- شکل

VENOUS SINUSES OF DURAMATER: لکه چه دمخه مو وویل د Duramater دواړه طبقي د دماغ د سطحو په ټولو برخو کې یو له بل سره نښتي دي بیدون د هغه ځایو په کومو کې چې Craneal sinuses ددوي پواسطه پوښل شوي دي، په همدې ځایو کې چې Craneal sinuses د Duramater د پوښو پواسطه پوښل کېږي. د Duramater دواړه پوښونه ددې جیوبونو (Sinus) جدارونه جوړوي چې دا جدارونه دداخل له خوا د Endothelium پواسطه پوښل شوي دي ددې جیوبونو جدارونه عضلي طبقه او والونه نلري. په دې جیوبونو کې د دماغ د ټولو برخو وړیدي وینه، همدارنگه د سحایا او د سرد کوپړي د هډوکو وړیدي وینه تخلیه کېږي.

ددې نه علاوه د C.S.F (Cerebrospinal fluid) تخلیه هم په ځینو جیوبونو کې صورت نیسي. دا وړیدي جیوبونه د Craneal cavity نه بیرون یعنې د Extra cranial وړیدو سره د Emmisary veins پواسطه ارتباط لري دا ارتباط ددې باعث کېږي چې د جیوبونو وړیدي وینه له خپل اصل مسیر نه علاوه د Craneal cavity نه بیرون جریان پیدا کوي او په جیوبونو کې وړیدي فشار کم شي. په Craneal cavity کې د دماغ د سطحې په بیروني برخه کې ۲۳ وړیدي جیوبونه (Sinuses) قرار لري چې ۸ ټي جفت او ۷ ټي طاق دي.



PAIRED VENOUS SINUSES

نوموړي جيو بونه په هر طرف کي يو يو عدد دي او په لاندې ډول دي.

Inf. petrosal sinuses -3 Sup. petrosal sinuses -2 Cavernous sinuses -1
Sphenoparietal sinuses -6 Sigmoid sinuses -5 Transverse sinuses -4
Middle meningeal sinuses -8 Petrosquamous sinuses -7

UNPAIRED SINUSES

Sigmoid sinus -3 Inf. sagittal sinus -2 Sup. sagittal sinus -1
Ant. intercavernous sinus -5 Occipital sinus -4
Basilar plexus of vein -7 Post. intercavernous sinus -6



41 شکلونه

PAIRED VENOUS SINUSES

1- (R/L) THE CAVERNOUS SINUSES: هر يو Cavernous sinus د Sphenoidal هډوکي د جسم د علوي وجهي په دواړه خواو کي په Middle cranial fossa کي موقعيت لري د هر يو اوږدوالي دوه ساتي متره او عرض ئي يو ساتي متر دي. د هر Sinus سطحه د Endosteal layer of duramater پواسطه او وحشي جدار چت او انسي جدار ئي د Meningeal layer of duramater پواسطه جوړه شوي دي په قدام کي هر يو ددي Sinus تر Sup. orbital fissure پوري او په خلف کي د Temporal هډوکي د Petrous برخي تر څوکي پوري امتداد لري.

ارتباطات

- (A) هغه ساختمانونه چه د Sinus نه بيرون قرار لري.
- (a) په علوي کي: Optic tract او Internal carotid art
- (b) په سفلي کي: Foramen lacerum او د Sphenoidal هډوکي د جسم او غټ شاخ اتصالي محل.
- (c) په انسي کي: Hypophysis cerebri او Sphenoidal air sinuses
- (d) په وحشي کي: Temporal bone
- (e) په قدام کي: Sup. orbital fissure او Apex of orbit
- (f) په خلف کي: Apex of petrous part of temporal bone او Crus cerebri of the mid brain
- (B) هغه ساختمانونه چه د Sinus په وحشي جدار کي قرار لري. له پورته نه ښکته خواته په لاندي ډول دي.
- Oculomotor nerve (a)
- Trochlear nerve (b)
- Ophthalmic nerve (c)
- Maxillary nerve (d)
- Trigeminal ganglion (e)
- (C) هغه ساختمانونه چه د Sinus له مينځ نه تيريږي.
- Internal carotid art (a)
- Abducent nerve (b)
- (In coming channels) Tributaries of sinus

(A) Orbit له جوف نه
 Sup. orbital vein (a)
 Inf. orbital vein (b) يوه شعبه
 (B) Brain (دماغ) نه
 Superficial middle cerebral vein (a)
 Inf. cerebral veins (b)
 From the meninge (C)
 Sphenoparietal sinus (a)
 Middle meningeal ورید Frontal جذع ممکن په Pterygoid venous plexus
 يا په Sphenoparietal sinus او يا هم مستقيماً په Cavernous sinus کي تخلیه شي.
 Draining channels of sinus (Communications): د هر يو
 (a) Transverse sinus ته د Sup. petrosal sinus له لاري.
 (b) Internal jugular vein ته د Inf. petrosal sinus له لاري.
 (c) Pterygoid venous plexus ته د Emmissary veins له لاري.
 ددي نه علاوه هر يو ددي sinus د Facial vein سره د Sup. orbital vein او Pterygoid venous plexus له لارو ارتباط لري او هم ښي او چپ Cavernous sinus يو له بل سره د قدامي او خلفي Intercavernous sinuses او Basilar venous plexus پواسطه سره مرتبط کيږي.
SUP PETROSAL SINUSES-II (R/L): نوموړي Sinuses د مربوطه Temporal هډوکي د Petrous part د علوي کنار په امتداد د Tentorium cerebelli په قدامي قسمت کي قرار لري. ددي Sinus له لاري مربوطه Cavernous sinus په Transverse sinus کي تخلیه کيږي او په دې Sinus کي Inf. cerebral، Tympanic او Cerebellar وریدونه تخلیه کيږي.
INF PETROSAL SINUSES-III (R/L): نوموړي Sinuses په مربوطه Petrooccipital fissure کي موقعيت لري او ددي Sinuses له لاري مربوطه Cavernous sinus په Int jugular vein کي تخلیه کيږي او په هر يو ددي Sinus کي لاندې وریدونه تخلیه کيږي.
 Laberinthine veins (a)
 (b) Pons، Medulla او Cerebellum وریدونه.
TRANSVERS SINUSES-IV (R/L): هر يو ددي سينسونو د Tentorium cerebelli په خلفي قسمت کي د Internal occipital protuberance له دواړه خواونه د ښي او چپ

Parital هډوکي تر Post. Inf. angle پوري امتداد لري. بني Transvers sinus د چپ په نسبت پراخه دي. لاندي وریدونه په دي Sinuses کي تخلیه کیږي.

Inf. cerebral veins (a)

Inf. cerebellar veins (b)

Post. temporal diploic vein (c)

Inf. anastomotic vein (d)

او همدارنگه Sup. petrosal sinus هم په دي Sinus کي تخلیه کیږي.

(R/L) SIGMOID SINUSES-V : هر یو د Sigmoid sinus د مربوطه Transvers sinus

امتداد یافته قسمت دي چه هر یو ددوي د S د توري شکل لري. هر یو ددي سینسونو د مربوطه Parital bone له Post. Inf. angle نه د Jugular foramen تر خلفي قسمت پوري امتداد لري په هر یو ددي سینسونو کي لاندي وریدونه تخلیه کیږي.

Mastoid and condylar emissary veins (a)

Cerebellar veins (b)

Internal auditory vein (c)

(R/L) SPHINOPARITAL SINUSES-VI : هر یو ددي Sinus د Sphenoidal هډوکي د

مربوطه Ala minor د خلفي ازاد کنار په امتداد قرار لري.

هر یو ددي Sinus په مربوطه Cavernous sinus کي تخلیه کیږي او په هر یو ددي Sinus کي د Middle meningeal ورید Frontal trunk تخلیه کیږي.

(R/L) MIDDLE MENINGIAL VEINS-VII : دا وریدونه دوه جذعي جوړوي چه عبارت دي

له قدامي جذعي (Frontal) او خلفي (Parital) جذعي څخه قدامي جذع ممکن په Sphenoplatin، Pterygoid venous plexus، او یا هم په Cavernous sinus خاتمه

ومومي. او خلفي جذع معمولاً په Pterygoid venous plexus خاتمه مومي.

(R/L) PETROSQUAMUS SINUSES-VII

هر یو ددي سینسونو په مربوطه Petrosquamus fissure کي موقعیت لري او په

مربوطه Transverse sinus کي تخلیه کیږي

UNPAIRED SINUSES

SUP SAGITAL SINUS -1 : نوموړي Sinus د Falx cerebri په پورتنی التصاقی کنار کي

موقعیت لري په دي Sinus کي لاندي وریدونه تخلیه کیږي.

Sup. cerebral veins -a

Parital emissary veins -b

Venous lacunae -c (په هر طرف کي دري عدده)

d- کله نا کله د پوزي نه يو وريد هم په دي Sinus کي تخلیه کيږي.

INF. SAGITAL SINUS -II: نوموړي Sinus د Falx cerebri د سفلي ازاد کنار په 2/3 خلفي قسمت کي موقعيت لري نوموړي Sinus د Great cerebral vein سره د يوځاي کيدو په تيجه کي ختميږي او ددي دواړو د يوځاي کيدو په تيجه کي Stright sinus جوړيږي.

STRIGHT SINUS -III: نوموړي Sinus د Mid line په استقامت د Falx cerebri او Tentorium cerebelli د يوځاي کيدو په محل کي موقعيت لري نوموړي Sinus په قدام کي د Inf. sagital sinus او د Great cerebral vein د يوځاي کيدو په تيجه کي جوړيږي او تر Protubrantia occipitalis interna پوري امتداد لري. بر علاوه د Great cerebral vein او Inf. sagital sinus نه چه ددي Sinus په جوړيدو کي رول لري خو عدده Sup. cerbellar وريدونه هم په دي سينوس کي تخلیه کيږي.

OCCIPITAL SINUS-IV: دا Sinus د Falx cerebelli په التصافي کنار کي موقعيت لري نوموړي Sinus فورامين ماگنوم ته نژدي شروع او په Confluence of sinuses (Junction of sinuses) باندي خاتمه پيدا کوي.

ANT/POST INTERCAVERNOS SINUSES -V/VI: نوموړي Sinuses دواړه Cavernous sinuses سره مرتبطوي په دي Sinuses کي غير منظم وريدي چينلونه چه د Hypophysis cerebri نه لاندې قرار لري تخلیه کيږي.


BASILAR PLEXUS OF VEINS-VII: دا وريدي ضفيره د قحف د Clivus لپاسه قرار لري چه له يوي خوا دواړه Inf. petrosal sinuses سره مرتبطوي او له بلې خوا دا وريدي ضفيره په دواړه خواو کي د Internal vertebral وريدو سره ارتباط لري.

CERVICAL VEINS: د غاړي وريدونه يا د غاړي د Deep fascia لپاسه او يا هم د غاړي د Deep fascia لاندې قرار لري. د غاړي د سطحي وريدو له جملي څخه Ext. jugular وريد او د عميکه وريدو له جملي Int. jugular vein د اهميت وړ دي بناء همدا دواړه وريدونه په مفصل ډول تر بحث لاندې نيسو.

THE EXTERNAL JUGULAR VEIN: تعداد ئې دوه دانې دي د غاړې په دواړو خواوو کې په متناظر ډول د غاړې د عميقه صفاق لپاسه قرار لري. په دې وريد کې د مخ او د سر د بيروني برخې او په کمه اندازه د عميقه انساجو وريدونه تخليه کېږي. دا وريد د Mandibular angle شاته د Retromandibular وريد د خلفي شعبي او د Post. auricular vein له يوځاي کيدو مينځ ته راځي او د Sternocleidomastoid عضلي په امتداد په مايل ډول بنکته سير لري د Clavicula هډوکي د وسطي برخې نه لږ پورته د غاړې په Post. triangle کې د غاړې عميق صفاق سوري کوي او په Subclavian وريد کې تخليه کېږي.

TRIBUTARIUS: لاندې وريدونه په Ext. jugular کې تخليه کېږي.

- Post. auricular vein -1
- Post. division of retromandibular vein -2
- Post. external jugular vein -3
- Transvers cervical vein -4
- Suprascapular vein -5
- Ant. jugular vein -6



42 - شکل

THE INTERNAL JUGULAR VEIN: تعداد ئې دوه دانې دي چه د غاړې په دواړه خواوې په متناظر ډول د غاړې د عميق صفاق لاندې قرار لري. او هر يو ددې وريدو په حقيقت کې د Sigmoid sinus مستقيم امتداد دي هر يو ددې وريدو د Jugular foramen نه شروع او د Clavicula هډوکي د انسي نهايت خلفي برخې پورې امتداد لري هر يو ددې وريدو د Subclavian ورید سره د يوځاي کيدو په نتيجه کې Brachiocephalic vein مربوطه جوړوي دا وريدونه په علوي او سفلي برخو کې لږ توسع لري چه علوي متوسع برخه ئې Sup. bulb of jugular vein او سفلي متوسع برخه ئې د Inf. bulb of jugular vein په نوم يادېږي.

ارتباطات

Superficially (A)

1- Sternocleidomastoid عضله

2- Post. belly of digastric muscle

3- Sup. belly of omohyoid muscle

4- Parotid gland

5- Styloid process

6- Accessory nerve

7- Post. auricular artery

8- Occipital art

9- Sternomastoid arteries

10- Lower root of ansa cervicalis

11- Infrahyoid muscles

12- Ant. jugular vein

13- Deep cervical lymph nodes

14- Internal carotid art او نهم، لسم، يوولسم او دولسم قحفي اعصاب.

Posteriorly (B)

1- Rectus capitis lat عضله

2- Transvers process of atlas

3- Levator scapula عضله.

4- Scalenus medius عضله

5- Cervical plexus

6- Scaleneus ant عضله

7- Phrenic nerve

8- Thyrocervical trunk

9- Inf. thyroid art

10- First part of subclavian art

11- Thoracic duct

(C) Medially

1- Internal carotid art

2- Common carotid art

3- Vagus nerve

TRIBUTARUS OF INTERNAL JUGLAR VEIN: په Int. jugular vein کې لاندې

وریدونه تخلیه کېږي.

1- Common facial vein

2- Lingual vein

3- Pharyngeal vein

4- Sup. thyroid vein

5- Middle thyroid vein

6- Occipital vein

د پورته وريدونو علاوه Inf. petrosal sinuses (ښي او چپ) Sigmoid sinuses (ښي او

چپ) هم په مربوطه Internal jugular vein کې تخلیه کېږي.

VEINS OF THE UPPER LIMB: د علوي طرف وريدونه په دوه گروپو ویشل شوي دي.

(A) سطحي وريدونه (Superficial veins): دا وريدونه په Subcutaneus نسج يا

تحت الجلدې نسج کې قرار لري.

(B) عميق وريدونه (Deep veins): دا وريدونه د شريانو سره يوځای د عضلاتو د

طبقاتو تر مينځ قرار لري.

A- سطحي وريدونه: د علوي طرف سطحي وريدونه په لاندې ډول دي.

DORSAL VENOUS ARCH: نوموړي وريدي قوس د لاس په ظهري وجه کې موقعيت لري


او په دې وريدي قوس کې لاندې وريدونه تخلیه کېږي.

(a) درې عددې د ورسال ميتاکارپل وريدونه.

(b) د کوچني گوتي د انسي طرف Dorsal digital vein


(c) د Index گوتي د وحشي خوا Dorsal digital vein

(d) د غټي گوتي دوه ظهري وريدونه



۴۳ شکل

CEPHALIC VEIN: دا وريد د Dorsal digital vein له وحشي نهايت نه شروع او د ساعد د سفلي قسمت د وحشي کنار په برخه کي د ساعد قدامي برخي ته دور خوري او بيا پورته د Elbow joint په قدام او د Biceps brachii عضلي د وحشي کنار په امتداد پورته سير لري. د پيکتورالس ماجور عضلي د سفلي کنار برابر د بازو د عضلاتو صفاق سوري کوي او په تعقيب ئي په Deltopectoral ميزابي کي پورته تر Infraclavicular fossa پوري امتداد پيدا کوي. او بيا د Fascia clavipectoral له سوري کيدو بعد د Axillary vein سره يوځاي کيږي.



44 شکل

BASILIC VEIN: دا وريد د Dorsal venous arch له انسي نهايت نه شروع كيږي او په تعقيت ئي د ساعد د انسي كنار په خلفي قسمت كي پورته امتداد مومي د څنگلي بند ته نژدي د ساعد په انسي كنار باندې قدام خواته دوړخوري د Elbow joint له مخي تير او بيا د Biceps عضلي د انسي كنار په امتداد خپل سیر ته د بازو تر وسطي قسمت پوري ادامه وركوي د بازو په وسطي قسمت كي د بازو د عضلاتو له سوري كيدو بعد د Brachial art په انسي كنار كي د Teres major عضلي تر سفلي كنار پوري امتداد مومي او له دي بعد د Axillary vein په حيث امتداد پيدا كوي.

MEDIAN CUBITAL VEIN: دا يو پراخه Communicating وريد دي چه په Elbow joint كي د Cephalic او Basilic وريد تر مينځ ارتباط برقرار وي.

MEDIAN VEIN OF THE FOREARM: نوموړي وريد د لاس د ورغوي له وريدي شبکې نه شروع او د Elbow joint په قدامي قسمت کې د Cephalic او يا هم Basilic وريدوله جملې په يو وريد خاتمه پيدا کوي.

ځنې وخت دا وريد په دوه شعبو ویشل کېږي چه عبارت د Median cephalic او Median basilic وريدو څخه او هر يو ددې وريدو بيا د خپل مربوطه Basilic او يا Cephalic وريد سره يوځای کېږي.

B- د علوي طرف عميق وريدونه: د علوي طرف عميکه وريدونه د شريانو سره يوځای د علوي طرف د عضلاتو ترمينځ سیر لري چون د علوي طرف زیادتره وینه د سطحي وريدو پواسطه انتقالېږي نو په همدې وجه د علوي طرف د عميکه وريدو قطر وړوکی دي. د علوي طرف عميکه وريدونه په لاندې ډول دي.


DEEP VEINS OF THE HAND: د لاس په ورغوي کې دوه وريدي قوسونه چه د لاس د ورغوي ددوه شرياني قوسونو سره يوځای موقعيت لري وجود لري. دا دوه وريدي قوسونه د Superficial palmar arch او Deep palmar arch په نومو ياديږي.

Common palmar digital veins په Superficial palmar venous arch کې او Palmar metacarpal وريدونه په Deep palmar venous arch کې تخليه کېږي.

DEEP VEINS OF THE FOREARM: د ساعد عميق وريدونه د Radial art او Ulnar art سره يوځای سیر لري دا وريدونه Elbow joint ته نژدې سره يوځای کېږي او يوه جوړه Brachial veins تري مينځ ته راځي.

BRACHIAL VEINS: دا وريدونه چه د Radial او Ulnar وريدوله يوځای کيدونه د Elbow joint په قدامي برخه کې مينځ ته راځي د Brachial art په دواړو خواو کې پورته سیر لري.

د Subscapular عضلي بنکتنې څنډې ته نژدې دا وريدونه د Axillary vein سره يوځای کېږي په زیاتره وختو کې انسي Brachial vein په Basilic vein کې تخليه کېږي.



۴۵- شکل

THE AXILLARY VEIN: Basilic vein د Axillary vein ادامه دي چه د Teres major عضلي له سفلي کنار نه د اولي ضلعي تر بیروني څنډې پوري امتداد لري. د اولي ضلعي د بیروني څنډې نه بعد د اورید د Subclavian vein په نوم یادېږي. Subscapular عضلي ته نژدې Brachial vein او د اولي ضلعي بیروني څنډې ته نژدې Cephalic vein ورسره یوځای کیږي. دا ورید د Axillary art په انسي خواکي قرار لري د Axillary vein او Axillary art ترمینځ Medial pectoral nerve، Medial cord of Ulnar nerve، brachial plexus او Medial cutaneous nerve of the forearm قرار لري.

THE SUBCLAVIAN VEIN: دا ورید د Axillary vein ادامه دي چه د اولي ضلعي له بیرون څنډې نه د Scaleneus ant عضلي تر انسي کنار پوري امتداد لري د Scaleneus

ant عضلي په انسي کنار کي د Int. jugular vein سره یوځای کیږي او په نتیجه کي Brachiocephalic vein جوړوي.

ددې وريد په قدام کي Clavicula او Subclavius عضله، په خلفي علوي برخه کي ئي Subclavian art قرار لري. چه دا شريان له نوموړي وريد څخه د Scaleneus ant او Phrenic nerve پواسطه جدا شوي دي. په سفلي کي ئي اوله ضلعه او پلورا قرار لري. دا وريد يوه جوړه Valve لري چه ددې وريد انسي نهايت نه ددوه سانتي متره په فاصله قرار لري په دې وريد کي Ext. jugular وريد او Dorsal scapular vein تخلیه کیږي. د یادوني وړده چه بني Lymphatic duct په بني Subclavian وريد کي تخلیه کیږي.

VEINS OF THE THORAX: د سيني مهم وريدونه عبارت دي له:

BRACHIOCEPHALIC VEINS: بني او چپ Brachiocephalic veins چه د اوږدوالي له نظره سره تفاوت لري په دې معني چه بني Brachiocephalic vein دوه نیم سانتي متره اوږدوالي لري او چپ Brachiocephalic vein تقريباً شپږ سانتي متره اوږدوالي لري هر يو ددې وريدو د مربوطه Clavicula هډوکي د انسي نهايت له خلفي برخي نه شروع کیږي بني Brachiocephalic vein عموداً او چپ Brachiocephalic vein په مايل ډول د Manubrium sterni د نیمائي علوي برخي په خلف کي بني طرف ته سير لري او د بني طرف اولي ضلعي د غضروفي برخي د انسي نهايت په خلفي برخه کي دواړه سره یوځای کیږي او په نتیجه کي Superior vena cava جوړوي په بني طرف Brachiocephalic vein کي لاندې وريدونه تخلیه کیږي.

Right vertebral vein -1

Right internal thoracic vein -2

Right inf. thyroid vein -3

Right sup. intercostal vein -4 کله کله

First right post. intercostal vein -5

په چپ Brachiocephalic vein کي لاندې وريدونه تخلیه کیږي.

Left vertebral vein -1

Left internal thoracic vein -2

Left inf. thyroid vein -3

Left sup. intercostal vein -4

5- Pericardial او Thymic، First left post. intercostal vein وریدونه په چپ Brachiocephalic vein کي تخلیه کیږي.


6- Thoracic duct

Sup vena cava: THE SUPERIOR VENA CAVA چه د وجود د نیمائي علوي برخي وریدي وینه د بني دهلیز خواته رانقلوي دا ورید تقریباً 7 سانتی متره اوږدوالي لري چه د بني او چپ Brachiocephalic vein له یوځاي کیدونه مینځ ته راځي دا ورید Valve نلري د بني طرف اولي ضلعي د غضروفي برخي د انسي نهایت له خلفي برخي نه شروع او عموداً ښکته سیر لري بالاخره د دریمي ضلعي د غضروفي برخي شاته د Right atrium په علوي نهایت باندي خاتمه مومي ددي ورید نیمائي سفلي برخه د Fibrous pericard پواسطه پوښل شوي ده.


THE AZYGOS VEIN: azygos vein د صدر د جدار او قطني برخي د علوي قسمت وریدي وینه جمع کوي. دا ورید د Sup. vena cava او Inf. vena cava ترمینځ ارتباطي چینل قایموي.


Azygos vein د Right ascending lumbar vein، Right Lumbar azygos vein د Right subcostal vein د یوځاي کیدو په نتیجه کي جوړیږي.

Lumbar azygos vein په حقیقت کي د Azygose vein بطني قسمت تشکیلوي دا ورید د قطني فقراتو په بني خواکي قرار لري ددي ورید سفلي نهایت د Inf vena cava سره ارتباط لري. Azygose vein د سيني جوف ته د حجاب حاجز د Aortic opening له لاري داخل او د سيني په جوف کي تر څلورمي صدري فقري پوري پورته کیږي او د څلورمي صدري فقري برابر د بني سږي د Root لپاسه د یو قوس په شکل قدام خواته دور خوري او د Sup vena cava سره یوځاي کیږي.



۴۶- شکل





۴۷- شکلونه

ارتباطات

A- په قدام کي مري او Right posterior intercostal arteries

B- په خلف کي بنکتنی اته صدري فقرات

C- په بني خوا کي بني سږي او پلورا او Greater splanchnic nerve

D- په چپ خوا کي : په سفلي کي Thoracic duct او Aorta په علوي کي مري , تراخيا

او Right vagus nerve

TRIBUTARIUS

1- Right superior intercostal vein

نوموړي وريد د دوهم او دريم Posterior intercostal وريدو له يوځاي کيدو مينځ ته راځي.

2- د بني طرف څلورم څخه تر يولسم خلفي بين الضلعي وريدونه.

Hemiazygos vein -3

Accessory hemiazygos vein -4

5- څو عددده Oesophageal ، Mediastinal او Pericardial وريدونه.

Right subcostal vein -6

Right ascending lumbar vein -7

Right lumbar azygose vein -8

THE HEMIAZYGOSE VEIN: دي وريد ته سفلي Hemiazygos vein هم ويل كيږي دا وريد د Left renal vein له خلفي قسمت او يا هم د Left ascending lumbar , left lumbar azygose او Left subcostal وريدو له يوځاي كيدو مينځ ته راځي دا وريد وروسته له منشاء نه د حجاب حاجز چپ سويق سوري كوي او د سيني په جوف كي د ستون فقرات په چپ خواكي سیر لري د نهمي صدري فقري برابر بني خواته خپل سير بدلوي د Aorta ، مري او Thoracic duct له شانه تیر او د Azygos vein سره يوځاي كيږي.

TRIBUTARIUS

Left ascending lumbar vein -a

Left subcostal vein -b

Nine to 11th left post. intercostal veins -c

Left lumbar azygose vein -d

ACCESORY HEMIAZYGOSE VEIN: دا وريد د Sup. hemiazygos vein په نوم هم ياديږي دا وريد د څلورمي يا پنځمي بين الضلعي مسافي په انسي نهايت كي شروع د ستون فقرات په چپه خواكي بنسخته تراتمي صدري فقري پوري امتداد مومي د اتمي صدري فقري برابر بني خواته د Aorta او Thoracic duct په خلف كي سير اختياروي او بالاخره Azygos vein سره يوځاي كيږي.

TRIBUTARIUS

Five to 8th left post intercostal veins -a

Left bronchial veins -b

INTERCOSTAL VEINS-E: بين الضلعي وريدونه په دوه گروپو ويشل شوي دي

Ant. inter costal veins -a

Post. intercostals veins -b

Ant. inter costal veins -a: نوموړي وريدونه په پورتنیو نهو بين الضلعي مسافو كي قرار لري او په هره بين الضلعي مسافه كي دوه وريدونه د مربوطه بين الضلعي شريان سره

یوځای سیر لري د پورتنیو شپږو بین الضلعي مسافو وریډونه د مربوطه طرف په Internal thoracic وریډ کي او د لاندینیو دري بین الضلعي مسافو وریډونه د مربوطه طرف په Musculophrenic vein کي تخلیه کیږي.

Post. intercostal veins -b: د نوموړو وریډو تعداد په هره خوا کي یو لسو عددو ته رسیږي په دي معني چه په هره بین الضلعي مسافه کي یو Post. intercostal وریډ قرار لري.

هر یو د دي وریډو د مربوطه بین الضلعي مسافي Post. intercostal شریان او عصب سره د همدی بین الضلعي مسافي د پورتنی ضلعي په سفلي کنار کي داسي سیر لري چه له پورته نه لاندی خواته اول وریډ بیا شریان او تري لاندی عصب سیر لري (VAN) د Post. intercostal وریډو خاتمه په بني او چپ خوا کي سره فرق لري چه په لاندی جدول کي واضح کیږي.

VEINS OF THE LOWER LIMB/ABDOMIN AND PELVI


VEINS OF THE LOWER LIMB: د سفلي طرف وریډونه عیناً لکه د علوي طرف وریډو غوندي یا سطحی وي یعنی د Deep fascia لپاسه په Subcutaneous tissue کي موقعیت لري او یا خو هم عمیق وي یعنی د Deep fascia لاندی د سفلي طرف د شریانو سره یوځای د عضلاتو ترمینځ موقعیت لري. دواړه گروهه د وریډو د Valves لرونکي دي.

Superficial veins of the lower limb: د سفلي طرف سطحی وریډونه عبارت دي له:

Dorsal venous arch (a)

Long (Great) saphenous vein (b)

Short (Small) saphenous vein (c)



۴۸ - شکلونه

DORSAL VENOUS ARCH: نوموړي وريدي قوس د خپي په Dorsal surface کې د پوستکي لاندې د Metatars هډوکو د سرونو برابر په Subcutaneus نسج کې موقعیت لري.

نوموړي شرياني قوس په انسي کې Long saphenous vein سره او په وحشي کې د Short saphenous vein سره ارتباط لري.

د خپي ټوله وريدي وینه له يوي خوا د خلورو Dorsal metatarsal وريدو پواسطه چه هر يو ددي وريدو ددوه عدده Dorsal digital وريدو د يوځاي کيدو په نتيجه کې جوړېږي په دي قوس کې تخليه کېږي او له بلې خوا د Communicating وريدو پواسطه چه دا وريدونه د خپي د تلي نه د بين العظمي فاصلو له لاري د خپي Dorsal سطحي ته تيريږي په دي وريدي قوس کې تخليه کېږي.

LONG SAPHENOUS VEIN: نوموړي وريد د خپي په Dorsal surface کې د خپي د Dorsal venous arch د انسي نهايت او Medial marginal vein له يوځاي کيدونه مينځ ته راځي او د Med. malleolus په قدام کې د پنډې خواته پورته کېږي د پنډې په 1/3 سفلي برخه کې نوموړي وريد په مايل ډول د Tibia د انسي سطحي په امتداد پورته سير لري د پنډې په 2/3 علوي برخه کې نوموړي وريد د Tibia هډوکي د انسي کنار په امتداد د Knee joint خلفي انسي قسمت کې پورته سير اختياري Saphenous opining ته له رسيدو بعد د ورانه د انسي قسمت عميق صفاق سوري کوي او په Femoral vein کې تخليه کېږي د يادوني وړه چه Saphenous opening ته نژدې لاندې وريدونه په دي وريد کې تخليه کېږي.

1- Superficial circumflex iliac vein

2- Superficial epigastric vein

3- Superficial external pudental vein

د Long saphenous vein سره يوځاي Saphenous nerve هم سير لري. نوموړي وريد تقريباً د 10-15 پوري Valves لري چه دا Valves د وريدي ويني له معکوس جريان نه جلوگیری کوي ددي Valves له جملې نه يو Valve هميشه په Saphenofemoral junction کې موجود وي ددي Valve عدم کفايه د نوموړي وريد د توسع او معوج کيدو

باعث کیږي او په نتیجه کې Varicose vein تاسس کوي له بلي خوا دا وريد د سفلي طرف د عميکه وريدو سره د Perforating وريدو پواسطه ارتباط لري.

دري عددده Perforating veins د Ankle joint نه لږ پورته يو Perforating وريد د Knee joint نه لږ لاندې او يو عدد د Adductor canal په برخه کې وجود لري. Perforating وريدونه د Valve لرونکي دي چه له سطحي وريدو نه عميکه وريدو ته د وينې د جريان اجازه ورکوي ددي وريدونو د والونو عدم کفايه هم د Varicose vein لپاره زمينه برابروي.

SHORT SAPHENOUS VEIN: نوموړي وريد د خپي په Dorsal سطحه کې د Dorsal venous arch د وحشي نهايت او Lateral marginal vein له يوځاي کيدونه مينځ ته راځي نوموړي وريد د Lat malleolus له شانه د پنډې خلفي قسمت ته تير او د Achill وتر په وحشي خوا کې پورته تير او بيا د پنډې په خلف کې د Popliteal fossa تر سفلي قسمت پوري پورته کېږي په Popliteal fossa کې د پنډې عميق صفاق سوري کوي او په Popliteal vein کې تخليه کېږي ددي وريد سره يوځاي Sural nerve سير لري دا وريد د Great saphenous vein او هم د پنډې د عميکه وريدو سره ارتباط لري.

DEEP VEINS OF THE LOWER LIMB: دا وريدونه چه د سفلي طرف د شريانو سره يوځاي د سفلي طرف Deep fascia لاندې د عضلاتو تر مينځ سير لري عبارت دي له:

Ant./Post. tibial veins ، Peroneal vein ، Popliteal vein او Femoral vein څخه. Ant/Post tibial veins د پنډې په قدامي او خلفي قسمتو کې پورته سير لري او بالاخره د Popliteus muscle په سفلي کنار کې سره يوځاي کېږي او Popliteal vein جوړوي دا وريد په Popliteal fossa کې د Popliteal art له شانه تير او ددي شريان په وحشي خوا کې قرار نيسي او بيا نوموړي وريد د Adductor magnus عضلي سوري نه تير او د ورانه انسي قسمت ته داخل او د ورانه په انسي قسمت کې د Femoral vein په نوم پورته اول د شريان په وحشي خوا بيا په خلف او په اخر کې د شريان په انسي کې قرار نيسي نوموړي وريد د Ing. ligament له شانه تير او بطن ته داخليږي چه د Inguinal lig له خلفي برخې نه پورته نوموړي وريد د Ext. iliac vein په نوم امتداد پيدا کوي.

VEINS OF THE ABDOMIN AND PELVIC

THE EXTERNAL ILIAC VEIN: دا وريد په حقيقت كې د Femoral vein ادامه دي چه د Inguinal lig له خلفي برخې نه د Sacroiliac joint تر قدامي قسمت پوري امتداد لري. د حوصلي په څنډه كې (د Sacroiliac joint په قدامي سفلي قسمت كې) د Int iliac vein سره يوځاي كيږي او په نتيجه كې Common iliac vein جوړوي په دې وريد كې لاندي وريدونه تخليه كيږي.

- Inf. epigastric vein
- Deep circumflex iliac vein
- Pubic vein

THE INTERNAL ILIAC VEIN: نوموړي وريد د Int iliac art په خلفي انسي قسمت كې پورته سير لري. د حوصلي په څنډه كې (د Sacroiliac joint په قدامي سفلي قسمت كې) د External iliac vein سره د يوځاي كيدو په نتيجه كې Common iliac vein جوړوي. **TRIBUTARIES:** هغه وريدونه چه په Int. iliac vein كې تخليه كيږي په لاندي ډول دي.

(A) هغه وريدونه د حوصلي د جدار د داخلي او خارجي برخو نه نشئت كوي.

- Sup. gluteal vein (a)
- Inf. gluteal vein (b)
- Internal pudendal vein (c)
- Obturator vein (e)
- Lat. sacral vein (f)

(B) هغه وريدونه چه د حوصلي د احشاو نه نشئت كوي.

Rectal venous plexus (a): دغه وريدي ضفيره د Rectum چارپير ساحه احاطه كوي او ددوه برخو لرونكي ده چه Internal part ئي د ركتوم د عضلي طبقي لاندي او Ext. part ئي د ركتوم د عضلي طبقي لپاسه قرار لري.

Internal part ئي د Anal canal په چپ وحشي، بني قدامي وحشي او بني خلفي وحشي برخو كې په نارمل ډول لږ څه متوسع دي. ددې وريدي ضفيري Int. part په Sup. rectal vein كې تخليه كيږي لکن Ext. part سره يو وسيع ارتباط لري.

Ext. part علوي برخه د Sup. rectal vein له لاري په Inf. mesenteric vein كې متوسطه برخه ئي د Middle rectal vein له لاري په Int. iliac vein كې او سفلي برخه ئي د Inf. rectal vein له لاري په Int. pudendal vein كې تخليه كيږي.

چون Sup. rectal vein په Inf. mesenteric vein کې تخلیه کیږي او دا اخري وريد د Portal vein له شعباتو نه ده او له بلي خوا Portal vein والونه نلري او دا وريدي ضفیره په یو سست منضم نسج کې قرار لري نو له هره سببه چه Intra abdominal presser او یا دا چه په Portal vein کې فشار زیات شي د فشار زیاتوالي ددي باعث کیږي چه Internal part ددي وريدي ضفيري په چپ وحشي، بني قدامي وحشي او بني خلفي وحشي برخو کې توسع پیدا کړي او په نتیجه کې Int hemorrhoid تاسس وکړي (له بیرون نه دا متوسع ځایونه د ساعت د اوو بجو، یولسو بجو او دري بجو سره سمون خوري)

Prostatic venous plexus (b): دا وريدي ضفیره د Vesical veins له لاري په Internal iliac vein کې تخلیه کیږي.

Vesical venous plexus (c): د Vesical veins له لاري په Internal iliac vein کې تخلیه کیږي.

Uterine venous plexus (d): د Uterine وريدو له لاري په Internal iliac vein کې تخلیه کیږي (په بنځو کې)

Vaginal venous plexus (e): د Vaginal وريدو له لاري په Int. iliac vein کې تخلیه کیږي.

COMMON ILIAC VEINS: د هر طرف Common iliac vein د مربوطه طرف Sacroiliac joint په قدام کې د Ext iliac vein او Int iliac vein له یوځاي کیدو څخه مینځ ته راځي هر یو ددوي پورته او انسي خواته په مایل ډول سیر لري د پنځمي قطني فقري په بني خوا کې دواړه سره یوځاي کیږي او په نتیجه کې Inf vena cava جوړوي چپ طرف Common iliac vein د بني په نسبت اوږد او زیات مایل دي په هر یو ددي وريدو کې Iliolumbar او Lat. sacral وريدونه تخلیه کیږي ددي نه علاوه په چپ طرف Common iliac vein کې Median sacral vein هم تخلیه کیږي Common iliac vein والونه نلري.

THE INF. VENA CAVA: نوموړي وريد د بدن د هغه برخې وريدي وینه چه له حجاب حاجز نه لاندې قرار لري بني دهلیز ته انتقالوي نوموړي وريد د بني او چپ Common iliac وريدو له یوځاي کیدو نه د پنځمي قطني فقري د جسم په قدام او د Right common iliac په خلف کې جوړ او د ستون فقرات په قدام کې د بطني ابهر په بني خوا کې پورته سیر

لري او د اتمي صدري فقري برابر د حجاب حاجز د Caval opening له لاري تير او د صدر جوف ته داخلېږي او بالاخره فووه ئي د بني دهليز په خلفي سفلي برخه كي بني دهليز ته خلاصېږي ددي وريد د دهليزي فوهي په چپ قدامي قسمت كي يو Semilunar valve وجود لري چه په كاھلانو كي لږ متبازاويي وظيفي دي او په نوزادانو كي بڼه متبازاو لرونكي د وظيفي دي بيدون له دي Valve نه دا وريد په بل ځاي كي Valve نه لري.

TRIBUTARIES : لاتدي وريدونه په I.V.C كي تخليه كيږي.

1- (R/L) Hepatic veins

2- Right suprarenal vein (چپ Suprarenal vein په چپ Renal vein كي تخليه

كيږي)


3- (R/L) Renal veins

4- Right testicular or ovarian vein (چپ ئي په Left renal vein كي تخليه كيږي)

5- بني Inf. phrenic vein (چپ ئي په Left renal vein كي تخليه كيږي)

6- څلور عدده قطني وريدونه

7- (R/L) Common iliac veins



49 شکل

THE PORTAL VEIN

دا وريد د هضمي جهاز له وريدو څخه مهم وريد دي چه تقريباً اته ساتي متره اوږدوالي لري. نوموړي وريد د پانكراس د غاړي شاته د Splenic او Sup mesenteric وريدوله يوځاي كيدو مينځ ته راځي چه وروسته له منشاء څخه پورته او لږ بڼي خواته اول د پانكراس د غاړي شاته او بيا د اثنا عشر د اولي قطعي شاته او په اخر كي د Lesser omentum په بڼي ازاد كنار كي سيراختياړوي پورتا هپاتس ته نژدي په دوه شعبو ويشل

کيږي چه عبارت د بني او چپو شعباتو څخه دي. Portal vein ئي نظر ددي وريد سير ته په دري برخو ويشلي دي چه عبارت دي له Retroduodenal، Infraduodenal او Supraduodenal قسمتو څخه. کوم وخت چه د پورتال وريد نهائي شعبات جگر ته داخل شي يوه شعبه ئي د جگر د بني لوب خواته او بله شعبه ئي د جگر د چپ لوب خواته ورځي په داخل د جگر کي د پورتال وريد دواړه شعبات په متعددو شعباتو ويشل کيږي چه هره شعبه ئي د جگر له يو جيوپ (Sinusoide) سره ارتباط لري چه بيا دا جيوپونه بالاخره د هيپاتيک وريدو له لاري په I.V.C کي تخلیه کيږي د پورتال وريد پواسطه د هضمي قنات د بطني برخي، کيسه صفرا، پانکراس او توري وينه جمع کيږي او هغه جگر ته انتقالیږي.

Tributaries

1-Splenic vein: ددي وريد يوه عمده شعبه د Inf. mesenteric vein څخه عبارت ده.


2-Sup. mesenteric vein

3-Left gastric vein

4-Right gastric vein

5-Para umbilical veins (د پورتال وريد په Left branch کي تخلیه کيږي)

6-Cystic vein (د پورتال وريد په Right branch کي تخلیه کيږي)



۵۰-شکل

PORTAL SYSTEMIC COMMUNICATIONS

د پورتال وريد او سيستمیک وريدو ترمينځ مهم ارتباطات په لاندې ډول سره دي.

1-Umbilicus: د بطن د قدامي جدار وريدونه (سيستمیک) د Paraumbilical وريدو (پورتال) سره د نامه په شاوخواکي تفمّم کوي چه په نتيجه کي د پورتال وريد او سيستمیک وريدو ترمينځ ارتباط برقراريزي. په Portal hypertension کي د Umbilical ناحي چارپير وريدونه برجستگي پيدا کوي چه د Caput medosa په نوم ياديږي د داخلي له نظره د جگر د افاتو يوه مهمه کلينيکي علامه بلل کيږي.

- 2- Lower end of oesophagos: د چپ گاستریک وریډ (پورتال) اخري شعبات کوم چه د مري سفلي قسمت پوري رسيږي د Accessory hemiazygos vein (سیستیمیک) د فرعي شعباتو سره تفمم کوي چه د پورتال هیپرتینشن په صورت کي Oesophageal varices پیدا کوي. او کیدای شي چه دا وریس په هیما تیمیزس منتج شي.
- 3- Anal canal: په انال کانال کي Sup. rectal vein (پورتال) د Inf./Middle rectal veins (سیستیمیک) سره تفمم کوي. چه د پورتال هیپرتینشن په صورت کي ممکن د بواسيرو په پیدا کیدو منتج شي.
- 4- Bare area of the liver: د جگر په Bare area کي د جگر واړه وریډونه چه اصلاً د پورتال وریډ شعبات دي د Phrenic او Intercostal وریډو سره چه سیستمیک وریډونه دي تفمم کوي او په نتیجه کي د پورتال وریډ او سیستمیک وریډو ترمینځ ارتباط قایمېږي.
- 5- Post abdominal wall: د بطن په خلفي جدار کي د بطن Retroperitoneal اعضاؤ لکه د اثنا عشر، صاعده کولون او نازله کولون وریډونه (پورتال) د بطن د خلفي جدار له Retroperitoneal وریډو او د پښتورگي د محفظي له وریډو (سیستیمیک) سره تفمم کوي او دا تفمم د دي باعث کیږي چه پورتال وریډ له سیستمیک وریډو سره ارتباط پیدا کړي.

خلورم فصل

LYMPHATIC SYSTEM

نوموړې سیستم اصلاً د لمفاوي او عیو او لمفاوي عقداتو څخه چه د لمفاوي او عیو په مسیر کې قرار لري تشکیل شوي ده د لمفاوي سیستم پواسطه اجنبي زرات، بکتریاوي او نور مضره مواد له انساجو نه د لمف سره یوځای چه سپین رنگه شفافه مایع ده او په انساجو کې تولیدیږي ښکل کیږي.

د لمفاوي او عیو پواسطه دا وظیفه داسې اجراء کیږي چه د وجود په ټولو انساجو کې په استثنی دا پیدرمس، وینبتانو، نوکانو، د سترگو قرني، غضروفونه، دماغ او د هډوکو مغز لمفاوي او عی وجود لري د لمفاوي شعریه او عیو پواسطه لمف (Intra organic) (داخل نسجي) لمفاوي او عیو ته اوله Intra organic لمفاوي او عیو نه اول Extra organic لمفاوي او عیو او په تعقیب ئې Collecting لمفاوي او عیو ته انتقالیږي. د Collecting lymphatic vessels په مسیر کې لمفاوي عقدات قرار لري هغه Collecting lymphatic vessels چه لمفاوي عقداتو ته داخلېږي د Afferent lymphatic vessels په نوم او کومې چه تري خارجېږي د Efferent lymphatic vessels په نوم یادېږي.


د څو عددو Collecting lymphatic vessels له یوځای کیدو نه Lymphatic trunk مینځ ته راځي چه د سفلي طرف او حوصلي لپاره اساسي لمفاوي جذع (Trunk) د Lumbar trunk نه عبارت دي چه دا لمفاوي جذع د Abdominal aorta او Inf vena cava چارېږ چه کوم لمفاوي عقدات قرار لري د هغوي د Efferent lymphatic او عیو له یوځای کیدو نه مینځ ته راځي.

د علوي طرف لمفاوي جذع د Subclavian trunk نه عبارت ده کومه چه د Subclavian vein په امتداد سیر لري، د سر او غاړې لپاره لمفاوي جذع د Jugular trunk نه عبارت ده چه د Int. jugular vein په امتداد سیر لري، د Thoracic cavity لپاره یوه جوړه لمفاوي جذع چه د Brachiomediastinal trunk په نوم یادېږي. وجود لري. کله کله په Abdominal cavity کې Inestinal lymphatic trunk د مشاهدي وړوي دا ټولي جذعي

بالاخره په دوه Lymphatic ducts کې راجمع کېږي چه عبارت دي له Right lymphatic duct او Thoracic duct څخه.

دا پورته دواړه Ducts بالاخره په ترتيب سره په Left brachiocephalic vein او Right subclavian vein کې تخليه کېږي.

مخکې له دې چه لمف د پورته دواړو ډکټو له لاري په وريدي دوران کې داخل شي د څو عدده لمفاوي عقداتو چه د دې او عيو په مسير کې قرار لري تيريږي نوموړي لمفاوي عقدات يا په تنهائي ډول او يا هم په گروپي ډول قرار لري هره لمفاوي عقده يا مدوره يا بيضوي شکل لري. هر لمفاوي عقده د يو Capsul پواسطه احاطه شوي او د همدې کپسول له داخلي سطحي نه د Trabacula پنوم صفحات نشته کوي د Trabacula صفحاتو په مينځ کې Lymphoid tissues قرار لري د Lymphoid tissue او د Trabacula د صفحاتو تر مينځ خلاوي وجود لري چه د Lymphoid sinuses په نوم ياديږي.




۵۱- شکل

نوټ: Lymphatic capillary د Intra organic او عیو سره داسي فرق کيږي چه Intra organic او عي Valves لري او Lymphatic capillary او عي Valves نلري.

لمفاوي عقداتو ته د Afferent lymphatic او عیو پواسطه لمف راوړل کيږي او ددي او عیو فوحي همدا Sinuses ته خلاصیږي د هریو Lymphatic sinuses په جدار کي مخصوص حجرات د Macrophages په نوم وجود لري او دا Macrophages حجرات د لمفاوي عقداتو په داخل کي د Phagocytosis عملیه په مخ وړي په دي معني کومي باکتریايي یا نور اجنبي مواد چه د لمف سره یوځاي د Afferent lymphatic او عیو له لاري لمفاوي عقداتو ته داخلېږي هغوي بلع کوي له بلي خوا د لمفاوي عقدي د بلي برخي پواسطه چه Lymphatic tissue نومېږي Lymphocytes جوړېږي چه دا Lymphocytes د لمف سره یوځاي کيږي نوموړي لمف چه د Lymphocytes سره یوځاي شي بالاخره د لمفاوي عقدي د بلي برخي نه د Efferent lymphatic او عیو پواسطه خارجېږي.

لمفاوي عقدات له نورو Lymphoic organs څخه چه نوموړي اعضاء هم Lymphocytes تولیدوي لکه Spleen، Thymus gland، Tonsils او نور داسي تمیز کيږي چه دا اعضاء صرف Efferent lymphatic vessels لري او Afferent lymphatic او عي نلري. لمفاوي او عي په خپل سیر کي د څو عدده ناحیوي لمفاوي عقداتو نه تیرېږي. د لمفاوي عقداتو تراکم اکثراً د وجود په متحرکو ځایو کي زیات وي مثلاً په سفلي طرف کي په Popliteal fossa او Groin کي په علوي طرف کي په Elbow joint او Fossa axilaris کي او همدارنگه په هغه ځاي کي چه رقبی ناحي فقراتو او Lumbar فقراتو ته نژدي قرار لري. ددي نواحيو حرکت ددي باعث کيږي چه لمف په اساني سره د لمفاوي عقداتو له مینځ نه تیر شي.



۵۲- شکل

THE THORACIC DUCT

Thoracic duct تقریباً اته دیرش سانتی متره خخه تر پنځه څلوینست سانتی متره پوري اوږدوالي لري او دا Duct په حقیقت کې د Right lumbar lymphatic trunk او Left lumbar lymphatic trunk له یوځای کیدونه د دوهمې قطنې فقرې د جسم په قدام کې شروع او د غاړې تریخ پوري امتداد لري. په ځینې کسانو کې Intestinal lymphatic جذع هم موجود وي چه ددي Trunk د موجودیت په صورت کې نوموړي Trunk په Left lumbar lymphatic trunk کې او کله کله په Right lumbar lymphatic trunk کې تخلیه کیږي.

Thoracic duct د منشاء په برخه کې یوه اندازه توسع لري چه دا متوسع برخه ددي Duct د Cisterna chyli په نوم یادېږي دا توسع تقریباً په دوه څلوینست فیصده کسانو کې د مشاهدې وړنه وي (د روسي ساینسدان Zhodanow د نظر په اساس) Thoracic duct د سینې صندوقچې ته د Aortic opening له لارې داخلېږي د سینې په صندوقچه کې دا Duct د ستون فقرات په قدام د Thoracic aorta په بڼې خواکې او د


مري شاته پورته سير لري. دا Duct د Aortic arch له شانته تير او د اوومې رقبي فقري برابر يوقوس جوړوي چه بالاخره د Int. jugular vein او Left subclavian vein د Junction په ځاي کي ددي Duct فوهه د Left brachiocephalic vein لومن ته خلاصيري.

د Thoracic duct په پورتنې قسمت کي دري عدده لمفاوي جذعي تخليه کيږي نوموړي جذعي عبارت دي له:

1- Left bronchiomediastinal trunk: نوموړي جذع د Thoracic cage د جدار د نيمائي چپي برخي او د Thoracic cavity د نيمائي چپي برخي د اعضاؤ لمف په Thoracic duct کي تخليه کوي.

2- Left subclavian trunk: د نوموړي جذعي له لاري د چپ علوي طرف لمف په Thoracic duct کي تخليه کيږي.

3- Left jugular trunk: ددي Trunk له لاري د سر او غاړي د نيمائي چپي برخي لمف Thoracic duct کي تخليه کيږي.



۵۳- شکل


THE RIGHT LYMPHATIC DUCT

دا Duct تقريباً د لس ملي متره څخه تر دولسو ملي مترو پوري اوږدوالي لري نوموړي ډ کټ په Right subclavian ورید کي تخلیه کيږي. دا Duct د لاندې لمفاوي جذعوله يوځاي کيدونه مينځ ته راځي.


1- Right jugular lymphatic trunk: نوموړي جذع د سر او غاړي د نیمایي بني خوا لمف دي Duct ته رانقلوي.

2- Right subclavian lymphatic trunk: دا جذع د بني علوي طرف Lymph نوموړي Duct ته رانقلوي.

3- Right bronchiomediastinal lymphatic trunk: د سيني د جدار د نیمایي بني خوا او همدارنگه د سيني د صندوقچي د نیمایي بني خوا د ساختمانو لمف دي Duct ته رانقلوي.



۵۴- شکل



۵۵- شکل

ماخذونه (Referencess)

**1- Chaurasia BD Human Anatomy Regional and Applied CBS
PUBLISHERS AND DISTRABUTERS
4569/1A,11-Daryagani,new dehli- 110002(India)
Fifth Edition 2010.**

**2- Chaurasia BD Human Anatomy Regional and Applied CBS
PUBLISHERS AND DISTRABUTERS
4569/1A,11-Daryagani,new delhi- 110002(India)
Third Edition 2004**

**3- Chaurasia BD Human Anatomy Regional and Applied CBS
PUBLISHERS AND DISTRABUTERS
4569/1A,11-Daryagani,new dehli- 110002(India)
Third Edition 2001.**

**4-GRAY'S Anatomy for Students
Rechard L. Dark
Wayne Vogl
Adam W.M. Mitchell
Charchill livingstone Elsevier Inc
First published 2005**

**5- Henry-GRAY'S Anatomy
Charchill livingstone Elsevier Inc
EDINBURGHLONDON MELBOURNE and YORK
Fortieth Edition 2009.**

**6- Henry-GRAY'S Anatomy
Charchill livingstone
EDINBURGHLONDON MELBOURNE and YORK
Thirty Seventh Edition 1989.**

7- Snil. S.Rechard Clinical Anatomy By Regions Ninth Editon 2012.

**8- Snil. S.Rechard Clinical Anatomy for Medical Students
Third Editon 1989**

Book Name	Anatomy of Cardiovascular System
Author	Dr M Nasir Nasraty
Publisher	Nangarhar Medical Faculty
Website	www.nu.edu.af
No of Copies	1000
Published	2015
Download	www.ecampus-afghanistan.org

This Publication was financed by German Aid for Afghan Children, a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and Technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul

Office 0756014640

Email textbooks@afghanic.org

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2015

Sahar Printing Press

ISBN978 9936 500 563

Publishing Medical Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For this reason, we have published 156 different medical textbooks from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh and Kapisa medical colleges and Kabul Medical University. Currently we are working to publish 20 more medical textbooks for Nangarhar Medical Faculty. It should be mentioned that all these books have been distributed among the medical colleges of the country free of cost. All published medical textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states:

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashtu. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state – of – the – art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashtu is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit.”

The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of Higher Education Institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan universities, lecturers & students want to extend this project to the non-medical subjects e.g. Science, Engineering, Agriculture, Economics, Literature and Social Science. It should be remembered that we publish textbooks for different colleges of the country who are in need.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to the medical colleges free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to **Kinderhilfe-Afghanistan** (German Aid for Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 60 other medical textbooks in the past three years which are being used by the students of Nangarhar and other medical colleges of the country. Dr. Eroes has made funds available for 20 additional books which are being printed now.

I am especially grateful to **GIZ** (German Society for International Cooperation) and **CIM** (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me during the past five years in Afghanistan.

In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister, Prof. M Osman Babury and Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Prof. Dr. Gul Hassan Walizai, Dean of Nangarhar Medical Faculty Dr. Khalid Yar as well as Academic Deputy Dr. Hamayoon Chardiwal, for their continued cooperation and support for this project.

I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Subhanullah in the office for publishing books.


Dr Yahya Wardak

Advisor & CIM-Expert at the Ministry of Higher Education

Kabul/Afghanistan, January, 2015

Office: 0756014640

Email: textbooks@afghanic.org



د پوهنمل دوكتور محمد ناصر (نصرتي) لنډه پيژندنه

محمد ناصر (نصرتي) د شهيد نور محمد زوی چې په ۱۳۳۷ ل-ل کال کی د لغمان ولایت د علینگار ولسوالۍ د سنگره کلی په یوه دینداره کورنۍ کی سترگی دی فانی دنیا ته غړولی دی. ابتدائی او ثانوی زده کړې ئی د لیسې دوری تر ختمیدو پوری د لغمان ولایت د علینگار ولسوالۍ د شیخ محمد حسین (ع) په عالی لیسې کی په ۱۳۵۵ ل-ل کال کی پای ته رسولی او په ۱۳۵۶ ل-ل کال کی د کانکور ازموینې له لاری د کابل طب پوهنځی ته د ښو نمر و په اخیستلو کامیاب شواو په همدی کال کی ئی د کورنی اقتصادي مشکلاتو له کبله د ننگرهار طب پوهنځی ته تبدیلی وکړه.

په ۱۳۵۹ ل-ل کال کی ئی د وخت د حکومت د بی تجربه غړو د فشارونو او تهدیدونو له کبله تحصیل پرېښودو او وطن پرېښودو ته مجبور شو په ډیر افسوس باید وه وایم چی نه یوازی ده بلکه دده په شان ډیر په وطن مین او په علم سنبال دغریبو او بی وزلو افغانانو بچیان یا ددوی د مریمو ښکار او یا هم تحصیل او وطن پرېښودنی ته اړ شول.

محمد ناصر (نصرتي) تقریبا تر لس کاله اوږده انتظاره وروسته په ۱۳۶۸ ل-ل کال کی چی کله هم د افغانستان اسلامي پوهنتون تاسیس شو د خپلو کورنی مشکلاتو سره سره له تعلیم سره د مینې په لرلو طب پوهنځی ته د شاملیدو فورم ډک کړ ترڅو خپلی نیمگړی زده کړی سرته ورسوی د امتحان له ورکولو وروسته د افغانستان اسلامي پوهنتون د طب پوهنځی ته شامل شو چی په طب پوهنځی کی ئی په هر سمستر کی د ښو نمر و په اخیستلو بالاخره په ۱۳۷۲ ل-ل کال کی د ستاژ دوری له تکمیل وروسته د یاد پوهنتون د طب له پوهنځی څخه په اعلی درجه فارغ شو له فراغت نه سمدستی وروسته د افغان مهاجرینو په مرکزی روغتون کی د جراحی په څانگه کی د معالج ډاکتر په حیث مقرر شو تر ۱۳۷۵ ل-ل کال پوری ئی په یاد روغتون کی په پوره ایمان داری دنده ترسره کړه او په همدی کال کی د وزارت صحت عامی له خوا د تغذیه په برخه کی د WHO په مالی مرسته د مصر عربی جمهوریت ته ولاړ چی په ۱۳۷۶ ل-ل کال کی ئی خپلی زده کړی پای ته ورسولی او بیرته همسایه ملک پاکستان ته راستون شو په همدی کال کی د افغانستان اسلامي پوهنتون د طب پوهنځی کی د کدر د شرایطو د پوره کولو له مخی د کدر امتحان له ورکولو وروسته د اناتومی په څانگه کی د ښو نمر و په اخیستلو د نامزد پوهیالی په حیث مقرر شو د نامزادی دوری له ختمیدو وروسته ئی په نوموړی پوهنتون کی ددی پوهنتون تر منحل کیدو پوری د استادۍ دنده اجرا کړه له هغی وروسته د افغان پوهنتون د طب پوهنځی د اناتومی څانگی د استاد په حیث او بالاخره له ۱۳۸۱ ل-ل کال نه راپدی خوا د ننگرهار د طب پوهنځی د اناتومی په څانگه کی د استادۍ دنده ترسره کوی د ننگرهار د طب پوهنځی د استادانو او محصلینو په مینځ کی خاص محبوبیت لری د درسی پروسې په ځواکی له ۱۳۹۰ ل-ل کال نه راپدی خوا د اناتومی څانگی د امر په حیث او همدارنگه د طب پوهنځی د علمی شورا غړي او ورسره د طب پوهنځی د کوریکولوم کمیټی د غړی په حیث دنده ترسره کوی.