

شمير پوهنه (رياضي)

د نهم ټولگي له پاره

ليکونکی:

ډاکټر ماخان (ميري) شينواري

Ketabton.com

2017

شمير پوهنه (رياضي)

د نهم ټولگي لپاره

ليکونکی:

ډاکټر ماخان (ميري) شينواري

برېښناپته:

smakhan1946@gmail.com

۴ - کرنیز برابر ونسیستم د ۲ ۱۱۹	سریزه ۴
۴ . ۱ - د مناسب ځواب تلنلار ۱۳۴	۰ - پروت ولاړ سیستم یا کواورد ... ۶
۵ - په محور هندارونه ۱۳۴	۱ - گردی (دایره) ۸
۵ . ۱ - سیومتری ۱۳۸	گردی هواره، - چاپیریال، - وړانگه، - ، نیمی، - دننه کونج، - منځهواره یا - دننه هواره، - گردی ټوټه، - گردی برخه، گردی کړی، د گردیو پروتځایونه یو بل ته، څو پیژندونه، گردی لینده، د گردی منځتیکونج، د کرنیو پروتځایونه و.ته.
۵ . ۲ - مرکزي متناظر ۱۴۰	۲ - ایلیپسی یا هگی (بیضوي) ، پیژند، د باغوان جوړونه، - چاپیریال، - منځهواره، - تمرینونه،
۵ . ۳ - دېرواره هندارونه ۱۴۱	۳ - کرنیزې څیرونی یا تابع ۳۸
۵ . ۴ - د وړنی - یا انتقالڅیرنه... ۱۴۲	۳ . ۱ - د محور غوڅتیکي ۴۲
۵ . ۵ - څرخون یا دوران ۱۴۳	۳ . ۲ - جگیدنه ۴۵
۵ . ۶ - په ټکي انعکاس ۱۴۵	۳ . ۳ - د تابعو د گراف رسمول ۴۹
۵ . ۷ - طیلاپیغوڅی ۱۴۹	۳ . ۴ - کلیمې او د انځورونو ډولون... ۵۱
۶ - درېگوډیکچ ۱۶۱	۳ . ۵ - کرنیز برابر ونونه.. ۵۲
۷ - مربع مساوات ۱۹۸	۳ . ۶ - پوښتنې ۵۹
۷ . ۱ - سوچه مربع مساوات ۱۹۸	۳ . ۷ - کرنیز توابع د ورکړ شو... ۶۱
۷ . ۲ - د مربع مساوات عمومي.. ۲۰۰	۳ . ۸ - تمرینونه ۶۷
۷ . ۴ - د $p-q$ فرمول ۲۰۵	۳ . ۹ - ځانگړی حالت ۶۸
۸ - ماتبرابرون ۲۲۳	
د مربع توابعو محورونو څټکي ۲۳۴	
ارزښت ۲۳۶	
د شینواري کتابونه او ژوند... ۲۵۱	

سريزه

دا نږدې څلوېښت کاله کيږي، چې زموږ هيواد هراړخيزه ستونزې لري او هر څه دي
اورده جنگ را خراب کړي

گرانو هيوادوالو!

د نورو نيمگړتياو په څير زموږ درسي نصاب - په تيره شميرپوهنه - هم ډېره د ناسمون
سره مخامخ ده.

که دا کار د دولت په څلورديوالي ونه شو، نو زه به وهڅيږم، چې دا ماليکلي کتابونه د ن
ج له لارې له تاسو سره شريک کړم او دا د نړۍ په ستاندارد.

د بنوونځي په کتابونو کې د ستاتيستيک او احتمالي درسي نور هم خورا ستونځمن دي،
چې زه ترې دلته تيريرم او د بنوونځي د تيرو کتابونو څخه هم هيله ده- که زما کتابونه
وراندي نه شو- چې دا برخې يا سمې يا له درسي نصاب څخه ووېستل شي. په دې برخه
باور وکړئ، چې نه ليکونکي بوهيري او نه بل لوستونکي پرې پوهيدلي شي.

زما په دې د بنوونځي کتابونو کې دا برخې نه شته، خو که وخت مې پيدا کړ دا به هم سمې
کړم. ما په دې هکله د احتمالي او ستاتيستيک کتابونه ژباړلي او همداسې مې په هندسه
کې هم احتمالي شميرنه راوړي او د ستاتيستيک يو کتاب مې هم ژباړلي، چې زه به يې
په مناسبوخت کې د ليدلو پټې گرانو لوستونکو ته د ن ج له لارې ورکړم.

دا زما ځنې کتابونه او په ډېره مننه د www.ketabton.com ن ج کې گرانو لوستونکو ته
وراندي شوي.

د شميرپوهنې سم اند يا منطق زموږ د نصاب په لسم ټولگي کې راغلی او هغه هم لکه
ستاتيستيک او ... د پوهيدلو نه دی. دا- لکه څنگه چې برېښي- دومره پېچلې نه دی، نو زه
دا درس له دې امله د اوم ټولگي په سر کې راوړم، هيله ده چې ستونځې به رامنځ ته نه
کړي.

زه چې ترڅو ستاسو په منځ کې وم او د کار یم، ستاسو چوپړ کې به اوسم. راځی، چې ستونځوبي (د ستونځو حل) سره شریک کړو.

زه دې لیکنو او پرې قضاوت کولو ته ځانله یم.

تکرار په کې زیات دی، خو د موضوع، نه د خودیونې. وایې چې تکرار د زده کړې مورده، نو پروا نه لري. کمښتونه هم په کې شته. سره د ټولو نیگرتیاوو دا د ښوونځي له پاره ډېره ګټوره او زه چې پوهیږم، یواځنی سمه لیکنه ده.

دا چې سمه لیکنه، د ځان له امله نه وایم، دگرانو زده کوونکو او ښوونکو له پاره وایم. دا زما لیکنې نه دي، دا ما له نورو کتابونو څخه رانیولې، چې باید سمې وي.

زه به وهڅیږم، چې درسمي ښوونځي کتابونو نا سمونونه له تاسو سره شریک کړم، خو ډېر لږ، یواځې داسې د یادونې له امله.

په ډېره خواشینی باید ووایم، چې ملاتړی نه لرم، چې د لیکنې ستونځې راته په ګوته کړي.

د نصاب د غړو څخه مې هیله ده، چې ګټه ترې پورته کړي او په بنسټ یې د ښوونځي لیکنې سمې کړي.

د خوندیونې ټیکایي کې پوښتنه نه شته، ځکه چې ما هم د نورو لیکنو څخه راټول کړي او هڅیدلی یم، چې سم یې ترې راوینسم.

باور وکړی زه د دې لیکنو سره لږ ستړی شوی یم، نو ځنې ځایونه به داسې نیمګړي پاتې وي، چې ستاسو پوهیدنې ته کوم زیان نه رسوي، د هغې بڅښنه دي وي.


کله تمرینونه کم وي او کله تکرار راځي، چې دا بد مه ګڼی.

په دې کتابونو ما دومره ځان بوخت کړی، چې باورکړی مغذ مې ترې نورمور دی، نو له دې امله یې پای نور پایوم یا ورته د پای ټکی ږدم.

کوارډینات سیستم

یادونه : کوارډینات سیستم څخه څمور هدف پروت ولاړ سیستم دی. دا په ادبیاتو کی په همدې نامه یادېږي. ما کله کله همدا دواړه ترمینولوژي کارولي هیله ده چي گران لوستونکی به پرې اشتباهي نه شی.

د شمیرپوهنې او همدا ډول د تخنیک په ډیرو څانگو کی د کوارډینات سیستم ډیر مهم رول لوبوي. په کارتیزي کوارډینات سیستم کی د هواړې هر ټکی P د خپلو دواړو کوارډیناتو (x, y) ورکولوسره کره یا ټیک ورکړ شوی دی. لمړی کمپوننت یا اېسڅیز (Abszisse) د x - ارزښت یا پروت ارزښت او دوهم کمپوننت یا اوږدینات (Ordinate) د y - ارزښت بلل کېږي یا ولاړ ارزښت. کارتیزي کوارډینات سیستم هواړه د دوه یو په بل نیغ ولاړ محورونو (لنډ: ولاړ محورونو) له لارې په څلورو برخویشي (څلورمې Quadranten) د کوارډیناتو نومره بندي یا نمره کول د ساعت



توگه اجازه نه لري چی بدل شي، ځکه چی دا کیموننتونه تنظیم شوې یا منظمه جوړه ده. د x محور ضرب لمرنی کیموننت د $-y$ محور څخه فاصله ټاکي دوم کیموننت د $-x$ محور څخه. که لمری کیموننت منفي وي، نو ټکی د $-y$ محور کین لور ته

تنجنت هغه کرښه ده، چې د دایرې د چاپیریال (محیط) سره یو ټکی شریک ولري. د تماس په ټکي کې وړانګه په تنجنت نیغه ولاړه ده، یا ولاړه ده. تنجنت: خطي که به محیط دایره فقط یک نقطه مشترک داشته باشد تنجنت گفته میشود. در نقطه تماس شعاع به مماس عمود است. مثال: در یک نقطه به خط منحنی دایره یک مماس رسم کنید. به خط در نقطه یک عمود رسم شود. این عمود مماس مطلوب میباشد. از یک نقطه که بیرون دایره واقع باشد، مماسی را رسم نمایید. خط و به ان دایره تالس را رسم میکنیم. نقاط و به دایره تالس به منحنی دایره نقاط تماس تانجنت هستند. یوه زاویه چې د دایرې په چاپیریال کې د یوه وتر مخامخ پرته وي د محیط زاویه بلل کیږي. د همغه وتر مخامخ چاپیریال زاویې سره برابري دي


د منځتکي هغه زاویه له کومې چې وتر بریښي منځتکي زاویه بلل کیږي. هغه زاویه چې په یوه پایتکي کې

۱ - گردی (دایره)

یادونه: ولی گردی؟ موربه چي په هسکه مینه شینوارو کي غوزان گڼل، نویوه بنده گرده کربنه مو وېستله او هغې ته مو گردی ویل. دا نومونه د افغانستان په ټولو یا زیاتو ځایونو کې شته، خو پښتانه کله خپل نومونه تخریبوي.

د یوې پيالي غاړه که رنگ کړی او هغه په یوه کاغذ کيږدی، څیره چي لاس ته راځي، څه ورته وایی؟

د یوې افغانی ژی، څه شکل لري؟

	پېژند یا تعریف د یوې سطحې یا هواري ټول هغه ټکي، کوم چي له یوه ټکي داسي په نامه منځتکي M څخه همغه واټن (فاصله) r (په نامه وړانگه یا شعاع) ولري، گردی لاین یا لنډ: گردی بلل کيږي (مخامخ څیره)
---	---

لیکنود یې (دا لیکنود په پیل کي ورځنی یا معمول نه دی، وروسته په تحلیلي هندسه کي راځي، خو دلته که وي هم تاوان نه وي):

$$k = \{ X \in E \mid |\overline{MX}| = r \}$$

لوستل یې: گردی ک د ټولو ټکو ایکس چي ایکس د اي توکی دی، ډېری ده، داسي چي..... دی.

گردی هواره او گردی چاپیری

په پام کی دی وي، چې د ټولو هغو ټکو ډېری یا سټ، چې له M څخه واټن (فاصله) یی له r څخه کوچنی یا د r سره برابر وي د دایرې سطحه بلل کیږي. (موخه یی گردی منځه‌واره ده یا ټیک: **گردیتوته**)

د وړانګې (شعاع) پیژند: لکه د مخه مو، چې په گوته کره، هغه کرښه چې د دایرې ژی یو ټکی د منځ ټکی سره تړي، هغه د دایرې وړانګه یا لنډ: وړانګه(شعاع) بلل کیږي، چې په r سره یې ښایو (پورته څیره وګوری).

د نیمې یا قطر پیژند: هغه کرښه، چې دایره په دننه کې نیموي د دایرې نیمې (قطر) بلل کیږي او په d سره یې په نخښه کوو (پورته څیره دې وکتل شي).

پیژند

د دایرې (گردی) دننه کونج یا ټول کونج یا پوره کونج 360° درجې لري.

گردیچاپیریال u د وړانګې r سره په لاندې ډول ورکړ شوی دی

$$u = d \cdot \pi = 2r \cdot \pi$$

او همداسې گردی منځ- یا دننه هواره A د وړانګې r سره په لاندې توګه ورکول کیږي

$$A = r^2 \cdot \pi = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

$$d = 2 \cdot \sqrt{\frac{A}{\pi}} = 2r$$

دا لاندې ورکړ شوی عدد «، پی π »، د دایرې عدد بلل کیږي

$$\pi = 3,14159265 \dots$$


یادونه: دا چې ما کله هواره یا سطحه په A یا F او π مې په Pi نخښه کړې، هیله ده چې دا به گرانو لوستونکو ته ستونځې پېښې نه کړي. په پورته کې ورکړ شوی د دایرې عدد (گردی گن) « π پی» گورو، چې بیرته راگرځیدونی دی. له دې امله یو ایراشنل عدد دی او د مات په څیر نه لیکل کیږي، بلکه له لسمیز (عشاریه) وروستی پریوډي یا تل بېرته راگرځېدونی ځیفر پرلپسې دی. په کارونه کې یی موږ نږدې شمېرني یعنې راگردونې ته اړ یا مجبور یو، ځکه چې د جېشمیري د عددونو ځایونو له امله، چې پای دي یا پوله لري یا رابند(محدود) دي.

څنگه سړی په دې بریالی شو چی دا عدد π پیدا کړي؟

دا لار دې په لاندې کی لنډه ورکړ شي:

دا له اربنیمدس څخه پیل کارونه (عملیه) یا تگلار داسی پیل کیږي، چی په دایره کی یوه مربع راگیروي یا رابنده وي او بالاخره یی په منځنیو ولاړو یا عمودونو سوکڅیسف یا یو په بل پسې ۸، ۱۶، ۳۲ او داسی نورو، لور یا جگ کړي یعنې په همغه وخت کی دوه برابره کړی.

څیره ۱۱۹



یوې گردۍ ته د یوه n -ګوډي له لارې نږدیونه (نزدې کیدنه)

څیرې ۱۱۹ بنای کړی.

	په مخامخ څیرو کې نهه ضلعي ورپسې شپږ ضلعي کښل شوي، دې ته گورو، چې څنگه گردۍ ته نزدې کیږي مخامخ څیره څو څوگودیز بریښي او ستره تری راتاو گردۍ مخامخ څیرو کې یوې دایرې ته د یوه n-ضلعي له لارې نږدیونه (نزدې کیدنه) کتل کیږي، هغه ۶۵۵۳۷ ضلعي، چې گورو نزدې یا ټیک دایره ده)
--	---

د زیاتیدونکي n سره کانتی یا ژی یا اړخونه (ضلعي) تل کوچني کیږي، چې پخپله له ۱۰۰ یا ۱۵۰ ورسونو ته په یوه پاڼه کی د کښلو یا رسمولو څخه وځي یا نه کښل کیږي، په همدې وخت کی د منځنۍ څخه د په همغه واټن د اضلاعو تعداد زیاتیږي (یعنی د مربع د اضلاعو د تعداد). د مربع پیلدایرې سره دا څیره تل نزدې کیږي. په

ورته توگه د دایرې چاپیریال او منځهواره هم همغه چاپیریالدايرې ته نژدې کيږي. د اضلاعو زیاتیدو سره د دایرې وړانگه هم لویيږي. د هغو چاپیریال او منځهواره تل همغه ډیر ضلعي او په همدې توگه د چاپیریالدايرې څخه. په روبښانه توگه لیدل کيږي چی د چاپیریالدايرې او د سطحې (منځ هوارې) د ناپای ډیر n ضلعو سره د n - ضلعي سره یوځای پریوځي یا یوځای کيږي.

په لاندې جدول کی د چاپیریال ارزښت او په همدې توگه د سطحې (منځهوارې ارزښت) د زیاتیدونکي n عدد سره ستابیل (په خپل حالت، چی ډیر تغیر په کی نه راځي) پیژندور دی:

n پیدایښتي گڼ	Un چاپیریال	F_n منځهواره
4	5,656854	2
8	6,122934	2, 828427
16	6,242890	3,061467
32	6,273096	3,121445
64	6,280662	3,136548
128	6,282554	3,140331
256	6,283027	3,141277
512	6,283145	3,141572
1024	6,283175	3,141572
2048	6,283182	3,141587
4096	6,283184	3,141591

وروسته به وکتل شي چی څنگه د گردی چاپیرال (دایرې محیط) او د دایرې هواره (سطحه) د درېگوډیو (مثلثونو) له لارې ټاکل کیدی شي

پیلبلکه:

د بانک مدیر ښاغلی سپین غواړي د کنفرانسونو لپاره یو د ښیښي میز جوړ کړي چی په هره لوري یی ۸ کسان ځای نیولی شي. ایا ددې لپاره یو میز چی ۲ متره نیمی (قطر) ولري بسیا کوي، که د یوه نفر لپاره له ۷۵ څخه تر ۸۰ سانتیمتره د میز په سور، ځای


په پام کی نیول شوی وي؟

داميز به څومره گران وي، که يو څلوری متر يا مترمربع د کار د معاش سره ۲۵۰ افغانی گران وي يا ۲۵۰ افغانی ارزښت ولري؟

دميز محيط (چاپيريال) دی $\pi \cdot 1m = 6,248m^2 = U$ په د هرکنفرانس برخوالو لپاره ۷۵ سانتي متره سرورځاي په پام کی وي، نو د محيط دی: $8.75 = 600cm$

د ۸۰ سانتي متره ځاي د نفر په سر $80.8 = 640cm$. قيمت وسطي يا منځ ارزښت يي $6,2m$ دی. پس د نېکو هيلو سره ټول کسان په مېز ځاي نيولی شي مېز دا سطحه (هواره) لري: $F = \pi \cdot 1m = 3142m^2$ او له دې امله $3,142.250 = 785,40$ يانې افغانی ارزښت لري..



په لاندې څيره کې کتل کيږي، چې د گردی منځهواره نږدې



$$A = r^2 \cdot \pi = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

ده (په پورته څيره کې د څيري کوچنيوالي له امله د گردی څيره لږ تخريب شوه، خو دا ستونځې پوهور دي)

گردښتوته ، گردبېرخه او گردیکړی

	ډیر وخت دننه- یا خونديگردي له چاپیریالگردي کوچنی وي. نو له دې امله د دوي په منځ کې یوه کړی منځ ته راځي، چې د هغې منځهواره د دواړو گردیو د کمون، کمښت یا توپیر څخه شمیرل کېږي.
	جمله: موږ دوه دایري لرو، چې د محاطي دایري وړانګه R او د محیطي دایري وړانګه r ده، نو د $F_K = \pi R^2 - \pi r^2$ $F_K = \pi(R^2 - r^2)$ $F_K = \pi(R - r)(R + r)$

بل ډول ېې: یوې د دایري کړی منځهواره ده $A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$

همداسې کیدی شي، چې د دایري محیط د دایري قطاع (د دایري برخې) د سور او دننه او دباندې گردی د نیمو څخه هم وشمیرل شي، چې په لاندې کې یې گورو:

$$A = (D - b) \cdot b\pi$$

$$A = (d + b) \cdot b\pi$$

پیلایلیک:

د سپین میز درز پیدا کړ. چې له غاړې یا ژۍ یې پنځه سانتي متره دننه لور ته ځغلي. بناغلی کړ او فکر کوي، چې که دامیز په پنځه سانتي متره کوچنی کړی. کومه میز سطحه پاتې کیږي او د دایري کړی چې له منځه ځي څومره لویه ده؟

او د همغه پیل نیونی سره لکه د مخه څومره نفر اوس په میز ځای نیولی شي؟

$$F = (0,9m)^2 \cdot \pi = 2,835m^2$$

د دایري کړی سطحه او محیط چاپیریال په لاندې ډول دي


$$F = 1,95m \cdot 0,05m \cdot \pi = 0,30m^2$$

$$U' = 2,095m.Pi = 5,969m ; U' : 8 = 74,6 \text{ cm}$$


د داسې لږ ستونځو سره بیا هم ټول کسان پر میز ځای نیولی شي.

د گردیو پروتخایونه یو بل ته:

هغه دایرې، چې منځتکي یې یو په بل پروژي کونځنټري یا راټول او په غیر له دې اکسټنټري یا ناراټولي بلل کیږي.




نا یو منځي دایرې یا کرې




یو منځي کرې یا دایرې

ددې لپاره. چې یوه دایره ټوله په بله پروژي کېدی شي دا کار د راکښلو له لارې په کونځنټري یا راټول دایرو وایرول شي.





نا یو منځي کرې



خیره ۱۲۱

وي کیدی شي چې د راکښلو له لارې

په کونځنټري گردیو یا راټول گردیو بدلی شي.



جود کرې

هغه دوه يا زياتې گردۍ چې منځ ټکي يې يو په بل پریوځي کونځنټري *Konzentrie* يا راټولې او په غیر له دې اکسټنټري *Exzzentrie* يا ناراټولې بلل کيږي . که يوه گردۍ ټوله په بله کې پرته وي کيدی شي چې د راکښلو له لارې په کونځنټري گردیو يا راټولگرديو بدلی شي.

که گردۍ یو بل پوره پټې نه کړي، نو د گډو هوارو) = غوڅډیریو (يا گډو پاتې يا باقي شمیرنه له ستونځو سره مخامخ کيږي . که گردۍ یو له بل سره گډ ټکي ونه لري نو دا گردۍ یو دبل سره پردۍ بلل کيږي . د دې گردیو څیرې مو نه کښلې، دا کار دې گران لوستونکي په غاړه واخلي .

څو پیژندونه يا تعريفونه:


د گردۍ هغه برخه گردیتوټه (سگمنت) *Segment/ Abschnitt* بلل کيږي، که چیرې یوه دایره (گردۍ) د یوې کرښې له لارې یا کرښه باندې غوڅه شي . داسې یوه کرښه غوڅکرښه یا غوڅوونۍ (سیکانت) *Sekante* بلل کيږي. غوڅکرښه گردۍ په دوه ټوټو ویش. که دا کرښه د گردۍ له منځ څخه تیره شي، نو گردۍ په دوه برابرې برخو ویشي، چې دا بیا گردۍ نیموونې بلل کيږي. هغه غوڅوونې چې له منځ ټکي تیره شي، د گردۍ نیمې یا لنډې نیمې بلل کيږي. که گردۍ په یوه ټکي کې لمس کړی نو دا کرښه تانجنت بلل کيږي او که له گردۍ څخه دا کرښه دباندې تیره شي نو تیریدونۍ کرښه بلل کيږي . په گردۍ د غوڅکرښې دننه پرته برخه د گردۍ ټوټوونې (*Sehne*) یا وتر بلل کيږي . ټوټوونۍ یا *Sehne* بندکرښه ده په داسې حال کې چې غوڅی ، تنجنت او تیریدونکی ناپاي کرښې یا -لکه، چې ورسره بلد یو - کرښې دي . د یوه گردۍ څخه د دوه وړانگو په مرسته کیدي شی یوه برخه راغوڅه شي دا برخه گردیبرخه یا سکتور *Sektor* بلل کيږي. د منځټکیکونج یا منځني کونج او لیندې (*Bogen*) *b* سره مخامخ څیره ده

په لاندې څیرو کې د نومونو له الماني څخه په پښتو کوونه له کین وښی لورته:


گردیلینده *Kreisbogen* د گردۍ ټوټه وونې(ټوټوونې) *Kreissehne* ،
گردۍ برخه *Kreissector* ،



په گردی کې د کونجونو ډولونه:



د گردی ټوټه (د څیړنې پوهیدوله پاره دالاندې څیره پوره په پام کې ولری)



گردی ټوټه Kreissegment ,
د گردی ټوټی لویي:

- α = منځتکیکونج Mittelpunktswinkel
- b = گردی لینده Kreisbogen
- h = د ټوټې جگوالی Segmenthöhe


- Radius = ورانگه
- s = ټوټه ووني (وتر) Kreissehne
- A = ټوټې هواره Segmentfläche
- M = گردې منځنۍ Kreismittelpunkt
- Verbindung = ترڼه A-M-B = برابرېښیز درېگودي

د گردیتوټې فرمولونه Formel zum Kreissegment

$A = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot r^2 \cdot \pi - \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \sin \alpha,$ $A = \frac{r \cdot b}{2} - \frac{s \cdot (r - h)}{2},$	منځهواره مخامخ فرمول Flächeninhalt
$r = \frac{4h^2 + s^2}{8h}$	Radius ورانگه (شعاع)
$s = 2r \cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right),$ $s = \frac{2h}{\tan \left(\frac{\alpha}{4} \right)} = 2h \cdot \cot \left(\frac{\alpha}{4} \right)$	Kreissehne ټوټه ووني (وتر) د وروسته لپاره دې په پام کې وي
$h = r - \left(r \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right),$ $h = r - \sqrt{r^2 - \left(\frac{s}{2} \right)^2},$ $h = \frac{s}{2} \cdot \tan \left(\frac{\alpha}{4} \right)$	Segmenthöhe د ټوټې جگوالی یا قطعې جگوالی

$b = 2r \cdot \frac{\alpha \cdot \pi}{360^\circ},$ $b = r \cdot \pi \cdot \frac{\alpha}{180^\circ},$ $b = \frac{\alpha \cdot \pi \cdot (4h^2 + s^2)}{1440h},$	دليندي اوردوالی Bogenlänge
$\alpha,$ $\alpha = 4 \cdot \arctan\left(\frac{2h}{s}\right)$	Mittelpunkswinkel منختکيکونج په درجه کچ (Gradmaß)
$\pi \doteq 3,1415926536$	کريديکي Kreiszahl

گردی برخه Kreissektor یا د گردی قطاع



Formeln zum Kreissektor د گردی برخې یا قطاع فرمولونه	
$A = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot r^2 \cdot \pi$	منځهواره Flächeninhalt
$b = \frac{\alpha}{180^\circ} \cdot r \cdot \pi$	د گردی لیندي اوردوالی یا د قوس--
r	ورانگه Radius
α	منختکيکونج (په درجه کچ) Mittelpunkswinkel (Gradmaß)

$$\pi \approx 3,1415926536$$

[Kreiszahl](#) گردېگن يا د داېرې عدد

د يوې گردۍ او کرښو پروتخايونه يو بل ته:


کرښه، چې گردۍ غوڅوي، غوڅونې بلل کيږي.

کرښه، چې گردۍ لمسوي يا د گردۍ مماس دی، د گردۍ لمسوني يا مماس بلل کيږي.


کرښه چې له گردۍ تيريږي، له گردۍ تيرېدونکې بلل کيږي.

د کرښو پروتخايونه د گردۍ ته:

په لاندې څيره کې د کرښو نومونه: **Passante** تيريدونې، **Tangente** تانجنت، **Sekante** غوڅونې، لاندې څيره کې خو هرڅه روښانه دي.




په لاندې کې پورته ټولې څېرې په يوه څېره کې ورکړل شوي دي



پیل‌بیلگه :

د یوه بنس موټر جوړولو لپاره ۱۷۵۰ کیلوگرامه اومه (خام) مواد په خرڅ رسیږي یا مصرفیږي. په دې کی اوسپنه او فولاد ۷۵ په سلو کی، په پالستي، شیشي او رنگ ټول ۹ په سلو کی رسیږي، په رنگه فلزونو او ربر ۶ په سلو کی رسیږي، او تیل ۴ په سلو کی. یو گردیدیاگرام وکارۍ چی هره برخه په کې ورکړ شوي وي .

	د گردې ټوله هواره د ټولو موادو سره مساوي ده (۱۰۰ په سلو کی) د جوړموادو برخه د گردببرخی څخه عبارت دی. یوه د یو په سلو کی برخه به یوه گردۍ برخه وي د منځکونج سره $360^\circ:100=3,6^\circ$ وی . یعني $4\% \sim 14,4^\circ; 6\% \sim 21,6^\circ; 9\% \sim 32,4^\circ; 75\% = 270^\circ$ خیره دی، چې د هرڅه برخه کې ورنزدې شوول شوي وي په یوې گردۍ
--	--

 ε لویوالي b ده کټی دیبرخه یا نږدې اغوځی خیره ۱۲۴	کې وکښل شي یا لاندې د گردۍ برخې خیره څرگندوي» د منځکونج چې د ، ε سره یې په نڅښه کوو لویوالي په تناسب برخهواره Fsk او هم لینده b تغیر خوري او لاندې باوري دي: $\frac{F_{Sk}}{F} = \frac{b}{U} = \frac{\varepsilon}{360^\circ}$
---	--

د ډبل برابرېون د دویمې برخې څخه باوري دي:

جمله : د گردۍ برخې د لیندې اوږدوالی داسی دی:

$$b = \frac{n \cdot \varepsilon}{360^\circ} = \frac{2\pi r \cdot \varepsilon}{360^\circ} = \frac{\pi r \varepsilon}{180^\circ}$$

د لومړۍ برخې څخه د سیکتور یا گردیبرخی لپاره باوري کیږي

جمله : د سیکتور یا د گردیبرخی منځهواره په لاندې ډول ده :

$$F_{Sk} = \frac{F \cdot \varepsilon}{360^\circ} = \frac{\pi r^2 \cdot \varepsilon}{360^\circ} = \frac{r b}{2}$$

اړیکې $F_{Sk} = \frac{r b}{2}$ د مات $F_{Sk} = \frac{F \cdot b}{n} = \frac{\pi r^2 b}{2\pi r}$ د لنډونې څخه منځ ته راغلي

بیلگه: د خام موادو برخې (بیلگه مخ) هواره څومره لویه ده، که د گردۍ دیاگرام ۵ سانتي متره وي ؟

$$F_{\text{اوسپنه او فولاد}} = (25 \pi : 360^\circ) \cdot 270 = 0,218 \cdot 270 = 58,905 \text{ cm}^3$$

$$F_{\text{پلاستیک}} = 0,216 \cdot 32,4 = 7,069 \text{ cm}^3$$

$$F_{\text{رنگه فلزات}} = F_{\text{ریپر}} = 0,218 \cdot 21,6 = 4712 \text{ cm}^3$$

$$F_{\text{تیل}} = 0,218 \cdot 14,4 = 3,142 \text{ cm}^3$$


د ټولو ټولګه یا د ټولو زیاتون باید د گردۍ هواره ورکړي:

$$F = \pi r^2 = 78,54 \text{ cm}^3$$

د برخه‌واری ددې فرمول سره نور د برخه‌واری شمیرلو لپاره هم کوم جنجال یا پرابلم نه شته. د اخرنی هواره دلته بیا د برخه‌واری او د دوه وړانګو او ټوټونی څخه جوړ مساوي پښیز دریګوډي کمون دی.

څیره ۱۲۵

ګردۍ ټوټه



د دریګوډي هواره لپاره باور لري:

$$F = s(r - h) / 2 = 0,5 r^2 \cdot \sin \epsilon$$

(تریګونومتری دی وکتل شي) او

ددې سره ټوټه هواره

جمله: د گردیتوټی یا سگمنت هواره په لاندې ډول دي:

$$F_{Sg} = F_{Sh} - F$$

$$F_{Sg} = (br/2) - s(r - h) / 2$$

$$F_{Sg} = (\pi r^2 \epsilon / 360^\circ) - (r^2 \sin \epsilon) / 2$$

$$F_{Sk} = (r^2/2) [\pi \epsilon / 180^\circ - \sin \epsilon]$$

په کارونه یا عمل کی د ټوټه هواره لپاره ګټور نزدې ارزښت $F_{Sg} = (2/3)sh$

ښوول شوی دی

پیلیلگه: مدیر کړاو له خان څخه پوښتي چی ایا د گردیمیز په ځای به یو منظم
اته کو نجی هدفمند بهتر نه وای؟ نو په اختیار کي هواره او چاپیری به څومره
لوي وي؟

لمړی گردیتوبی شمیرو. په ورته ډول لکه د گردی نزدې شمیرلو لپاره، د مربع
څخه و ډیرکونجي ته، مخ ته څو او دې د اړخونو اوږدوالی s شمیرو.
منځولاره m ، د اته کو نجیز کانتی یا ژی k او بالاخره د دگردیتوبی
جگولی h د پیتاگوراس د جملی په مرسته شمیرو.
لاندې لاس ته راځي:


$$s = \sqrt{2} \cdot 1 = 1,414 \text{ m}; m = \sqrt{1 - (1,414 : 2)^2} = s / 2 = 0,707 \text{ m}$$

$$k = \sqrt{(1 - 0,707)^2 + 0,707^2} = 0,756 \text{ m}$$

$$h = 1 - \sqrt{1 - (0,765 : 2)^2} = 0,076 \text{ m}$$


د $45^\circ = \angle$ له امله $b = 0,393 \text{ m}$ دی. و له دې سره

$$F_{\text{تویه}} = 0,5 \cdot [0,393 \cdot 1 - 1,414(1 - 0,076)] = 0,039 \text{ m}^2$$



له دې څخه په هر صورت د بنسټی میز جوړیږي. ټوله غورزول شوې له دې امله په
 لاندې توگه ده: $8.0.039 = 0,312 \text{ m}^2$. میز اوس لاندې هواړه لري
 $F_0 - F_{\text{غورزولشوي}} = 2,828 \text{ m}^2$
 او په همدې توگه لکه د کوچني شوي گردیهواړه د وړانگي $r = 95 \text{ cm}$ سره. د
 کیناستلوځاي سور (k) حتي زیات شوی، چاپیری اوس $U = 8.0,765 = 6,123 \text{ m}$


د مساوي ټوټوونو جمله




څیره ۱۳۱

مساوي اوږدې گردیتوټی د گردی له منځتکي
 مساوي فاصلی لري، مساوي منځتکي کونجونه،
 مساوي گردیلینده، او مساوي گردیتوټی او
 مساوي گردیبرخی لري.

د چاپیرگردی جمله




د درې ټکو A, B, C لپاره یوه گردی موجود
 ده چی د دریواړو ټکو څخه تیریږي:
 دا د دریگونجي ABC چاپیرگردی بلل کیږي
 څیره



څیره ۱۳۳

د پریفري - یا ژیکونج جمله

په همغه لینده باندې ټول
 پریفري - ژی کونجونه مساوي دي




د منځټکيکونج او پریفریکونج یا ژېکونج جمله:

یو منځټکيکونج دوه برابره دومره لوي دی
لکه په دې تړلی پریفری کونج. (چاپیرکونج)

څیره ۱۳۴

د منځټکي کونج او د

تانجنت-ټوټوني-کونج جمله:



د منځټکي کونج دوه ځله دومره لوي دی
لکه په دې اړوند تانجنت-ټوټوني کونج.

د گردیو جمله چی په دوه ټکو کی

سره پریکوي


د ټولو گردیو منځټکی چی پو بل په

دوه ټکو A او B کی غوڅوي یو

ناپایکرنه باندې چی ځایلاين

(ځایکرنه) ورته وایي پراته دي.

څیره ۱۳۵




د وړانګې او تنجنت جمله

په لمستګې پرته وړانګه او اړوند
تانجنت سره یو په بل ولاړ یا نیغ
پراته دي.


د تانجنت جمله:

د دوه ګردیو د منځ ټکو M_1 او M_2 سره تانجنتونه دنننی (د بانديني) تانجنتونه
نومېږي که د دوه ګردیو د منځ ټکو کرښه $M_1 M_2$ غوڅه (غوڅه نه) کړي. که چیرې
دوه ګردي ګډ دننني او د بانديني تانجنتونه ولري، پس د داوړو تانجنتونو غوڅتوبې
همغه اوږدوالی لري.

$$|AB| = |CD| \quad (=>) \quad |A'B'| = |C'D'| \quad \text{په همدې ډول}$$



د وترونو جمله: د وترونو زاويې، چې مخامخ پرته دي، يو بل سره 180° ته پوره کوي




څيره ۱۳۸

$$\alpha + \beta = \gamma + \delta = 180^\circ$$

د تنجنتونو څلورضلعیو جمله:

د تنجنتونو په څلورضلعي کې د مخامخو ضلعو لويوالی د نورو ضلعولويوالي سره برابر دی



څيره ۱۳۹


$$A+c = b+d$$

۲ - ایلپسی (بیضوي یا هگی) (دلته موخه هواره ده)

Ellipse

پیلبلگه :

د کړاو میز جوړښت باندې موږ په اته کونجې اوبی یا حل کی تم کړی وو. دا چې په دې ډول یو میز سره تل د زخمی کیدو خطر موجود دی پوښتنه رامنځ ته کیږي چې : داسی یو را گردشوی ښکلی شکل ، چې گردی نه وي او منظم غوڅ وي، شته، چې د کړاو اړتیا پوره کړي؟ په ریښتونی ، داسی یو اوبی یا حل موجود دی، لکه چې لاندې څیره ښایي، چې هر د غاړې ټکی دوه ټکو واټنونو ته یو ثابت واټن لري




پیژند یا تعریف:

د ټولو هغو ټکو P ډیري ته چې له دوه ځای په ځای ټکو F1 او F2 (سوزېدټکی یا بهتره سوزونټکو) څخه ثابته یا همغه واټن یا فاصله لري، ایلپسی نومیږي

لاندې واټنونو یا فاصلو ته سوزونورانگی وایي.

$$|PF_2| = r_2 \wedge |PF_1| = r_1$$



$$E = \{P \mid |\overline{F_1P}| + |\overline{F_2P}| = 2a\}$$

منځ ټکي) واروی M په (O ته د ایلپسی منځ ټکی وای، e ته د سوزونوټن یا فاصله یا لایني ایکسختريخیتایت (lineare Exzentrizität) یا لایني ناراتوله وایي. ددې لویو لپاره لاندې اړیکي باوري دي

$$I \dots r + r = 2a \wedge II \dots a^2 - b^2 = e^2$$

په دې کی a او b د ایلپسی لوي او وړ نیممحورونه دي. اړیکه I روشانوي، که چیرې د ایلپسی ټکی P د نیممحور a په اخر کی وټاکل شي، II د پیوتاگوراس له جملې لاس ته راځي که د P ټکی د نیممحور په اخر پروت وي. دواړه ناپاکرښی چی د سوزونټکي تیریري او په دې په O کی ولاړه ناپای کرښه د ایلپسی سیومیټري محورونه جوړوي. د خوشي په ټکی P کي هره په تانجنت ولاړه کرښه د سوزونورانگو ترمنځ کونج نیموي.


د ایلپسی جوړول د باغوان لخوا یا د ایلپسی باغواني جوړښت:

دا څیره دې گران لوستونکي د تمرین په توگه وباسې. د یوې رسی، چی په a^2 اوږده وي، په داوړو سرونو کي موري وتری او دا بپا په ځمکه ټکوهي، د یو بل (خوزیدونکی (موري یا لرگي په مرسته دا پری راکښ کړی یا راکاری او وگرځوی، دلته کوم شکل چي پیداکیږي ایلپسی ده او دواړه د پری د

سرونو ټکي چی موري پرې وهل شوي سوزونټکي دي. څیره په هر کواوردینات سیسم او یا په یوه میلی متر کاغذ کونځینتري یا راټولو گردیو په مرسته بل جوړښت امکان پیدا کيږي، چی سری د یوه ټکي دوه گردی د a او b وړانګي ووهي او هره د خوښي وړانګه د نننۍ گردی په Pb او د باندنۍ گردی په Pa کی غوڅوي. که د Pb څخه یوه پرته کرښه وویستل شي او د همغه تر Pa دوام، نو هرچیرته یو د ایلیپسی یا هګی یا بیضوي ټکی لاس ته راځي. د ایلیپسی هر ټکی داسی پیدا کیدی شي. پیژندل کيږي چی هر $2b$ ته غبرګ ټوټونی

د $k = a/b$ فاکتور سره لنډ شوی دی. له دې سره د هواري دننه هم تغیر خورې ددې فاکتور k په اندازه


$$F(Kreis(gardai)) = \pi r.r \Rightarrow \pi r.(k.r) = F(hagai, baizawy)$$



څیره ۱۴۱

او له دې چی $r = a$ او $(k.r = b)$ د لته r د گردی « لویه نیمه اکسی (محور) ده

جمله : د ایلیپسی هواره ده $F = \pi ab$:



خیره ۱۴۲

د ایلپسی چاپیرونی په ساده ډول
نه شي شمیرل کیدی، په عمل کی
په زیات وخت کی نزدیونه یا نزدې
شمیرنه بسیا کوي.

جمله : د ایلپسی چاپیری:

$$U \sim \pi (1,5 \cdot [a+b] - \sqrt{ab})$$

او یا گردې ته ورته ایلپسی. دا
په دې مانا چی $a \sim b$:

$$U \sim \pi \cdot \sqrt{2(a^2 + b^2)}$$

دا فرمولونه، که $a = b$ وي د گردې چاپیری ته ځي:

$$U = \pi (1,5 \cdot [a+a] - \sqrt{a^2}) = \pi (3a-a) = 2\pi a = 2\pi r \Leftrightarrow$$

اویا په په همدې توگه یا $\Leftrightarrow$

$$U = \pi \cdot \sqrt{2(a^2 + a^2)} = \pi \cdot \sqrt{4a^2} = \pi 2a = 2\pi r$$

بیلگه:

کوم خورا لویوالی د بناغلی کړاو میز په ایلپسی یانیزوي یا هگي خیره لرودی
شي؟

لوي محور $a = 1m$ پاتي کیږي، کوچنی محور دی: $b = 95cm$ ، داچی میز باید د
درځ ژوروالي پورې غوڅ شي. نوله دې امله هواره ده:

$$F = \pi \cdot 1.0,95 = 2,985m^2$$


چاپیری کیږي:

$$U \sim 1(1,5.1.95 - \sqrt{0,95}) 6,127 \text{ m} \Rightarrow$$


یا په همدې توګه د بیضوي یا هکي و د ګردی فورم ته یا ګردیڅیرې ته نزدې فورم نیسي $U \sim 6,128 \text{ m}$. له دې امله هګیڅیره د میز لپاره مساعد اوبی یا حل دی.

تمرینونه

- ۱ - په کالیفورنیا کی د یوزیمیت ملي پارک Yosemite National Park ، خپل ماموت ونو (Mammutbaumbestände) له امله خورا مشهور دی. کوم چاپیری یی هغه ونه لري چی وړانګه یی ۷ ، ۴ متره وي؟
- ۲ - د لاس ساعت دقیقه بنونکی ۵، ۱ سانتي متره اوږد دی (خرخونمحور - څوکه)، څوکه یی په یوه سانیه، یوه ساعت، یوه ورځ، یوه اونۍ، یوه کال کی څومره لار وهي؟
- ۳ - ځمکه نزدې ۶۳۷۸ کیلومتره یوه قطبي (اکواتور) وړانګه لري. قطبچاپیری یی څومره دی؟
- ۴ - په خیال کی دې ولرو، چی له اکواتور یا قطب څخه یو پیری غزوو (۴۰۰۰۰ کیلومتره)، کوم چی د اکواتور یا قطب له چاپیری څخه یومتر اوږد دی. د یوه ځانګړي تخنیکي چمتووالی له لارې په هرځای کی د ځمکی څخه په همغه واټن راوړل کیږي. ایا دا واټن پوره لوي دی چی سړۍ ددې ترمنځ یوه د (ګیرکلی) پاکي وځایوولی شي یا ځای کړای شي؟
- ۵ - د غوڅهواره به یی د ځمګي سره څومره وي که د اکواتور یا قطب په اندازه جګ وي؟
- ۶ - په اکواتور یا قطب دوه ځایونه څومره لري دی، که یو له بل یوه اوږددرجی په



خیره ۱۴۳



خیره ۱۴۴

اندازه لری وی؟

۷- د گردی چاپیری څنگه تغیر

خوړي، که د هغه وړانګه

دوه برابره شي یا په

همدې ډول نیمه شي؟

۸- وښایي : د مربع هواره د

څلور میاشتو (سپوږميو)

د هوارې سره مساوي ده

(خیره ۱۴۲).

۹- د خیرې سره سم د

گردیو هوارخوندي یا هوار

دنده یا هوارمتن د مساوي

وړانګي سره وټاکي. دا هره

یوه د لویي گردی په سلو کی

خومره برخه جوړوي؟

وښایي چی د څلورو اړو گردیو

چاپیری د همغی وړانګي سره

دومره لوي دی لکه د راچاپره

یا دباندې گردی چاپیری.

۱۰- د یوې مربع دباندې او دنده

یوه گردی راگرځیدلي. د

دواړو گردیو هوارې یو بل ته

څنگه ځانونه نیسي (تناسب یا

ځانیونه)؟

۱۱ - د دوه گردیو منځ ته کی د مساوي وړانګي $r = 7,2 \text{ cm}$ سره، یو له بل دومره لري دي لکه دا وړانګه . د دواړو گردیو ګډ هواره اندازه کړی، چی څومره ده؟

۱۲ - په یوه گردی، چی وړانګه

یی $r = 10 \text{ cm}$ ده، که

یوه گردیکړی کینبول شي،

چی هواره یی دومره لویه ده

لکه د دننه گردی هواره. د

دباندي گردی وړانګه به

څومره وي؟

۱۳ - د یوې گردی

برخهوارې، F_1 او F_2 ، لکه په

څیره ۱۴۵ کی چی ورکړ شوي،

وښايي، چی وړانګه یی $r = 4 \text{ cm}$

وي. وښايي چی هواره په څلورو مساوي

هوارو ټوټه شوې ده (څیره ۱۴۶)

۱۴ - د هغه گردې وړانګه وښايي، کوم چی همغه هوارخوندي لري لکه :

الف (یوه مربع، چی داړخ اوږدوالی یی ۵ سانتي متره وي.

ب (یوه روتی چی نیمي یی ۴ سانتي متره او ۶ سانتي متره وي .

پ (یو مساوي اړخیز دریګونجی چی د اړخ اوږدوالی ۷ سانتي متره وي.


۱۵ - د یوه پنډ پینسیل سره یوه گردی وهل کيږي، چی دننی وړانګه یی ۵

سانتي متره وي. داچی پنسل یو سانتي متره پنډ دی، نو دا په ریښتینی


یوه گردیکړی ده. د دې گردیکړی هواره وشمیری.

۱۶ - یوه ساتلیت یا جوړه، یعنی مصنوعي سپوږمۍ، له ځمکی په یوه گردی

راڅرخي، چی سرعت یی په سانیه کی ۸ کیلو متره دی. د ځمکڅرخون لپاره



څیره ۱۴۵



خیره ۱۴۶

دا ۱ ساعت او ۲۸ دقیقو ته
 ضرورت لري. وښايي چی دا
 ساتلیت یا جوړه سپورمۍ یا
 مصنوعي سپورمۍ له ځمکې
 څخه په کوم جگوالي الوزي؟
 ۱۷ - د یوه څرخونکې یا بهتره
 څرخونکې په مرسته کیدی
 شي څرخونکې یا
 څرخونکې د یوې څپې په
 بلې څپې راوړل یا واړول شي.
 په یوه ورکشاپ کې یوه دقیقه
 یعنی ډیره ټيک اړه په بریښنا
 ماشین چلول کیږي یا په حرکت

راوړل کیږي. د اړې خوزون یا حرکت څومره زر یا تیزدی یا چټک دی، که د
 ماشین څرخونکې یا گاډیل ($r = 20 \text{ cm}$) په ثانیه کې ۸۰۰ ځله وگرځي؟
 ۱۸ - کوم چاپیری او هواره الیپسې یا بیضوي یا هگیشیره لري که ولر:

$$a) \ a = 40 \text{ cm}, \ b = 12 \text{ cm}, \quad b) \ a = 6 \text{ cm}, \quad e = 1 \text{ cm}$$

$$c) \ r_1 = 4 \text{ cm}, \ r_2 = 3 \text{ cm}, \quad w(r_1, r_2) = 90^\circ$$

۱۹ - وښايي: په یو په بل پرتو الیپسو کې دی. $a_1 = a_2$ او $b_2 = b_1/2$ ، نو دنی
 الیپس بیضوي همدومره لویه ده، لکه په دې دپاسه الیپسې یا هگیشیرې
 غاړه.


۲۰ - ځمکه په یوه کال د لمر څخه نږدې د یوې گردۍ په څیر راڅرخي. ددې
 چاپیری وړانګه نږدې ۱۵۰ میلیونه کیلومتره ده.
 الف (د څرخونلار اوږدوالی څومره دی؟

ب) په کوم منځنی سرعت (کیلو متره په سانیه کی) ځمکه په خپل چاپیری راڅرخي؟


پ) په ورځ کی ځمکه نزدې څومره واټن تی کوي ؟

ت) په ریښتونی ځمکه د لمر څخه په یوه ایلیپسی لار راڅرخي، چی په یوه سوزون ټکي کی پخپله لمر قرار لري. د لته هغه لنډ واټن ځمکه لمر ۱۴۷ میلیونه کیلو متره دی، او لرې واټن یی ۱۵۳ میلیونه کیلو متره دی. په دې ورزشات ورکړو سره کوچنی نیممحور وښايي، او همدا ډول د ایلیپسی یا بیضوي هواره او (نزدې) چاپیری هم.

۲۱- د ټولی هوارې کومه ټوټه برخه رنگ ده؟



څیره ۱۴۷



۲۲- د دوه گردیو وړانگی ځان داسی نیسي یا په تناسب کی سره پرتی دي، لکه ۵ : ۸ په لویه گردی کی یو گردیبرخه موجود ده ، چی د هغی لینده دومره لویه ده لکه د کوچنی گردی وړانگه $r = 10 \text{ cm}$ وشمیری.

الف - منځتکي کونج

ب - د گردیبرخی هواره.

۲۳ - کوم منځتکي کونج په لیندې پورې اړه لري، چي

الف (ټيک همدومره لوي وی لکه وړانگه ؟

ب (دوه واره دومره لوي وی لکه وړانگه ؟

پ (نیم دومره لوي وی لکه وړانگه ؟

۲۴ - د یوې گردیتوتونې منځ ټکي کونج وشمیری ، چی هواره یی همدومره لویه

وي، که په وړانگه یی چی مربع .

۲۵ - یو مصنوعي ساتلیت یا جوړه سپوږمۍ ځمکه په ۲۰۰ کیلو متره جگوالي

راگردوي یعنی له ځمکي راگرځي یا بهتره له ځمکي راڅرخي. د راڅرخونوخت

یی ۱ ساعت، ۲۸ دقیق او ۲۶ ثانیې دي.

الف - سرعت یی څومره لوي دی؟

ب - په یوه دقیقه کی څومره لار وهي؟

۳- کرښیزو څیروونو یا توابعو (فنکشنونو) ته ننوتنه:

2.1.1. پیل یا ننوتنه:

د مخه درسونو څخه د کرنیزو (لایني) توابعو (فنکشنونو) سره د گراف په څیر بلد یو او د تابع مساوات سره د کرنیز مساوتو په څیر بلد یو. متناسبي اړیکې یا تناسب ټولګې یا اړیکې د کرنې په څیر انځوریدلای شي.

بیلګه:

په بازار کې د ماهي پلورونکي سره 1000 g ماهي 4,50 € قیمت لري، میرمن پښتنه غواړی 3000 g واخلي:

دا باید $4,50 \times 3 = 13,50 \text{ €}$ ورکړي. ښاغلی سپین 5000 g اخلی او باید: $4,50 \times 5 = 22,50 \text{ €}$ ورکړي .

په ټولیزه توګه ویلای شو: د K ارزښت د ثابت قیمت p سره د رانیونکي سټ (ډېری) x لپاره $K = p \cdot x$ دی.

یعنې قیمت K د x په واک کې دی یا د x تابع دی. ، له دې امله د x تابع او له دې امله فنکشن دی،

د دې لپاره لیکو: $K(x) = p \cdot x$.

$K(x)$ د ارزښت تابع یا فنکشن هم بلل کیږي

د ماهی لپاره د قیمت تابع (یا د نرخ فنکشن) دی، د کوم لپاره چې د سټ واحد) د ډېری یوون) په € او x د 1000g څو ځله د سټ واحدونو شمیر دی .

که د $K(x)$ په ځای y ولیکو، نو راته څرګند مساوات $y = 4,50 x$ ترې رامنځ ته کیږي. دا په کواورډینات سیستم (د وضعیه قیمت سیستم یا پروت ولاړ سیستم) کې د صفر له ټکي څخه تیرېدونکي یوه کرښه ده.

بیلګه :

غورځنګ د ملفون (موبایل یا لاسي تلفون) قرارداد کړی، چې د میاشتي € 20 ورکوی او د دقیقې د تلفون قیمت یې € 0,2 دی. پوښتنې.

الف: څومره باید غورځنګ تادیه کړی، که دی 30 min, 60 min, 90 min, 120 min تلفون وکړي.

ارزښت په یوه ارزښتجدول کې انځور کړی.


ب: په یوه مناسب وضعیه قیمت سیستم کې یې ګراف رسم کړی.

پ: د ارزښتشمیرنې لپاره یې د تابع مساوات څنګه دی؟

حل و الف ته: قیمت له یوه زیاتیدونې یا جمعي ثابت (€ 20) او (€ 0,2 x) واریابلی یا متحولې برخې څخه منځ ته راځي، چیرته چې x د تلفون شوو دقیقو تعداد دی.

0	30	60	90	120	د خبرو دوام په دقیقو
20	26	32	38	44	قیمت په €

اوبې یا حل و ب ته: ګراف، y قیمت په €، پروت: په دقیقو د خبرو دوام



حل و پ ته:

x په دقیقو د خبرو خپلواکه متحوله ده $y = f(x)$ په € د ټولې میاشتي د ټول مصرف بلواکه متحوله یا تابع ده. په لاندې شمیرنه کې یوونونه (واحدونه) دقیقې او € یوونونه لیکل کيږي.

. داسې مخ ته څو:

$0 \text{ min: } y = f(0) = 0,2 \cdot 0 + 20 = 20$ $30 \text{ min: } y = f(30) = 0,2 \cdot 30 + 20 = 26$ $60 \text{ min: } y = f(60) = 0,2 \cdot 60 + 20 = 32$ $x \text{ min: } y = f(x) = 0,2 \cdot x + 20$	بنسټ پیسې باید تادیه شي د x دقیقو دوام لپاره د تابع مساوات
---	---

بیلګې :

د تابع مساواتو جوړښت لپاره بیلګې:

یو د اوبو ډنډ 1000 لیتره اوبه لري.. هره رخ دې ته 100 لیتره نورې اوبه راځي.

د اوبو ډېرۍ یا - سټ لپاره د تابع مساوات داسې دي: $f(x) = 100 \cdot x + 1000$.

اباسین هره میاشت € 1300 معاش اخلي. د معاش لپاره فرمول په € یورو.

د معاش لپاره د تابع مساوات دی: $f(x) = 1300 \cdot x$.

یو ټانک 4000 لیتره ډیزل لري. یو موټر هره روخ 500 لیتره مصرفوي.

د ټانک منځپانګې لپاره د تابع مساوات: $f(x) = -500 \cdot x + 4000$.

که د تابع متناسب اړیکې برقرار کیږي، نو لاندې فکر اړین دی:

ایا یو پیل ارزښت a_0 شته ؟

د منح تغیر ارزښت څومره دی (د بیلګې په توګه هره روخ، دقیقه یا وزن).

تغیر ارزښت زیاتیز یا مثبت یا کمیز یا منفي دی (مثبت = زیاتیدنه، منفي = کمیدنه)

کرښیز برابر وړ یا مساوات په لاندې بڼه پیژنو:

$$y = m \cdot x + n \quad \text{یا} \quad y = m \cdot x + b$$

دا چې کرښیز مساوات د ټول راشنل توابعو کورنۍ پورې اړه لري، چې د لوړو ټولگیو موضوع ده، نو انځوریز ډول یې له پیله په همدې ډول منځ ته راغلی دي.

تعریف :

n -مه درجه ټول راشنل- یا نسبتي توابع:

یوه تابع $f(x)$ د $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ سره n -مه درجه

ټول راشنل یا ټول نسبتي تابع بلل کیږي.

عدونه $a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_2, a_1, a_0$ ضریبونه (خړه ووني) بلل کیږي.

دا چې دواړه اخري زیاتووني یا د جمعي برخي $a_1 x + a_0$ په کرښیز و مساواتو اړه لري، تعریف ترې لاس ته راځي:

تعریف یا پیژند: ټول د لومړۍ درجې راشنل توابع :

یوه تابع $f(x)$ د $f(x) = a_1 x + a_0$ سره او $a_1 \in \mathbb{R}, a_0 \in \mathbb{R}$ سره د 1- درجې ټول راشنل تابع بلل کیږي

د تابع درجه د x د خورا لوی اکسپوننت یا جگ عدد (چې دلته 1 دی، ځکه چې $x^1 = x$) ټاکل کیږي.

دلته ضریب a_1 د m او a_0 د b یا n لپاره لیکل شوی.

د،، کرښیزې یا لاینیز تابع،، اړیکې په دې ودانې دي، چې د کرښیزې تابع گراف په وضعیه قیمت سیستم (پروت ولاړ سیستم) کې یوه کرښه انځوروي.

په یاد ولری: د کرښیزې تابع گراف یوه کرښه انځوروي.

بیلگه: د کرښیز تابع د تابع مساواتو لپاره بیلگې:

$$f(x) = 2x - 13 \quad f(x) = \frac{3}{4}x + 3 \quad f(x) = -\sqrt{3} \cdot x - \pi \quad f(x) = 5 \quad f(x) = 3x + a_0 \quad f(x) = a_1 x$$

تمرین ۱:


د D ټول عددي (تام عددي) ارزښت لپاره ارزښتجدول ولیکې او د گراف رسم یې وکارې.

$$f(x) = \frac{3}{4}x - 3 \quad \text{تعریف سټ} \quad D = \{x \mid -1 \leq x \leq 5\}_{\mathbb{R}}$$

د تعریفست D لپاره د ارزښت سټ W وټاکې.

گراف په کومو ټکو کې د وضعیه قیمت سیستم محورونه قطع کوي؟

۳.۱ - د محور غوڅتکي (د تقاطع ټکي)



دا ارزښتونه لږ یا زیات له گراف څخه هم لوستل کېدی شي.

زیات وخت دا د ارزښتجدول څخه هم لوستل کېدی شي.

اوس موخه دا ده چې دا ارزښتونه د گراف او يا جدول ټاکلو لپاره وکارول شي يا استعمال شي.

P_y د y محور سره د تقاطع- يا غوڅتکي ټکی (Ordinate) :

د ټولو ټکو د x ټول ارزښتونه چې د y په محور پراته دي ارزښت $x = 0$ لري.

د لاینیزو (کرښیزو) توابعو عمومي مساوات يا - برابرون : $f(x) = a_1x + a_0$

شرایط: $x = 0 \Rightarrow f(0) = a_1 \cdot 0 + a_0 = 0 + a_0 = a_0 \Rightarrow P_y(0 | a_0)$

د y محور سره د تقاطع ټکی د a_0 له خوا - يا سره ټاکلی.

بیلگه:

$$f(x) = \frac{3}{4}x - 3$$

له دې لاس ته راځي چې : P_y کواوردینات $(0, -3)$ لري. د دې لپاره لیکو: $P_y(0, -3)$

په یاد ولری: د y محور سره د تقاطع ټکی د $f(x) = a_1x + a_0$ بڼې د ټولو کرښیزو توابعو لپاره کیدی شي مستقیماً له تابع مساوات څخه و لوستل شي. له دې څخه لاس ته راځي: $P_y(0, a_0)$


P_x د x محور يا پراه محور سره غوڅتکي يا د تقاطع ټکی (Abszisse) :

د ټولو ټکو د y ارزښت (د تابع ارزښت) ، چې د x په محور پراته دي، ارزښت 0 لري.

حل: د $P(x | f(x))$ له امله لرو: $f(x) = 0 \Rightarrow P_x(x | 0)$

بیلگه:

د لاندې تابع د محورونو سره د تقاطع ټکي وټاکي او گراف يې رسم کړي.



د x محور سره د تقاطع ټکي د x کواورديناټ (پروت سيستم) هم صفرځای بلل کيږي.

ځکه چې د دې $-x$ ارزښت لپاره (په دې ځای کې x) د تابع ارزښت صفر دی.


تمرین ۲ :

د محورونو سره د تقاطع ټکي وشمیرئ او د $f(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{3}{4}$ لپاره گراف وکړئ.

او په $f(x)$ کې د اړینوولو سره صفرځایونه و آزمایئ.

۳.۲- جگیدنه (جگوالی) یا میلاند :



زیات گادي یا موټر کړی شي فقط کم جگوالی ووهلی شي. له دې امله په غرونو کې غابیزې پټلۍ یا د پرو (د وسپنې پرو) (د جگیدن کوتې لپاره) کینول کيږي یا نسبيږي یا غزېږي، دا هم د مایلو واټنونو لپاره:



دجگوالی توپیر او پرته یا افقی کرښې په منځ کې تناسب جگوالی یا میلان بلل کيږي.

په انځور شوی حالت کې دی: $12\text{ m} : 100\text{ m} = 0,12 \triangleq 12\%$

لاندې الماني په پښتو: ولار:مخامخ اړخ، پروت: په	پېژند(تعريف): جگوالی = m = مخامخ اړخ پر پروت یا گاونډي
--	---

پروت اړخ 	اړخ برابر تانجنت $\text{جگوالی} = m = \frac{\text{مخامخاړخ}}{\text{په پروت اړخ}} = \tan \alpha$ کونج α د جگوالی کونج هم بلل کيږي.
په څنګ کې تشکیل گراف کې یوه سرچینه یزه کرښه جوړه ده، چې له P_1 او P_2 څخه تیرېږي. د کرښې جگوالی دې د ټکو او کواوردیناتو په مرسته پیدا شی. د ګاونډي او مخامخ اړخونو اوږدوالی د دواړو ټکو د کواوردیناتو د کمښت (تفریق) له لارې کره شوی. د کمښت یا توپیر لپاره لیکو: $\Delta x = x_2 - x_1$ $\Delta y = y_2 - y_1$ همداسې	

قضیه:

د جګیدني مثلث څخه د کرښې جگوالی شمیرل کیدی شي:

$$\text{جگوالی} = m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \tan(\alpha)$$

په یوه کواورډیناتسیستم کې د کرښې جگوالی د یوه په خوښه قایمالزاویه مثلث (ولارگوډیز درېگوډی) د پراته اړخ په مخامخ اړخ تناسب دی ، چې اوږد اړخ یا نیمې یا قطر Hypotenuse یې د تابع د گراف برخه ده.

گومان مو نږدې دی، چې د a_1 ضریب د کرښې مساواتو $f(x) = a_1x + a_0$ د جگوالي دنده په غاړه لري.

دا باید اوس وښوول شي.

غوښتنه:

جگوالی m د کرښه مساواتو ضریب a_1 په ګوته کوي..

$$f(x) = a_1x + a_0$$

ښوونه:

$$\begin{aligned} f(x_2) &= a_1x_2 + a_0 & f(x_1) &= a_1x_1 + a_0 \\ m &= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{a_1x_2 + a_0 - (a_1x_1 + a_0)}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{a_1x_2 + a_0 - a_1x_1 - a_0}{x_2 - x_1} = \frac{a_1x_2 - a_1x_1}{x_2 - x_1} = \frac{a_1(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = a_1 \Rightarrow m = a_1 \end{aligned}$$

جمله :

د یوه کرښیز تابع $f(x) = a_1x + a_0$ د گراف جگوالی چې له ټکو $P_1(x_1, y_1)$ او $P_2(x_2, y_2)$ څخه تیريږي د ضریب a_1 لخوا ټاکل کیږي.

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{په لنډه بڼه} \quad a_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \tan \alpha$$

که د یوې کرښې دوه ټکي د کواورډیناتي له لارې ورکړ شوي وي، نو کیدی شي، چې


اول . کرښې رسمیري، که دواړه ټکي سره و نښلول شي او دا داسې مخ ته راغلي کرښه له ټکو اخوا وغزوي.

دویم. د کرښې جگوالی د د جگوالي مثلث په مرسته وشمیری

بیلگه :


$$P_2(3|1) \text{ او } P_1(-1|-2)$$

دې د یوې کرښې ټکي وي، چې جگوالی یې ټاکل کیږي



۳.۳- د توابعو د گراف رسمول

د کرښیزې تابع گراف تل کرښه ده. د یوې کرښې د رسمولو لپاره دوه ټکي اړین یا ضروري دي. که د تابع مساوات معلوم وي، نو د y محور سره غوڅټکی یا د تقاطع ټکی P_y هم پېژنو. دویم ټکی د جگوال له لارې لاس ته راوړی شو (د جگوالي مثلث).





که غواړو د کرښې له یوه ټاکلي ټکي څخه، د جگوالي مثلث له لارې دویم ټکي ته
 راشو، کیدی شي دا لاندې لنډه بڼه په یاد کې ونیسو:

په یاد ولری: د مخراج واحدونه یا یوونونه بني لور ته ، د صورت واحدونه یا یوونونه د
 مخخښې په واک یا تابعیت کې پورته یا کښته لور ته.

دلته باور لري: د + لپاره پورته لور ته او - لپاره کښته لور ته

که دواړه ټکي ډېر نږدې پراته وي دا تلنلار کیدی شي ډېرواره و کارول شي. که د
 جگوالي ضریب a_1 یو ټول(تام) گڼ یا عدد هم وي، دویم ټکی په دې ډول ټاکل کیدی
 شي، ځکه چې هر گڼ یا عدد کیدی شي په کسر بدل شي.



	له P څخه هر ځل څلور پله يا قدمونه بڼي لورته ځو او يو پل کښته لورته او ټکي P_1 لاس ته راوړو. څلور پله بڼي لور او څلور پله کښته لور ته مو همغې برابري نتيجه ته بيايي.
	بيلگه: $y = f(x) = 2x + 3$ $a_1 = 2 = \frac{2}{1} \quad a_0 = 3$ گراف د y محور په $P_y(0 3)$ کې غوڅوي. دا ټکی په پروتولاړ - يا کواوډينات سيستم کارو. له P_y يو يوون (واحد) بڼي لور ته ځو او دوه يوونه پورته لور ته. موږ ټکی $P(1;5)$ لاس ته راوړو. اوس P_y او P سره تړو او کرښه دواړو لورو ته غزوو.

2.1.5. تمرینونه :

د محورونو د تقاطع ټکي وشمیرئ او کرښې رسم کړئ.

د لاندې کرښو گرافونه د امکان تر حده بي له جدول څخه رسم کړئ.

د دې لپاره د y محور او د جگوالي مثلث څخه کار واخلي. او x محور سره د تقاطع ټکي وشمیرئ او د گرافونو له مخې يې وازمایئ.

اول - $f(x) = 2x - 5$ دويم - $f(x) = -x + 3$ دريم - $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$

څلورم - $f(x) = -\frac{1}{2}x - 2$ پنځم - $f(x) = \frac{1}{3}x - \frac{1}{2}$ شپږم - $f(x) = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{2}$

$$\text{اوم - } f(x) = \frac{2}{3}x + 2 \text{ ا - } f(x) = -\frac{3}{4}x - 1 \text{ تم -}$$

$$\text{نهم - } f(x) = -3x + \frac{5}{10} \text{ لسم - } f(x) = \frac{5}{7}x - \frac{12}{4}$$

۳.۴- کلیمې او د انځورولو ډولونه یې

د $f(x)$ تابع گراف لیدشکل K_f هم بلل کیږي.

په ولاړکونجیز - یا قایم الزاویه کواوردینات کې هر ټکي P یو x او y کواوردینات P ($x | y$) لري.

د x کواوردینات د $f(x)$ تابع مستقلة یا خپلواکه متحوله ده.

د y کواوردینات د $f(x)$ تابع ارزښت په گوته کوي. له دې امله زیات وخت د دې لپاره لیکدود $y = f(x)$ استعمالول کیږي.

د کرښیزو توابعو لپاره په ځانګړي ډول لاندې لیکدود عادي دی:

$y = f(x) = mx + b$ د کرښي مساوات بلل کیږي او فقط د $f(x) = a_1x + a_0$ لپاره بل لیکندود دی، کوم سره چې $b = a_0$ $\wedge$ $m = a_1$ باور لري.

۳.۵- کرښیز مساوات په مختلفو اشکالو رامنځ ته کیدل:

د کرښیز مساوات عمومي بڼه:

$$Ax + By + C = 0$$

$$\text{بیلگه: } 3x + 2y + 4 = 0$$

د کرښیز مساوات د محور برخو په بڼه

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$$

بیلگه:

د نورو شمیرنو لپاره هدفمند دی، چې دا مساوات په لاندې معلومه یا پیژندل شوې بڼه راوړو:

$$y = f(x) = a_1x + a_0 \quad \text{یا} \quad y = f(x) = mx + b$$

تمرینونه ۳:

د K_f کرښیز تابع لیدعکس دی د $f(x) = 1,5x - 2; x \in \mathbb{R}$ سره .

د یوې f تابع د کرښیز لیدخیره K_f د تابع گراف هم بللکیري.
الف – ایا ټکی $P(2,5 | 1,75)$ د K_f په کرښه پروت دی؟

ب – ټکي $A(x_A | 4)$ او $B(-2 | y_B)$ په K_f پراته دي. x_A او x_B وټاکي.

پ – د $f(x)$ صفرخای وشمیری.

ت – د کوم x - ارزښت لپاره $f(x) > 0$ باور لري؟

ټ – د $f(x)$ ارزښتورشو یا ساحه وټاکي، که $D = \mathbb{R}_+^x$ و ټاکل شي.

ث – گراف g د K_f راکښنې له لارې، چې د y په لور منح ته راځي او له ټکي $N(4 | 0)$ تیرېږي.


بیلگه:

د،، پومس (سره شوي الوگان)،، گرندی رستورانټ د پومس لپاره هره ورځ 19 kg تازه غوړي په کار لري. تر اوسه په لاگر یا زخیره ځای کې 250 kg شتون لري.

الف – د تابع مساوات وکارۍ او په یوه مناسب کواورډیناتسیست (پروتولاړ سیستم) کې یې گراف رسم کړی.

ب – په لاگر کې 95 kg پاتې غوړیو ورسته باید د رستورانټ مشر د نورو پوښتنه وکړي (فرمایش ورکړي). له څو ورځو ورسته باید دا فرمایش صورت ونیسي؟

پ – دا غوړي څومره دوام لروډی شي، که سملاسي پسي را ونه غوښتل شي؟
الف ته حل -



ب ته حل – د 95 kg فرمايش ورکولو سره لاندې باور لري:

$$f(x) = 95 \Leftrightarrow -19x + 250 = 95 \mid \cdot (-1)$$

$$\Leftrightarrow 19x - 250 = -95 \mid +250$$

$$\Leftrightarrow 19x = 155 \mid : 19$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{155}{19} \approx 8,156$$

فرمايش بايد د 8 ورځو په شاوخوا کې صورت ونيسي.

پ ته حل – د y -محور سره د گراف د تقاطع يا غوڅتکي دې وټاکل شي:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -19x + 250 = 0 \mid \cdot (-1)$$

$$\Leftrightarrow 19x - 250 = 0 \mid +250$$

$$\Leftrightarrow 19x = 250 \mid : 19$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{250}{19} \approx 13,158$$

غوري لا نږدې تر 13 ورځو رسيري.

2.1.7. د تمرينونو حل :

تمرين ۱ : تمرين ۱ : د D ټول گڼيز (تام عددي) ارزښت لپاره ارزښتجدول وليکي او د گراف رسم يې وکاري.

$$f(x) = \frac{3}{4}x - 3 \quad \text{تعريف سټ} \quad D = \{x \mid -1 \leq x \leq 5\}_{\mathbb{R}}$$

د تعريفست D لپاره د ارزښت سټ W وټاکي.

گراف په کومو ټکو کې د وضعيه قيمت سيستم محورونه قطع کوي؟

حل :

$$f(x) = \frac{3}{4}x - 3 \quad D = \{x \mid -1 \leq x \leq 5\}_{\mathbb{R}}$$

$$f(-1) = \frac{3}{4} \cdot (-1) - 3 = -\frac{3}{4} - 3 = -\frac{3}{4} - \frac{12}{4} = -3,75$$

$$f(0) = \frac{3}{4} \cdot 0 - 3 = -3$$

$$f(1) = \frac{3}{4} \cdot 1 - 3 = \frac{3}{4} - 3 = \frac{3}{4} - \frac{12}{4} = -\frac{9}{4} = -2,25$$

$$f(2) = \frac{3}{4} \cdot 2 - 3 = \frac{3}{2} - 3 = \frac{3}{2} - \frac{6}{2} = -\frac{3}{2} = -1,5$$


$$f(3) = \frac{3}{4} \cdot 3 - 3 = \frac{9}{4} - 3 = \frac{9}{4} - \frac{12}{4} = -\frac{3}{4} = -0,75$$

$$f(4) = \frac{3}{4} \cdot 4 - 3 = 3 - 3 = 0$$

$$f(5) = \frac{3}{4} \cdot 5 - 3 = \frac{15}{4} - 3 = \frac{15}{4} - \frac{12}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$$

جدول او گراف:

x	-1	0	1	2	3	4	5
f(x)	-3,75	-3	-2,75	-1,5	-0,75	0	0,75




$$W = \{y \mid -3,75 \leq y \leq 0,75\}_{\mathbb{R}}$$

$$P_x(4 \mid 0) \text{ او } P_y(0 \mid -3)$$

تمرین ۲ -

د محورونو سره د تقاطع ټکي وشمیرئ او د $f(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{3}{4}$ لپاره گراف و کارئ. او په $f(x)$ کې د اړینوولو سره صفرخایونه و آزمایئ.

حل:



تمرین ۳: حل.

تمرینونه ۳:

f د K_f کرښیزې تابع لیدعکس دی د $f(x) = 1,5x - 2; x \in \mathbb{R}$ سره.

د یوې f تابع د کرښیز لیدخپره K_f د تابع گراف هم بللکیري.

الف - ایا ټکی : $P(2,5 | 1,75)$ د K_f په کرښه پروت دی؟

ب - ټکي $A(x_A | 4)$ او $B(-2 | y_B)$ په K_f پراته دي. x_A او x_B وټاکي.

پ - د $f(x)$ صفرځای وشمېری.

ت - د کوم x - ارزښت لپاره $f(x) > 0$ باور لري؟

ټ - د $f(x)$ ارزښتورشو یا ساحه وټاکي، که $D = R_+^x$ و ټاکل شي.

ث - گراف g د K_f راکښنې له لارې ، چې د y - په لور منځ ته راځي او له ټکي $N(4 | 0)$.

تیرپري.

و الف ته حل- $f(x) = 1,5x - 2$

ازمایښت:

$$P(2,5;1,75): f(2,5) = 1,5 \cdot 2,5 - 2 = 1,75 \Rightarrow$$

P په کرښه K_f پروت دی یا $P \in K_f$.

و ب ته حل -

$$A(x_A | 4): f(x_A) = 1,5 \cdot x_A - 2 = 4$$

$$\Rightarrow 1,5 \cdot x_A - 2 = 4 | +2$$

$$\Leftrightarrow 1,5 \cdot x_A = 6 | : 1,5$$

$$\Leftrightarrow x_A = 4$$

$$B(-2 | y_B): f(-2) = 1,5 \cdot (-2) - 2 = y_B$$

$$\Rightarrow y_B = 1,5 \cdot (-2) - 2 = -5$$

و پ ته حل -

صفرځایونه:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 1,5x - 2 = 0 \Leftrightarrow 1,5x - 2 = 0 \mid +2 \\ \Leftrightarrow \frac{3}{2}x = 2 \mid \cdot 2 \Leftrightarrow 3x = 4 \mid : 3 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3} \Rightarrow P_x \left(\frac{4}{3} \mid 0 \right)$$

و ت ته حل -

$$f(x) = 1,5x - 2 > 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x - 2 > 0 \mid +2 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x > 2 \mid \cdot \frac{2}{3} \\ \Leftrightarrow x > \frac{4}{3} \Rightarrow \text{Für } x > \frac{4}{3} \text{ ist } f(x) > 0$$

و ت حل -

$$(x > 0 \text{ په دې معنا چې } \mathbb{R}_+^*) \quad f(x) = 1,5x - 2 \quad D_f = \mathbb{R}_+^*$$

$$\Rightarrow f(x) > -2 \Rightarrow W_f = \{y \mid y = f(x) > -2\}$$

و ت ته حل- د y په لور راکېنه له ټکي $N(4;0)$ څخه غبرگي (موازي) کرښې $g(x) = (3/2)x + a_0$ لاس ته راځي.

د لاندې سره ازماېنت:

$$N(4 \mid 0) : \Rightarrow g(4) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2} \cdot 4 + a_0 = 0 \Leftrightarrow 6 + a_0 = 0 \mid -6 \Leftrightarrow a_0 = -6$$

ته چې له ټکي $N(4;0)$ تیریري، غبرگه $g(x) = (3/2)x - 2$ و $g(x) = (3/2)x - 6$ خځلي.

۳. ۶ - پوښتنې

کرښیز مساوات | .

لومړۍ - د لاندې توابعو گرافونه هر یو په یوه کواور دینات سیستم کې وکارۍ

$$\text{الف - } f(x) = -\frac{5}{4}x + 1 = \text{پ} \quad f(x) = 2x - 4 = \text{ب} \quad f(x) = -\frac{2}{3}x + 2$$

$$f(x) = 2,5 = \text{ث} \quad f(x) = -0,3x = \text{ج} \quad f(x) = -4x + 5 = \text{ت}$$

دویم - و آزمایی، چې کرښه په P_1 او P_2 کې سرچینه بیزه کرښه ده.

$$\text{الف - } P_1(-1|3,5); P_2(2|-2) = \text{ب} \quad P_1(2|4); P_2(-1,5|-3)$$

دریم - د کوم x ارزښت لپاره $f(x) > 0$ باور لري؟

$$\text{الف - } f(x) = \frac{x}{5} - \frac{7}{5} = \text{پ} \quad f(x) = -1,5(x-2) = \text{ب} \quad f(x) = 0,4x + 1$$

څلورم - د کرښیزې تابع ارزښت جدول معلوم دی. د تابع ترم او د محورونو د تقاطع ټکي معلوم کړی.

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & -3 & -1 & 1 & 3 \end{array} = \text{ب} \quad \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline y & -2 & -1,5 & -1 & -0,5 & 0 & 0,5 \end{array} \quad \text{الف -}$$

$$\text{پنځم - کرښیز ه } f(x) = 3 - \frac{12}{7}x. \quad \text{تابع ورکړ شوي}$$

الف - گراف رسم کړی او $f(-1)$ په گوته کړی

$$\text{ب} = \text{ایا } P(\sqrt{7}|-1,54): \text{یا ټکی د } f(x) \text{ په گراف پروت دی؟}$$


پ = تعریع ساحه D دې داسې محدوده شي، چې باور ولري:

$$W_r = \{y | 1 \leq y < \infty\} \quad \text{او } D_r \text{ وټاکي.}$$

$$\text{ت} = \text{د } k \text{ د کوم ارزښت لپاره } f(\sqrt{2k}) < 0,6? \text{ دی؟}$$

$$\text{شپږم - د } g(x) = 0,75x + 3 \text{ او د } h(x) = -x - 2,5 \text{ توابع ورکړ شوي.}$$


کرښه h دې y په لور داسې راکښل شي (یا دې داسې تغیر ورکړ شي)، چې g او تغیر خوړلې کرښه h د x محور په همغه ټکي کې قطع (غوڅ) کړي. د تغیر خوړلې کرښې لپاره د $f(x)$ تابع ترم وټاکي یا پیدا کړی. اوم - کیدی شي لاندې گرافونه همغه کرښه انځور کړي؟ دلایل یې راوړی



پوښتنې

کرنیز مساوات یا - برابرونه ||

لومړۍ -



دویم -

ټکي $P(4,5; -3)$ په کرښه چې صفر (سرچینه بیزه کرښه) پروت دی.

ټکي $P(3;f(3))$ هم په دې کرښه پروت دی. $f(x)$ وټکي.

دریم -

ټکي $A(1;3)$, $B(-1;-7)$, $C(2;-2)$ او $D(8;7)$ د مساوات $f(x) = 4x-3$ سره د کرښې پورته لور ته ، کښته لور ته او که په کرښه پراته دي؟

څلورم -

د کرښې g مساوات وټکی.


الف - $a_1 = -\frac{3}{4}$ له $P(1|-2)$ ب - $a_1 = 1,5$ له $P(-1|-0,5)$

پ - له $P_1(2|-4)$ او $P_2(0|-2)$ ت - له سرچینې او $P(-3|-1)$

ټ - له $P(-3|3)$ او وکرښې $g(x) = -\frac{1}{2}x - 5$ ته غبرگ

پنځم - دیوه کرښیز تابع f لپاره $f(2) = -3$ او $f(0) = 5$ باور لري.

د تابع ترم وټاکي او $f(0,25)$ او $f(\sqrt{2})$ وشمیري.




۳.۷ - کرښیزې توابع د ورکړشو شرایطو سره

الف- لومړۍ حالت : د P ټکي څخه تیرې کرښې د a_1 جگوالي سره

بیلګه:

یوه کرښه د a_1 د جگوالي سره د $P_1(x_1 | y_1)$ په ټکي کې ځغلي.

د $f(x) = a_1x + a_0$ تابع مساوات دې پیدا شي.



بیلګه:

د حیواناتو ساتونکی د وینو اوتومات څخه د روځي 7,5 kg خوراک شته. دولس روځي، وروسته له هغې چې زیرمه له غذايي موادو ډکه شوې وه، هلته نور 250 kg پاتې دي.

الف - یو تابع مساوات ولیکي، چې دا حالت تشریح کړي

ب - په څومره سټ یا ډېری به دا د وینو زیرمه دولس ورځي د مخه ډکه شوې وي.

حل و الف ته - د x محور: وخت په ورځو

y محور: د وینو زیرمه په کیلوگرام kg .

$$f(x) = -7,5x + a_0$$

$$P(12 | 250) \Rightarrow f(12) = 250 \Leftrightarrow -7,5 \cdot 12 + a_0 = 250$$

$$\Leftrightarrow -90 + a_0 = 250 | +90$$

$$\Leftrightarrow a_0 = 340 \Rightarrow f(x) = -7,5x + 340$$

حل و ب ته- د ډکیدني وخت $x = 0$ دی.

$$\Rightarrow f(0) = -7,5 \cdot 0 + 340 = 340$$

د وینو شتون دولس 12 ورځي د مخه په 340 kg ډک شوی .

لکه څنګه په لومړي حالت کې چې د یوې کرښې جګوالی او یو ټکی معلوم دي، شمېرنه په همغه ډول د ورکړشوو داتن یا داتن Daten سره مخ ته ځي.

په داسې حالت کې شمېرنه توپیر سرته رسیږي. دا مو بیا یو فرمول ته لارښوده وي.

یوه کرښه د a_1 جګوالي سره د $P_1(x_1 | y_1)$ ټکي څخه تیري.ي.

د کرښمساواتو ټولیز فرمول دی: $f(x) = a_1x + a_0$

$$P_1(x_1 | y_1) \Rightarrow f(x_1) = y_1 \Leftrightarrow a_1 \cdot x_1 + a_0 = y_1 | -a_1 \cdot x_1 \Leftrightarrow a_0 = y_1 - a_1 \cdot x_1$$

$$\Rightarrow f(x) = a_1 \cdot x + y_1 - a_1 \cdot x_1 = a_1 \cdot x - a_1 \cdot x_1 + y_1 = a_1(x - x_1) + y_1$$

$$f(x) = a_1(x - x_1) + y_1$$

دا د ټکي - جګوالي فرمول هم بلل کیږي.

بیلګه:

په $a_1 = -2$; $P_1(-3 | 4)$ کې $f(x) = a_1(x - x_1) + y_1$ ځای پر ځای کړئ


$$f(x) = -2(x - (-3)) + 4 = -2(x + 3) + 4 = -2x - 6 + 4 = \underline{\underline{-2x - 2}}$$

ب. دویم حالت: کرښه له دوه ټکو تیريزي

بیلګه:

دوه ټکي $P_1(x_1 | y_1)$ او $P_2(x_2 | y_2)$ په یوه کرښه پراته دي.

د $f(x) = a_1x + a_0$ تابع مساوات غواړو پیدا کړو.



	دواړه ټکي به په کرښه پراته وي.
--	--------------------------------

د ټکو آزمایش د $P_2(4|6)$ یا P_1 لپاره

$$P_2(4|6) \Rightarrow f(4) = 6 \Leftrightarrow 1 \cdot 4 + a_0 = 6 \mid -4 \Leftrightarrow a_0 = 2 \Rightarrow f(x) = x + 2$$

بیلگه:

د فزیک څخه پوهیږو چې د حرارت معلومولو (تودوخې کچونې) لپاره مختلفې د تودوخې یا حرارت سکالا کارول کیږي. د څلزیوس سکالا Celsiuskala او د فارنهایت سکالا Fahrenheitskala

د دواړو ترمنځ کرښیزې اړیکې موجود دي.

100°C برابری دي د 212°F سره. 0°C برابر دی په 32°F سره.

د یوه تابع مساوات غواړو پیداکړو، چې د هغې په مرسته $^\circ\text{C}$ په $^\circ\text{F}$ اړول کیږي.

خپلواکه متحوله x په $^\circ\text{C}$ او بلواکه یا تابع متحوله $y = f(x)$ په $^\circ\text{F}$.

جگوالی:

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{212 - 32}{100 - 0} = \frac{180}{100} = \frac{9}{5} \Rightarrow f(x) = \frac{9}{5}x + a_0$$

$$P_1(0|32) \Rightarrow f(0) = 32 \Leftrightarrow \frac{9}{5} \cdot 0 + a_0 = 32 \Leftrightarrow a_0 = 32$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{9}{5}x + 32$$

په بدل شوی تابع x په $^\circ\text{C}$ کې کیږدی نتیجه یی ده.

د بیلگې په ډول:

$$x = 20^\circ\text{C} : f(20) = \frac{9}{5} \cdot 20 + 32 = 68 \Rightarrow 20^\circ\text{C} \triangleq 68^\circ\text{F}$$

د دویم حالت لپاره هم کیدی شي شمیرنه په ټولیزه توګه مخ ته بوتلی شي:

دوه ټکی $P_1(x_1 | y_1)$ او $P_2(x_2 | y_2)$ په یوه کرښه پراته دي.

د مساواتو عمومي بڼه ده: $f(x) = a_1x + a_0$

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \Rightarrow f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x + a_0$$

جګوالی:

$$P_1(x_1 | y_1) \Rightarrow f(x_1) = y_1 \Leftrightarrow \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x_1 + a_0 =$$

$$y_1 \Leftrightarrow a_0 = y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x_1$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x + y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x_1 =$$

$$= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot x_1 + y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1$$

$$f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1$$

دا په دوه ټکو کې د کرښیزو مساواتو یو ټولیزه بڼه ده .

په زیاتو ادبیاتو کې په لاندې ډول ده:

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} ; x_1 \neq x_2$$

چیرته چې $y = f(x)$ باور لري.

د عملي کارونې لپاره لاندې بڼه مساعده ده:

$$f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1$$

بیلګه:

$$f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1 \quad P_1(2|-1); P_2(-3|2)$$

په

کي ځای په ځای کړی

$$f(x) = \frac{2 - (-1)}{-3 - 2}(x - 2) + (-1) = \frac{2+1}{-5}(x - 2) - 1 = -\frac{3}{5}(x - 2) - 1 = -\frac{3}{5}x + \frac{6}{5} - \frac{5}{5}$$

$$= -\frac{3}{5}x + \frac{1}{5} \Leftrightarrow f(x) = -\frac{3}{5}x + \frac{1}{5}$$

تمرین:

د °F په °C باندې شمیرني لپاره یو تابع مساوات ولیکي

۳.۸-تمرین: د تابع مساواتو شمیرنه

یو کرښیز مساوات د a_1 جگوالی لري او د P له ټکي تیريږي.

د $f(x)$ تابع مساوات معلوم کړی او د محورونو قاطع ټکي یا غوڅټکي او گراف انځور کړی

$$a_1 = \frac{3}{4} \quad P(-1|3) \quad \text{دویم} \quad a_1 = \frac{1}{2} \quad P(2|-2) \quad \text{اول -}$$

$$a_1 = \frac{4}{5} \quad P\left(\frac{3}{2} \middle| 4\right) \quad \text{څلورم -} \quad a_1 = 2 \quad P(3|-1) \quad \text{دریم -}$$

یوه کرښه له ټکو P_1 او P_2 تیريږي.



د $f(x)$ تابع مساوات پیدا کړی او د محور قاطع ټکي او گراف رسم کړی.

$$P_1(-3|-2) \quad P_2(2|3) \quad \text{شپږم -} \quad P_1(2|1) \quad P_2(5|4) \quad \text{پنځم -}$$

$$P_1(-4|-1) \quad P_2(3|1) \quad \text{اتم -} \quad P_1(-2|3) \quad P_2(4|-1) \quad \text{اوم -}$$

$$P_1(-4 | -2) \quad P_2\left(\frac{7}{2} | 4\right) \quad \text{لسم} \quad P_1\left(-3 | \frac{9}{2}\right) \quad P_2(4 | -1) \quad \text{نهم} -$$

۹.۳- د کرښمساواتو ځانگړی حالت:




بیلگه:

یو $f(x) = 2,5$ ورکړ شوی او y -محور سره موازي د a واټن د $a > 0$ سره.

یوه سرچینیزه کرښه g د $P(a | f(x))$ ټکي څخه تیرېږي.

دا د x - محور او د y - محور سره غبرګې کرښې سره یو مثلث جوړوي.

a داسې وټاکي چې وسطه د سطحې څلور واحدونه (یوونونه FE) جوړ کړي. د دې حالت لپاره د $g(x)$ تابع مساوات څنګه دي؟



تمرین: د $^{\circ}\text{F}$ بدلون شمیرنه په $^{\circ}\text{C}$ لپاره د تابع مساوات ولیکي

حل:

د $^{\circ}\text{C}$ اړونه یا بدلون په $^{\circ}\text{F}$ د متحولې لپاره دا معنلري:

x په $^{\circ}\text{F}$ مستقلة یا خپلواکه متحوله ده او $y = f(x)$ په $^{\circ}\text{C}$ بلواکه یا تابع متحوله ده.

$$212^{\circ}\text{F} \triangleq 100^{\circ}\text{C} \Rightarrow P_1(212|100) \quad \text{او} \quad 32^{\circ}\text{F} \triangleq 0^{\circ}\text{C} \Rightarrow P_1(32|0)$$

دا چې د حرارت الو ترمنځ يوه کرښيزه اړيکه پرته ده، نو ټکي P_1 او P_2 په يوه کرښه پراته دي.

د کرښي عمومي کرښيزه بڼه په دې ډول ده: $f(x) = a_1x + a_0$.

دلته ضريبونه a_1 او a_0 د ټاکلو دي.

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{100 - 0}{212 - 32} = \frac{100}{180} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \Rightarrow f(x) = \frac{5}{9}x + a_0$$

جگوالی:

ټکي ازمایښت د $P_1(32|0)$ سره.

$$\Rightarrow f(32) = 0 \Leftrightarrow \frac{5}{9} \cdot 32 + a_0 = 0 \Leftrightarrow \frac{160}{9} + a_0 = 0 \quad | -\frac{160}{9} \Leftrightarrow a_0 = -\frac{160}{9}$$

$$\Rightarrow f(x) = f(x) = \frac{5}{9}x - \frac{160}{9} = \frac{5}{9}(x - 32)$$

د $^{\circ}\text{F}$ اړونې په $^{\circ}\text{C}$ لپاره باور لري. $^{\circ}\text{F}$ in $^{\circ}\text{C}$ gilt: $f(x) = \frac{5}{9}(x - 32)$

x په $^{\circ}\text{F}$ او y په $^{\circ}\text{C}$.

پوښتنې

کرښيز مساوات VI

لومړۍ –

د لاندې کرښيزو توابعو گرافونه وکارۍ او د ارزښت سټ يا – ډېری W و ټاکۍ

$$\text{الف - } f(x) = -2x + 2; D = \{x | -3 \leq x \leq 5\}_{\mathbb{R}}$$

$$\text{ب - } f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}; D = \{x | -4 \leq x \leq 4\}_{\mathbb{R}}$$

$$\text{پ - } f(x) = \frac{3}{4}x - 3; D = \{x | -2 \leq x \leq 6\}_{\mathbb{R}}$$

$$\text{ت - } f(x) = 3x - 6; D = \{x | -1 \leq x \leq 3\}_{\mathbb{R}}$$

دویم -

ټکی P_1 او P_2 ورکړ شوي، چې په کرښه پراته دي. د $f(x)$ تابع مساوات پیدا کړی او گراف یې وکارۍ

$$\text{الف - } P_1(3 | 4); P_2(7 | -1); D = \{x | 0 \leq x \leq 7\}_{\mathbb{R}}$$

$$\text{ب - } P_1(-8 | 1); P_2(2 | -3); D = \{x | -8 \leq x \leq 2\}_{\mathbb{R}}$$

$$\text{پ - } P_1(4 | 3); P_2(-7 | -1); D = \{x | -7 \leq x \leq 4\}_{\mathbb{R}}$$

$$\text{ت - } P_1(-4 | -4); P_2(4 | 2); D = \{x | -4 \leq x \leq 4\}_{\mathbb{R}}$$

دریم -

د لاندې مساواتو حلست یا حلډېری پیدا کړی. مساوات چې کسری راشنل ترمونه ولري، باید د هغو تعریفورشو هم ورکړل شي.

$$\text{الف - } x - 5 = 9 \quad \text{ب - } 8 + x = 25 \quad \text{پ - } x - \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \quad \text{ت - } \frac{5}{9} = x - \frac{1}{3}$$

$$\text{ټ - } 88 = 4x - 16 \quad \text{ث - } a + bx = 3b + a \quad \text{ج - } 8 - (x + 5) = 2$$

$$\text{چ.} - 9 + (5 - x) = 6 \quad \text{ح.} = (x - 5)(x - 2) = (x - 6)(x + 3) \quad \text{خ.} -$$

$$\frac{x}{4} + \frac{5x}{6} + \frac{5}{6} = \frac{x}{2} + x \quad \text{خ.} - (x + 3)(x + 7) = (x + 2)(x + 9)$$

$$\frac{x}{a-b} + \frac{x}{a+b} = a \quad \text{د.} - \frac{ax}{b} - \frac{b}{ac} = \frac{a}{bc} - \frac{bx}{a} \quad \text{د.} - \frac{3}{2x} + \frac{2}{3x} = \frac{1}{9} + \frac{7}{3x} \quad \text{ع.} -$$

$$\text{ذ.} - 23a - \{5ax - [9ax + (12a - 6ax)] - (3a - 8ax)\} - 15a = 5ax - 7a$$

څلورم: د لاندې توابعو د محورونو سره د تقاطع ټکي هم پیدا کړی.

$$\text{الف.} \quad f(x) = 2x - 7 \quad \text{ب.} \quad f(x) = -2x + 6 \quad \text{پ.} \quad f(x) = 3x - 3$$

$$\text{ت.} \quad f(x) = 2x + \frac{2}{3} \quad \text{ټ.} \quad f(x) = \frac{3}{4}x + 2 \quad \text{ث.} \quad f(x) = -\frac{3}{4}x + \frac{4}{5}$$

$$\text{ج.} - f(x) = 3,5x + \frac{1}{2} \quad \text{چ.} - f(x) = -2,5x + 2\frac{1}{2} \quad \text{ح.} - f(x) = 1\frac{3}{4}x - 3\frac{2}{3}$$

پنځم: د یوې کرښې دوه ټکي P_1 او P_2 ورکړ شوي د لاندې توابعو له I تر IV لپاره وټاکي:

$$\text{I.} \quad P_1(3 | 4); P_2(7 | -1); D = \{x | -2 \leq x \leq 8\}$$

$$\text{II.} \quad P_1(-8 | 1); P_2(2 | -3); D = \{x | -8 \leq x \leq 2\}$$

$$\text{III.} \quad P_1(4 | 3); P_2(-7 | -1); D = \{x | -8 \leq x \leq 4\}$$

$$\text{IV.} \quad P_1(4 | 2); P_2(-4 | -4); D = \{x | -4 \leq x \leq 4\}$$

الف. د جگړدني ضريب m.

ب. د کرښې تابع مساوات

پ - د y محور سره د تقاطع ټکی P_y

ت - د تقاطع ټکی P_y د x محور سره

ټ - په W باندې ارزښتدېږي W .

ث - په D کې د تابع گراف

شپږم: لاندې مساواتسیستمونه حل کړئ:

$$\begin{array}{lll} \text{I} & 15y - 4x = -50 & \text{I} \quad 4x + 5y = 32 \\ \text{II} & x = y + 7 & \text{II} \quad y = 5x - 11 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{الف -} \\ \text{ب -} \\ \text{پ -} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \text{I} & x + y = a + b & \text{I} \quad 2y = 2x - 40 \\ \text{II} & x - y = a - b & \text{II} \quad 3x = 10 - 2y \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ب -} \\ \text{ټ -} \\ \text{ث -} \end{array}$$

پوښتي

کرنیز توابع **XI**

لومړۍ -

$$f_1(x) = \frac{1}{4}x + 2\frac{1}{4}; f_2(x) = -4x - 2; D = \{x \mid -9 \leq x \leq 0\}_{\mathbb{R}}$$

کرنه له تابع $f_1(x)$ سره د دویمې کرنې د تابع $f_2(x)$ سره غوڅیږي. وټاکئ:

الف - د کوارډیناتونو x_s او y_s سره غوڅتکی S .

ب - د دواړو کرنو غوڅتکي د y محور سره.

پ - د دواړو کرښو غوڅتکي د x محور سره .

ت - د دواړو توابعو گراف په D کې .

دویم -

$$f_1(x) = -\frac{2}{3}x + 4; D = \{x \mid 0 \leq x \leq 6\}_{\mathbb{R}}$$

کرښه له تابع $f_1(x)$ سره په ټکي $(3 \mid y_s)$ کې د تابع $f_2(x)$ سره له کرښې څخه غوڅیږي.

وټاکي:

الف-د S پوره کواورډینات

ب-تابع $f_2(x)$.

پ-د دواړو کرښو غوڅتکي د کواورډینات محورونو سره.

ت-په D کې د دواړو توابعو گراف.

دریم:

$$f_1(x) = -\frac{3}{8}x + 1; D = \{x \mid -7 \leq x \leq 3\}_{\mathbb{R}}$$

کرښه د تابع $f_1(x)$ سره په ټکي $(-4 \mid y_s)$ کې کې له کرښې څخه د تابع $f_2(x)$ سره ، چې پروتمحور په -7 کې غوڅوي، غوڅیږي.

وټاکي:

الف - د S پوره کواورډینات.

ب - تابع $f_2(x)$.

پ - د دواړو کرښو غوڅتکي د کواورډینات د محورونو سره.

ت - د دواړو توابعو گراف په D کې..

څلورم -

د يوه درېکودې يا مثلث ټکي P_1, P_2 او P_3 ورکړ شوي دي. د درېکودې د اړخونو تابع وټاکي. پخوا له دې يو پلان نقشه ترتيب کړي.

$$[P_1 P_2] \triangleq f_1; [P_2 P_3] \triangleq f_2; [P_1 P_3] \triangleq f_3$$

$$P_1 \left(-6 \mid \frac{3}{2} \right); P_2 \left(-2 \mid -\frac{3}{2} \right); P_3 (-4 \mid 3)$$

الف -

$$[P_1 P_2] \triangleq f_1; [P_2 P_3] \triangleq f_2; [P_1 P_3] \triangleq f_3$$

$$P_1 \left(6 \mid \frac{3}{2} \right); P_2 \left(2 \mid -\frac{3}{2} \right); P_3 (4 \mid 3)$$

ب -

پنځم -

$f_1(x) = \frac{1}{2}x + 3; P_2(-2 \mid -3); D = \{x \mid -6 \leq x \leq 0\}_{\mathbb{R}}$

کرښه د تابع $f_1(x)$ سره د دويمې کرښې څخه د تابع $f_2(x)$ سره ، چې له ټکي P_2 تيرېږي ، په ټکي S کې ولاړکونجيزه غوڅيږي.

وټاکي:

الف - د $f_2(x)$ جگوالی m_2 .

ب- تابع $f_2(x)$.

پ - د دواړو کرښو غوڅتکی S .

ت - د دواړو کرښو محور غوڅتکي.

ټ - د دواړو کرښو گراف په D کې.

پوښتنې

کرنښيزې توابع XIV

لومړۍ: $A(-8|-6); C(-1|5); D = \{x | -8 \leq x \leq 2\}_{\mathbb{R}}$

له يوه قايمالزاويه مثلث، چې قايمه زاويه يې په B پرته ده، ټکي A او C ورکړ شوي دي. د مثلث ضلع (اړخ) [BC] د اوږدښات محور (ولامحور) په 3 کې قطع کوي.

دا وټاکي:

الف-

$[AB] = f_1; [BC] = f_2; [AC] = f_3$ د مثلث درې د ضلعو توابع.

ب- د B ټکي کواوډينات يا وضعيه قيمت کې د ټکي B محورونه

پ- په D کې گراف.

دويم: $A(-4|-1); B(2|-4); D = \{x | -4 \leq x \leq 5\}_{\mathbb{R}}$

د يوه مثلث ټکي A او B ورکړ شوي دي. د مثلث [BC] ضلع د y محور په 12- کې قطع کوي; ضلع [AC] د x محور په 3- کې غوڅوي.

دا وټاکي:

الف-تابع $f_1(x)$ ضلع [AB]. قطع کوي

ب - تابع $f_2(x)$ ضلع [BC] غوڅوي.

پ - تابع $f_3(x)$ ضلع [AC]

ت - د C ټکي وضعيه قيمتونه

ټ - د D ټکي وضعيه قيمتونه

دریم: توابع $y = f(x) = 3x - 4$ او $g(x) = ax + 3$ ورکړ شوي.

د دواړو توابعو گرافونه په ټکي $(5 | 3)$ کې غوڅوي.

د $h(x)$ تابع مساوات داسې وکارئ، چې گراف په ټکي S عمود څغلي. په یوه وضییه قیمتسیستم کې دریواړه گرافونه رسم کړئ.

څلورم:

$$f_1(x) = \frac{1}{4}x + 2\frac{1}{4}; f_2(x) = -4x - 2; D = \{x | -10 \leq x \leq 1\}_{\mathbb{R}}$$

د $f_1(x)$ تابع سره کرښه د دویمې کرښې د $f_2(x)$ تابع سره قطع کوي.

دا وټاکئ:

الف- د S قاطع ټکي د x_s او y_s کوادینات سره.

ب - د دواړو کرښو د قاطع ټکي د x محور سره.

پ - د دواړو کرښو قاطع ټکي د x محو سره.

ت - د دواړو توابعو گراف په D کې.

پنځم:

د $g(x)$ تابع ، چې په $f(x)$ عمود ده پیدا کړئ. د $g(x)$ گراف د y محور په $(0 | 3)$ کې رسم کړئ. دواړه کرښې په یوه وضعیه قیمت سیستم (پروت ولاړ سیستم) کې رسم کړئ.

الف - $f(x) = -2x + 2$ ب - $f(x) = 3x - 6$

پ - $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$ ت - $f(x) = \frac{3}{4}x - 3$

شپږم: د دواړو کرښو غوڅتکی (نقاط تقاطع) وټاکئ او گراف یې وکارئ.

الف - $f_1(x) = \frac{1}{4}x + 2\frac{1}{4}; f_2(x) = -4x - 2; D = \{x \mid -10 \leq x \leq 1\}_{\mathbb{R}}$


ب - $f_1(x) = -2x + 2; f_2(x) = 3x - 6; D = \{x \mid -2 \leq x \leq 4\}_{\mathbb{R}}$

پ - $f_1(x) = -\frac{2}{3}x + 4; f_2(x) = \frac{3}{2}x - 2\frac{1}{2}; D = \{x \mid -1 \leq x \leq 7\}_{\mathbb{R}}$

ت - $f_1(x) = -\frac{3}{8}x + 1; f_2(x) = \frac{5}{6}x + 5\frac{5}{6}; D = \{x \mid -8 \leq x \leq 4\}_{\mathbb{R}}$

۳. ۱۰ - یو بل سره عمود یا ولاړې ځغلیدونکي کرښې

که د دوه عمود قطع کیدونکو (غوځیدونکو) کرښو جگوالی پیدا کول موخه وی، نو گومان کیږي، چې د دواړو جگوالو په منځ کې اړیکې شته.



g کرښې جگوالی: $a_{1g} = \frac{3}{2}$. گومان: د کرښې h چگوالی: $a_{1h} = -\frac{2}{3}$ د a_{1h} منفي برعکس ارزښت د a_{1g} په گوته کوي يا انځوروي.

دلته د يوه منفي کسري جگوالي حالت څخه غزېږو.


دا په دې معنا چې: $a_{1h} = -\frac{1}{a_{1g}}$ همداسې $a_{1h} \cdot a_{1g} = -1$ يا $a_{1g} = -\frac{1}{a_{1h}}$

جمله:

د دوه یو په بل عمودو یا ولارو کرښو g او h جگوالي لپاره صدق کوی:

$a_{1h} = -\frac{1}{a_{1g}}$ همداسې $a_{1h} \cdot a_{1g} = -1$ يا $a_{1g} = -\frac{1}{a_{1h}}$

کرښې یو په بل عمود دي.



بیلگه:


غوښتنه: د g کرښه تابع مساوات $g(x)$. د h کرښه تابع مساوات $h(x)$. د g او h گراف د $D = \{ x \mid -5 \leq x \leq 4 \}_{\mathbb{R}}$ لپاره	دوه یو بل ته ولاړگونجیز یا قام الزاویه یې ځغلندو کرښې g او h غوڅتکی یا د قطعه کیدو تکی $S(2 3)$ ورکړ شوي، چیرته چې د g جگوالی $a_{1g} = \frac{1}{2}$ دی. د لاندې الماني پښتو: له ... امله ، لاس ته راځي، او $a_{1g} = \frac{1}{2}$ wegen $g(x) \perp h(x)$ folgt $a_{1h} = -2$ $g(x) = \frac{1}{2}x + a_{0g}$ und $h(x) = -2x + a_{0h}$ $S(2 3) \Rightarrow g(2) = 3 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 2 + a_{0g} = 3 \Leftrightarrow a_{0g} = 2$ $S(2 3) \Rightarrow h(2) = 3 \Leftrightarrow -2 \cdot 2 + a_{0h} = 3 \Leftrightarrow a_{0h} = 7$ $\Rightarrow g(x) = \frac{1}{2}x + 2$ und $h(x) = -2x + 7$
غوښتنه: د g کرښه تابع مساوات $g(x)$ د h کرښه تابع مساوات $h(x)$. د g او h گراف د $D = \{ x \mid -5 \leq x \leq 4 \}_{\mathbb{R}}$ لپاره	د دوه یو بل سره عمود ځغلیدونکو کرښو g او h غوڅتکی $S(2 3)$ ورکړ شوی ، په کوم کې چې د g جگوالی $a_{1g} = \frac{1}{2}$ دی

$$a_{1h} = -2 \quad \text{له} \quad g(x) \perp h(x) \quad \text{امله} \quad \text{لاس ته راځي} \quad a_{1g} = \frac{1}{2}$$

$$h(x) = -2x + a_{0h} \quad \text{او} \quad g(x) = \frac{1}{2}x + a_{0g}$$

$$S(2|3) \Rightarrow g(2) = 3 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 2 + a_{0g} = 3 \Leftrightarrow a_{0g} = 2$$

$$S(2|3) \Rightarrow h(2) = 3 \Leftrightarrow -2 \cdot 2 + a_{0h} = 3 \Leftrightarrow a_{0h} = 7$$



2.3.3 تمرینونه:

د دوه کرښو غوڅتکی (د قطعه کیدو ټکی) د دوه کرښو $g_1(x)$ او $g_2(x)$ توابع مساوات ورکړ شوي. د دواړو کرښو د قطعه کیدو (غوڅیدو) ټکی و ښایي او کرښې په یوه افقی-عمودي سیستم کې وښایاست.

اول - $g_1(x) = \frac{1}{2}x + 2$ $g_2(x) = -\frac{1}{2}x + 4$

دویم - $g_1(x) = 2x - 1$ $g_2(x) = -2x + 1$

دریم - $g_1(x) = \frac{3}{4}x - 4$ $g_2(x) = -\frac{1}{2}x - 1$

څلورم - $g_1(x) = -\frac{1}{2}x + 2$ $g_2(x) = \frac{1}{2}x + 3$

پځم - $g_1(x) = \frac{2}{3}x + 2$ $g_2(x) = \frac{1}{2}x + 3$

شپږم - $g_1(x) = \frac{3}{4}x + 1$ $g_2(x) = \frac{1}{2}x + 2$

یا دا لاندې

د دوه کرښو غوڅتکی د دوه کرښو $g_1(x)$ او $g_2(x)$ توابع مساوات ورکړ شوي :

د دواړو کښو غوڅتکی وشمیری او کرښې په یوه بورت ولاړ سیستم (کوآرډینات سیستم) کې وکارئ (رسم کړئ)

لومړی: $g_1(x) = \frac{1}{2}x + 2$ $g_2(x) = -\frac{1}{2}x + 4$

$$g_1(x) = 2x - 1 \quad g_2(x) = -2x + 1 \quad \text{دویم:}$$

$$g_1(x) = \frac{3}{4}x - 4 \quad g_2(x) = -\frac{1}{2}x - 1 \quad \text{دریم:}$$

$$g_1(x) = -\frac{1}{2}x + 2 \quad g_2(x) = \frac{1}{2}x + 3 \quad \text{څلورم:}$$

$$g_1(x) = \frac{2}{3}x + 2 \quad g_2(x) = \frac{1}{2}x + 3 \quad \text{پنځم:}$$

$$g_1(x) = \frac{3}{4}x + 1 \quad g_2(x) = \frac{1}{2}x + 2 \quad \text{شپږم:}$$

د یوې $g_1(x)$ کرښې تابع مساوات ورکړ شوي دي. و $g_1(x)$ کرښې ته د عمود کرښې تابع مساوات وټاکي، که دا کرښه له P_1 ټکي تیره شي. د دواړو کرښو د قاطع ټکي یا غوڅتکي وشمیرئ او دواړه کرښې په افقي-عمودي سیستم قیمت وضعیه سیستم کې رسم کړئ.

$$g_1(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \quad \text{اوم -}$$

غواړو $g_2(x) \perp g_1(x)$ پیدا کړو، چې له $P_1(3 | -2)$ تیریږي.

$$g_1(x) = 2x - 1 \quad \text{اتم -}$$

غواړو $g_2(x) \perp g_1(x)$ پیدا کړو، چې له $P_1(-2 | 5)$ تیریږي.

$$g_1(x) = -\frac{4}{5}x + 3 \quad \text{نههم -}$$

غواړو $g_2(x) \perp g_1(x)$ پیدا کړو، چې له $P_1(-4 | -2)$ تیریږي.

$$g_1(x) = 2x + 3 \quad \text{لسم -}$$

غواړو $g_2(x) \perp g_1(x)$ پيداکړو ، چې له $P_1(2|-3)$ تيریږي.

د قیمتشمیرني څخه کار اخستنه یا استعمالونه :

د مالک لپاره ډېره مهمه ده، چې د هغه یوه جنس تولید سټ x وپېژني ، کوم چې په تولید کې منځ ته راغلي مصارف K د خرڅلاو څخه لاس ته راغلو E له لارې پوره کړي.

تعریف:

که د ثابتو توکو سره د $K(x)$ مصارفو تابع او تل لږلي مصارفو لپاره صدق وکړي:

ټول لگښت $= K(x) = K$ د تولید سټ $x +$ تل لږلي لگښت K_f

† $K(x) = k \cdot x + K_f$ که د توکو لگښت اوفیکس یا تل لړلي مصارف ثابت وي.

یادښت:

ټول لړلي مصارف د منځ ته راغلي لگښت تابع $K(x)$ دي چې په یوه فابریکه کې د x تولید د ډېری یوونونو یا سټ واحدونو (ME) یوه ضرب څخه منځ ته راغلي دي.

د داني ارزښت بهتر یې قیمت k ټول قیمت دی د داني په سر (دا اووښتونې یا متحول دانه قیمتونه هم بلل کیږي).

ځای په ځای یا فیکس قیمتونه K_f هغه قیمتونه دي، چې که تولید ونه شي هلته هم منځ ته راځي (گټه، کرایه، بیمه، معاشونه او داسې نور).

پیژند (تعریف):

د لاس ته راغلو پیسو تابع $E(x)$ په ثابت قیمت باور لري:

دخرځلاو پیسې $E(x) =$ قیمت P . ډېری x یعنی $E(x) = P \cdot x$

پام (یادونه): $\therefore$

هغه په نرخ یا قیمت p خرڅه شوي ډېری یا سټ د لاس ته راوړني ډېری هم بلل کیږي.

تعریف:

د گټې تابع $G(x)$ لپاره باور لري:

گټه: $G(x) = E(x) - K(x)$

پام (یادونه): ښه د $G(x)$ نتیجه کمیزه یا منفي وي، فابریکه زیان کوي، که $G(x)$ زیاتیزه یا مثبت وي، نو فابریکه گټه کوي.

که $G(x) = 0$ وي، نو لگښت $K(x)$ همدومره ستر دی، لکه لاس ته راوړنه $E(x)$.

دا ټکی د گټې پوله $Gewinnschwelle$ بلل کیږي.

بیلگه : یوه فابریکه،، ملفونونه (لاسي تلفونونه)،، جوړوي دانه په € 20 .

د فابریکې تللگښت د ورځې € 60000 دی.

د هر ،، ملفون،، خرڅلاو قیمت په دانه دی € 40.

فابریکه کړی شي د ورځې خورا زیات یا ماکسمال 4000،، ملفونه،، تولید کړي (د تولید توان یا کاپیټي پوله).

الف – د کوم تولید ډېری یا سټ سره فابریکه گټه کوي؟

ب - د کوم تولید ډېری سره فابریکه ماکسماله گټه کوي؟

پ – دا حالت په یوه مناسب کواورډینات سیستم کې گرافیکي انځور کړی.

الف - تابع مساوات ولیکي:

لگښت تابع : $K(x) = 20 + 60000$

خرڅلاو تابع: $E(x) = 40x$

$$G(x) = E(x) - K(x) = 40x - 20x - 60000 \\ = 20x - 60000$$

گټه تابع :

ردو: $G(x) > 0$

$$\Leftrightarrow 20x - 60000 > 0 \mid +60000 \\ \Leftrightarrow 20x > 60000 \mid : 20 \Leftrightarrow x > 3000$$

د یوه له $x = 3000$ پورته،، ملفونو،، د ورځې تولید ډېری فابریکه گټه کوي.

په $x = 3000$ تولید سره گټه $E(x)$ دومره ده لکه لگښت $K(x)$.


$$K(3000) = 20 \cdot 3000 + 60000 = 120000 \\ E(3000) = 40 \cdot 3000 = 120000$$

$$x_{\text{Max}} = 4000.$$

ب - په عظمي تولیدېږي یا - سټ کې د گټې پیداکونه

$$G(4000) = 20 \cdot 4000 - 60000 = 20000$$

د ورځې د 4000،، ملفونو، د تولید گټه عظمي ده، دا 20000 € ده.



پ -

یادونه: له پورته کښته ته ژباړه: د لگښت تابع، د خرڅلاو تابع، د گټې تابع د گټې شولې یا پوله کیدی شي د گټې په تابع هم د لگښت تابع د گراف د غوڅتکي له لارې هم د خرڅلاو د گراف سره پیدا کړای شي. د غوڅتکي x کواوردینات د گټې شولې یا هغه ورشو چې گټه به کې صورت نیسي) .. د هو د y کواوردینات په دې ځای کې لگښت ورکوي.

د ډېرۍ - او پیسو یوونونه یا - واحدونه په یوه فابریکه کې د تولید ډېرۍ د لویو دانو د تولید پروسه په گوته کوي، د بیلگې په توګه د ورځې Cd- Rohlinge 1.000 000. د تولید لگښت هم زیات وخت په میلیونو وي.

داسې ستر ګڼونه تل داسې ساده نه ګڼل کیږي. له دې امله د تولید شوو دانولپاره د ډېرۍ یوون یا - واحد کاروو او همداسې د لگښت پیسو واحدونو لپاره.

د بیلگې په توګه کیدی شي Cd- Rohlinge 1.000 000 په 10 ستواحدونو(ډېرۍ یوونو یا ME 10) کې سره راټول کړو، چیرته چې د ډېرۍ واحد د 100 000 دانو

لپاره ځای په ځای شوی دی. یعنې 100 000 دانې یو یوون یا واحد دی. همداسې لگښتونه د پیسو واحدونو (یوونونو) ته سره راټولیزې، د بیلګې په توګه € 9000 000 و 9 د پیسو واحدونو (یوونونو) ته (9 GE).

پرتله له دې د لګښت واحد (یوون) لپاره سړی په ټاکلې پیسو واحد (یوون) پورې مربوط نه دی

بیلګه:

د یوه ټاکلې تولید لپاره دې د لګښت تابع $K(x) = 0,3x + 4$ وي او د خرڅلاو تابع $E(x) = 1,1x$ د ګټې په پولې Break-even-Point کې ټول لګښتونه څومره جګ دي؟

$$G(x) = E(x) - K(x) = 1,1x - 0,3x - 4 = 0,8x - 4$$

د لږ Break-even-Point :

$$G(x) > 0 \Leftrightarrow 0,8x - 4 > 0 \mid +4 \Leftrightarrow 0,8x > 4 \mid : 0,8 \Leftrightarrow x > 5$$

ټول تولید: $K(5) = 0,3 \cdot 5 + 4 = 1,5 + 4 = 5,5$

د ګټې پوله Break-even-Point د 5 ME (د، ست واحد یا ډېری یوون، لپاره راغلی) شاو خوا کې پرتله ده، په دې ځای کې لګښت 5,5 GE (پیسو یوون لپاره) دی.

پوښتنې:

کرنیزې توابع برخه IV

لومړۍ –

د کرنیزو توابعو تابع ترمونه معلوم کړی، که باور ولري؛

$$\text{الف. } f(1) = 7; f(-1) = 3 \quad \text{ب. } f(a) = 0; f(0) = a \quad \text{پ. } f(a) = 1; f(2a) = -1$$

دویم –

کرنه وښایي، چې له $P_1(\sqrt{k} | k)$ او $P_2(1 | 1)$ تیرېږي، جگوالی $|a_1 = \sqrt{k} + 1|$ لري او y محور په $P_y(0 | -\sqrt{k})$ کې غوڅوي.

دریم –

وښایي: ټکی $P\left(\frac{k}{2}\sqrt{2} \mid k\right)$ د $k \in \mathbb{R}$ لپاره په یوه کرنه پوت دی.

د کرنې مساوات وټاکي

څلورم –

یوه کرنه چې له $P(2,5 | 0)$ تیرېږي د کوارډینات د محورونو سره یو درېکودۍ یا مثلث جوړوي. د کوم جگوالي سره دا مثلث برابر پښیز (مساوی الاضلاع) دی؟

پنځم –

تابع $f(x) = 3e^{-0.5x}$ $x \in \mathbb{R}$ ورکړ شوی.

د یوه کرنیز تابع $h(x)$ لپاره باور لري:


$h(0) = f(0)$ او $h(-2) = f(-2)$. $h(x)$ وټاکي.

شپږم –

لاندې څیرې د کرنیزو توابعو گرافونه خوندي لري.

د توابعو ترمونه وټاکي.

الف-	ب-
------	----



اوم -

د دواړو کرښو غوڅکي وټاکي او دا په یوه پروتولارسیستم کې رسم کړی.

الف - $f(x) = -3x + \frac{5}{4}$; $g(x) = -x - 1$ ب - $f: 2y - x = 3$; $g(x) = -\frac{1}{2}x + 4$

پ - $f(x) = -\frac{2}{3}x - 1$; $g(x) = \frac{1}{6}x - 4$ ت - $f: x = 2$; $g(x) = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{2}$

اتم -

دوه کرښې $f(x)$ او $g(x)$ د x محور په $x = 4$ کې غوڅوي .

ممکنه تابع ترمونه وټاکي.

$$a_1 = 1 \Rightarrow f(x) = x - 4$$

$$a_1 = 2 \Rightarrow g(x) = 2(x - 4) = 2x - 8$$

بېلګه:

پوښتنې

کرښیزې توابع برخه V

لومړی -

و آزمایې چې ایا کرښې g, h, i د یوه ټکي څخه تېرېږي.

الف - $g(x) = x + 1$; $h: 2y + x + 4 = 0$; $i: 3y - 5x = 7$

ب - $g(x) = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$; $h(x) = -\frac{2}{3}x + 2$; $i: 2x - y = 3$

دویم -

د دوه کرښو توابعو $f(x)$ او $g(x)$ ارزښت جدول ورکړل شوی دی.
د دواړو توابعو گراف چېرته قطع کوي؟

د د کوم x ارزښت لپاره صدق کوي $f(x) < g(x)$ ؟

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	1,5	3	4,5
$g(x)$	-1	1	3	5


دریم -

د دواړو توابعو غوڅتکی وښایی او په کواوردینات سیستم کې یې گراف انځور کړی.

$f(x) = 0,04x + 20$; $g(x) = 0,15x + 15$

څلورم -

د څلورو گرافونو سره شکل په پام کې ونیسئ.



پنځم —

دوه یو په بل نیغې ولاړې کرښې یو بل په $(-1 | -2)$ کې غوڅوي .

ممکنه کرښ مساوات ورکړی.

شپږم —

کرښه h په کرښه g نیغه ولاړه ده. د h جگوالی وټاکي.

الف — $a_{1g} = -0,5e$ ب — $a_{1g} = 2e^{-2}$ پ — $a_{1g} = \frac{1}{2}\sqrt{3}$

اوم —

یوه مجله، چې د اخستلو € 2,20 قیمت لري، 120 000 جلده (پوښه) چاپېري د بازار کشف دفتر په مرستع دوی کره کوي، چې د € 0,20 نرخ کمیدو په اساس مجله په 5000 پوښه زیاته خرڅیدي شي، د € 0,20 په ترڅ جگوالي د 5000 مجلو خرڅلاو یي کمیږي.

الف —

د 140 000 مجلو د چاپ قیمت وښایی

د y دانو په چاپ خومره د پوښ قیمت ورکوي.

ب –

کوم د خرڅلاو گڼون یا تعداد د چاپ خوني انتظار کېدی شي، که د مجلي قیمت په € 1,50 ټیټ کړي؟

2.4 د کرښیزو توابعو په مرسته

2.4.1 د ورځنیو ستونځو یا پرابلمونو حل:

د کرښیزو توابعو په مرسته ورځني ستونځوبي؟

بیلګه I:

ملک او سپین دواړه په روغتون کې د ناروغچوپړ په توګه په یوه بیارغونې روغتون کې کار کوي او دواړه همغه بنسټ معاش اخلي. په دې وخت کې باید دواړه زیات کار وکړي. د میاشتي په اخر کې دوی معاشونه سره پرتله کوي. د ملک نغد معاش €3559 دی، د سپین €3223. ملک په روانه میاشت کې ۴۳ ساعته زیات کار کړی او سپین فقط ۲۷ ساعته زیات کار کړی. بنسټ معاش او د زیات کار پیسې وېنایي.

د زیات کار وخت: x اخستل شوی ټول معاش: $f(x)$

دوه معاش حسابونه ورکړ شوي دي.

$$P_2(27 | 3223) \quad \text{او} \quad P_1(43 | 3559)$$

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3223 - 3559}{27 - 43} = \frac{-336}{-16} = 21 \Rightarrow f(x) = 21x + a_0$$

(a_1 = زیات کار پیسې a_0 = بنسټ معاش)

$$\begin{aligned} P_1(43 | 3559) \Rightarrow f(43) &= 3559 \Leftrightarrow 21 \cdot 43 + a_0 = 3559 \\ &\Leftrightarrow 903 + a_0 = 3559 \quad | -903 \\ &\Leftrightarrow a_0 = 2656 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x) = 21x + 2656$$

بنسټ معاش €2656 دی او د زیاتکار €21 .


بیلګه II

یو انرژي پلورونکی خپلو مشتریانو ته برېښنا په لاندې شرایطو وړاندې کوي:

یو kWh کیلو وات په ساعت د €0,14 په نرخ د میاشتي په €7,50 بنسټ پیسو .

الف – یو تابع ترم ولیکي. په یوه مناسب کواورډینات سیسم کې د 200 kWh پورې د برق مصرف ګراف وکاري.

- ب - د برېښنا د څلورو میاشتو لگښت € 150,40 دی. څومره برېښنا لگول شوې؟
- پ - یو دویم پلورونکی برېښنا په € 0,10 وړاندې کوي د میاشتې په € 10 بنسټ پیسو.
- د برېښنا پلورونکي بدلول د کوم لگښت څخه ګټور تماميږي؟



یادونه: حساب بی له یوونونو صورت نیسي، دا د هرې نتیجې سره ورزیاتیږي.


ب-ایښوونه: $f(x) = 0,14x + 7,50$ د میاشتې شمیرني لپاره باور لري.

د څلورو میاشتو لپاره بنسټ پیسې € 30 دي

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_4(x) &= 0,14x + 30 \quad P(x | 150,4) \\ \Rightarrow f_4(x) &= 0,14x + 30 = 150,4 \\ \Leftrightarrow 0,14x + 30 &= 150,4 \quad | - 30 \\ \Leftrightarrow 0,14x &= 120,4 \quad | : 0,14 \\ \Leftrightarrow x &= 860 \end{aligned}$$

د برېښنا لگښت په څلورو میاشتو کې 860kWh وو.

پ-



بیلگه III

د وېښو (د حیواناتو د خوراک څه) چمتووالي اوتومات ،، کولابیر،، شپون د ورځې 7,5 kg خوراکي موادو ته اړتیا لري. دولس ورځې د مخه چې دا د خوراک موادو ذخیره پکه شوې وه، هلته نور هم 250 kg خوراکي مواد شتون لري.

الف –

یو د تابع مساوات ولیکي، چې دا حالت تشریح کوي.

ب - دولس ورځې پخوا په څومره خوراکي موادو دا ذخیره پکه شوې وه؟

پ – د 50 kg څخه وروسته دا ذخیره بیرته د ب - په اندازه پکیري . دا کله اړین کیري.

حل –

الف - x محور : وخت په ورځو y محور : د وېښو یا خوراکي مواد په kg .

$$f(x) = -7,5x + a_0$$

$$P(12 | 250) \Rightarrow f(12) = 250 \Leftrightarrow -7,5 \cdot 12 + a_0 = 250$$

$$\Leftrightarrow -90 + a_0 = 250 | +90$$

$$\Leftrightarrow a_0 = 340 \Rightarrow f(x) = \underline{\underline{-7,5x + 340}}$$

ب - د پکولو وخت دی.

د پکوني وخت $x = 0$ دی.

$$\Rightarrow f(0) = -7,5 \cdot 0 + 340 = 340$$

د خوراكي موادو شتون 12 ورځ د مخه 340 kg وو.

پ -

$$f(x) = 50 \Leftrightarrow -7,5x + 340 = 50 | -340$$

$$\Leftrightarrow -7,5x = -290 | :(-7,5)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{580}{15} = \frac{116}{3} \approx 38,7$$

نږدې له 38,7 ورځو د مخه ذخيره بيرته پکه شوې.

بیلگه IV

د تلفون شرکت ،، ملفون ارزان،، (HB) وړاندې کوي:

هره د خبرو دقیقه € 0,06 قیمت لري، د میاشتنۍ بنسټیز قیمت € 8,50 سره.

د ،، ملفون ارزاني،، (HP) شرایط دي:

هر د خبرو دقیقه € 0,08 قیمت لري، د میاشتنۍ بنسټ قیمت € 5 سره.

(یوه سکیڅ ترتیب کړی)

الف – په څومره دقیقو کې دواړه قیمتونه برابر دي؟

ب – ته د میاشت د تلفون لپاره لري (پیسې نیا ورکوي) ته کوم شرکت ټاکي او د ټاکلي شرکت سره به څومره خبرې وکړي؟

پ – د الف او ب- نتیجې په یوه پروت ولاړ – یا کواوردینات سیستم کې انځور کړی.

حل :

$$\text{الف-} \quad \text{HB: } K_1(x) = 0,06x + 8,5 \quad \text{HP: } K_2(x) = 0,08x + 5$$

د لگښت برابر والی د دواړو کرښو په غوڅي کې شتون لري.

$$\begin{aligned} K_2(x) = K_1(x) &\Leftrightarrow 0,08x + 5 = 0,06x + 8,5 | - 0,06x \\ &\Leftrightarrow 0,02x + 5 = 8,5 | - 5 \\ &\Leftrightarrow 0,02x = 3,5 | : 0,02 \\ &\Leftrightarrow x = 175 \end{aligned}$$

$$K_1(175) = 0,06 \cdot 175 + 8,5 = 19$$

$$K_2(175) = 0,08 \cdot 175 + 5 = 19$$

له 175 دقیقو وروسته لگښت برابر دی.. (€ 19) .

ب –

HB :

$$\begin{aligned} K_1(x) = 25 &\Leftrightarrow 0,06x + 8,5 = 25 | - 8,5 \\ &\Leftrightarrow 0,06x = 16,5 | : 0,06 \\ &\Leftrightarrow x = 275 \end{aligned}$$


HP :

$$\begin{aligned} K_2(x) = 25 &\Leftrightarrow 0,08x + 5 = 25 | - 5 \\ &\Leftrightarrow 0,08x = 20 | : 0,08 \\ &\Leftrightarrow x = 250 \end{aligned}$$

د HB خدمتونه ارزان دي، ځکه چې د € 25 لپاره کېدی شي 275 دقیقې تلفون وشي.

برعکس یا په خټ د HP 25 € فقط د 250 دقیقو لپاره بسيا کوي.

پ –



پروت: وخت په دقیقه، ولاړ لگښت په یورو

بیلگه V

یو ه فابریکه کړی شي خورا زیات یخووني جوړ کړي (د کاپا څيتي پوله).

متحوله د داني لگښت ثابت دی او $k_v = 300 \text{ €}$ دی.

یخووني هر یو د 375 € قیمت باندې پلورل کیږي.

الف – قیمت تابع $K(x)$ پیدا کړی، چې د خرڅلاو تابع یې $E(x)$ ده او د گټې تابع یې د فابریکې لپاره $G(x)$ ده.

ب – د کوم تولیدېږی سره به د گټې پولې یا ورشو $Gewinnschwelle$ ته ورسېږو؟

په دې ځای کې ټول مصارف څومره دي همداسې لاس ته راوړنه؟

پ – د توانپولي پورې ګټه څوړمه لويه ده؟

حل-

الف-

$K_f = 90\,000 \text{ €}$ $k_v = 300 \text{ €}$ $p = 375 \text{ €}$ $K(x) = k_v \cdot x + K_f = 300x + 90\,000$ $E(x) = p \cdot x = 375 \cdot x$ $G(x) = E(x) - K(x) = 75x - 90\,000$	ځاي په ځای لګښت: متحول د داني لګښت: د خرڅلو قيمت: دلګښت تابع: د خرڅلاو ابع: د ګټې تابع:
--	---

ب – د ګټې پوله هغه ځای دی، چې هلته ګټه نه کېږي.

$$G(x) = 0 \Leftrightarrow 75x - 90\,000 = 0 \mid +90\,000 \Leftrightarrow 75x = 90\,000 \mid :75 \Leftrightarrow x = x_s = 1\,200$$

$$E(x_s) = E(1\,200) = 375 \cdot 1\,200 = 450\,000 = K(x_s)$$

د ورځني د 1200 تولیدې سره فابریکه ګټه کوي.

د ګټې پولې کې لګښت همدومره لوي دی لکه خرڅلاو. (€ 450 000)

پ – د توانپولي ګټه: $G(1500) = 75 \cdot 1500 = 22\,500$

په توان پولې ګټه € 22 500 ده.

بیلګه VI .

سپین د تلفون شرکت ،، ارزانه سرو یا -تلفون،، نرخ گوري

نرخ A : بنسټ نرخ € 5 د میاشتي لومړي لس ساعته مفت، پسي 0,5 Ct. / min .

نرخ B : بنسټ نرخ € 10 د میاشتي لومړي ۲۰ ساعته مفت، پسي 0,4 Ct. / min .

نرخ : د میاشتي ټولې پیسې یا Flatrate د میاشتي Flatrate 25 € / Monat.

د ورځې په منځنۍ توګه سپین دوه نیم ساعته سرف کوي.

الف – د هر نرخ لپاره د تابع مساوات ولیکي.

ب – په یوه مناسب پروت ولاړ سیستم یا کواوردینات سیستم کې د تابع ګراف سم کړی.


پ – روښانه کړی، څې له ګراف څخه ټول څه لوستل کړي (انترپریټیشن یا تشریح)

ت – د سپین لپاره مساعد نرخ وشمېری.

ټ – د نرخ A او B لپاره په کوم ټکي کې ارزښت برابر دی؟

ث – د کوم سرف وخت وروسته دې سپین فلېټ رېټ وټاکي؟

حل –



محور y: لګښت په یورو

محور x: وخت په ساعت

نرخ A :

$$0,5 \text{ Ct/min} = 30 \text{ Ct/h} = 0,3 \text{ €/h (Steigung)}$$

دلته ۶۰ دقیقې دي. 0,5Ct/min

(جګوالی)

$$\Rightarrow K_A(x) = 0,3x + a_0$$

۱۰ مفت ساعته په دي معنا دي، چې په لومړيو لس ساعتونو کي يواځي 5€ د بنسټلگښت راځي.

له دي لاس ته راځي $P(10;5)$

په دي ټکي کي د $K_A(x)$ گراف ځغلي

$$P(10|5) \Rightarrow K_A(10) = 5 \Leftrightarrow 0,3 \cdot 10 + a_0 = 5 \quad | -3 \\ \Leftrightarrow a_0 = 2$$

د نرخ A لپاره تابع مساوات: $K_A(x) = 0,3x + 2$

نرخ B:

$0,4 \text{ Ct/min} = 24 \text{ Ct/h} = 0,24 \text{ €/h}$
 0,4 Ct/min دلته 60 ساعته دي (جگوالی)

$$\Rightarrow K_B(x) = 0,24x + a_0$$

۲۰ مفت ساعتونه په دي معنا دي، چې په لومړيو ۲۰ ساعتونو کي فقط د ۱۰ يورو بنسټپيسي راځي،

$$\Rightarrow P(20;10)$$

په دي ټکي کي د $K_B(x)$ گراف ځغلي


$$P(20|10) \Rightarrow K_B(20) = 10 \Leftrightarrow 0,24 \cdot 20 + a_0 = 10 \\ \Leftrightarrow 4,8 + a_0 = 10 \quad | -4,8 \\ \Leftrightarrow a_0 = 5,2$$

د نرخ B د تابع مساوات: $K_B(x) = 0,24x + 5,2$

نرخ C : فلیٹ رېټ له ساعتونو خپلواک دی.

د C نرخ لپاره لپاره د تابع مساوات $F(\tilde{x}) = 25$ (د محور ته غبرگ)

ب -



پ - په نږدې 53 ساعتونو کې دواړه کرښې سره غوڅوي، په دې ټکي کې لگښت برابر دی.

تر 53 پور د A نرخ مساعد دی. د 53 او 82 ترمنځ د B نرخ مساعد دی. له 82 وروسته فلیټ رېټ ګټور دی.

ت - سپین د میاشتي 75 ساعته سرف کوي. په دې سرف نرخ کې د ده لپاره B مساعد دی:

د میاشتي د سرف دوام $2,5h.30 = 75St.$ ساعته:

$K_A(75) = 0,3 \cdot 75 + 2 = 24,50$	د A نرخ لگښت:
$K_B(75) = 0,24 \cdot 75 + 5,2 = 23,20$	د B نرخ لگښت:
$F(75) = 25$	د C نرخ لگښت:

$$\text{a) } f(x) = -2x + 2 \quad \text{b) } f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$$

$$\text{c) } f(x) = \frac{3}{4}x - 3 \quad \text{d) } f(x) = 3x - 6$$

د ویم -

د یوه کرښه جگوالی a_1 معلوم دی. پرته له دې یو ټکی P ورکړ شوی دی، چې په کرښه پروت دی. د تابع مساوات وټاکي او په یوه مناسب پروتولار سیستم کې یې گراف وکاري.

$$\text{الف - } a_1 = 1 \quad P(3|4) \quad \text{ب - } a_1 = -1 \quad P(-8|1)$$

$$\text{پ - } a_1 = \frac{1}{2} \quad P(4|3) \quad \text{ت - } a_1 = -\frac{1}{2} \quad P(-4|3)$$

دریم -

په یوه کرښه ټکي P_1 او P_2 ورکړ شوي دي. چې په کرښه پراته دي. د تابع مساوات وټاکي او په یوه مناسب پروتولار سیستم کې یې گراف وکاري

$$\text{الف - } P_1(3|4) \quad P_2(7|-1) \quad \text{ب - } P_1(-8|1) \quad P_2(2|-3)$$

$$\text{پ - } P_1(4|3) \quad P_2(-7|-1) \quad \text{ت - } P_1(4|2) \quad P_2(-4|-4)$$

څلورم -

لاندې مساوات په x پسي حل کړی.

$$\text{الف - } x - 5 = 9 \quad \text{ب - } 8 + x = 25 \quad \text{پ - } x - \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \quad \text{ت - } \frac{5}{9} = x - \frac{1}{3}$$

$$\text{ب - } 88 = 4x - 16 \quad \text{ث - } a + bx = 3b + a \quad \text{ج - } 8 - (x + 5) = 2 \quad \text{چ - } 9 + (5 - x) = 6$$

پنځم -

د وړوکتون بڼوونکي او بڼوونکي د زړه له کومې د مارکي،، بریښمن نمره 1،، کافي چښي. دا اوس د بوتل ذخیره 1,8 kg دانې ده. د اونی 350 g د کافي دانې د ماشین لپاره اړتیا شته.

الف - د تابع برابرول ولیکي، چې دا عمل روښانه کوي.

ب - له کوم وروسته د کافي ذخیره پای ته رسیږي.

پ - د کافي فرمایش پسي باید ورکړ شي، که د کافي بوتل 400 g پاتې ولري. دا حالت به کله وي؟

ت - په یوه مناسب پروتولار سیستم کې د تابع گراف رسم کړی.

شپږم -

يو موټروان A په 8:00 بجو له کندهار څخه د ننګرهار په لور خوزي.
 په همدې وخت کې موټروان B له ننګرهار څخه د کندهار په لور خوزي.
 د کندهار څخه تر جلال اباد دې د سرک اوږدوالی 750 km و (توکلي؟)
 موټروان A د 120 km/h منځنۍ چټکتيا سره ځي، موټروان B د 150 km/h
 منځنۍ چټکتيا سره ځي.
 په سرک دواړه موټروانان کله او چيرته سره مخامخ کيږي؟
 د دې حالت څخه يوه سکيڅې جوړه کړه او وشميره
 (لارښود: پروت = د وخت محور او ولاړ = د لار محور)
 اوم - د يوه بارانمرتبېان چې توتېهېنه د 1 m^2 بنسټ سطحې سره لري په ساعت کې 80
 ليتره باران ورځي.
 الف - د وخت t په واکوالي کې ډکجگوالي h روښانه يا تشرېح کړی، که په مرتبان کې
 له پخوا 150 (t = 0) ليتره وي..
 ب - د h او t ترمنځ اړيکې کرښيزې دي، که مرتبان خيتور يا د غونډوسکي په بڼه وي،
 نو؟

پوښتنې

کرښيز مساوات XV

لومړۍ -

پنځم - دا پوښتنه د مخه راغلي او دلته تکرار ده؟؟؟؟؟ ځواب يې هم شته.
 د وړوکتون ښوونکي او ښوونکي د زړه له کومې د مارکي،، برينکمن نمره 1،،
 کافي چې. دا اوس د بوتل زخيره 1,8 kg دانې ده. د اوني 350 g د کافي دانې د ماشين
 لپاره اړتيا شته.
 الف - د تابع برابرول وليکي، چې دا عمل روښانه کوي.
 ب - له کوم وخت وروسته د کافي زخيره پای ته رسيږي؟
 پ - د کافي فرمايش پسې بايد ورکړ شي، که د کافي بوتل 400 g پاتې ولري. دا
 حالت به کله وي؟
 ت - په يوه مناسب پروتولاړ سيستم (کواردينات سيستم) کې د تابع گراف رسم کړی.
 دويم: توبي او مري په يوه بيار غړني روغتون کې کار کوي او برابر معاش لري. په دې
 وخت کې بايد دواړه زيا تکاري وکړي. د مياشتې په اخر کې دوی خپل معاشونه سره پرتله
 کوي. د توبي معاش يې له ماليا € 3559، د ماري € 3223. توبي په رواني مياشت

کې 43 ساعته زیات کار کړي، ماري معکوساً فقط 27 ساعته کار کړي. بنسټ معاش وشمیرئ او د زیات وخت ټول معاش. دریم: د جلالکوټ ژوبن د،، کولاًخرس،، د وېښو ذخیرې اوتومات د ورځې 7,5 kg د حیواناتو وېښو ته اړتیا لري، دولس ورځې وروسته له هغط چط د وېښو ذخیره ډکه شوې، په ذخیره کط تراوسه 250 kg شته.

الف- یو تابع مساوات ولیکئ، چې داسې حالت تشریح کوي او دط ته اړوند گراف په یوه مناسب پروتولار یا کواوردینات سیستم کې وکارئ.

ب- کومه ډېرې یا سټ باندي دا ذخیره خای دولس ورځې د مخه ډک شوی وو؟

پ- په به دا بیرته هغه په کې ورکړشوي شتون باندي بیرته ډک شي. دا کله غوښتونئ دی؟

څلورم: د ،، تلفونچوپر مغازه،، (HB) هره د خبرو دقیقه € 0,06 قیمت لري، چط د میاشتي بنسټ نرخ € 8,50 وي..

د ،، ارزان ملفون،، (HB) شرطونه دي: هره دقیقه € 0,08 ، د میاشتي بنسټ نرخ € 5 سره. (یوه خبره رسم کړئ).

الف- له څو دقیقو وروسته د دواړو ملفونونو لگښت برابر دی؟

ب- تاسو د میاشتي € 25 په اختیار کې لری (نیا پیسې ورکوي).

کوم چوپر غواړط او دا ستا د خوښط تلفونمغازط سره څومره اوږد تلفونکړی شي؟

پ- د الف او ب نتیجط په پروتولار یا کواوردینات سیستم کط انځور کړئ.

پنځم —

په یوه هوټل کې د لمبا کوتي د گرمو اوبو چمتووالی لپاره د برېښنايي تیلگرمی ماشین ایښړل شوی. € 25000 د نرژۍ کلني لگښت راځي. د لرگرمی له لارې یوځلي € 50000 لگښت راځي. په دې پسي د نرژۍ لگښت فقط € 5000 په کال دی.

الف — په کوم وخت کې دا پیسې خای نیسي؟ د دې وخت لپاره لگښت څومره دی؟

ب – د دې گراف وکارۍ.

شپږم –

له گنيو څخه پوره يا گوره جوړيږي (د گنيو او خوږې ترمنځ کربنيزې اړيکې وړاندنيونه ده) يو د تابع ترم $f(x)$ تشرېح کوي، چې څومره کيلوگرامه خوږه د $x \text{ kg}$ څخه لاس ته راځي.

الف – د تابع ترم $f(x)$ وټاکۍ.

ب – وشميرۍ: $f(100)$; $f(250)$; $f(x) = 25$

پ – د $f(x)$ گراف وکارۍ.

اوم –

سپين همدا اوس د طب درس په بري پای ته ورساوه او طبي بدلونپروگرام کې برخه اخلي. دا د يوه کال لپاره USA ته ځي. په المان تودوخي په درجه څلزيوس $^{\circ}\text{C}$ او امريکاکې په فارنهایت $^{\circ}\text{F}$ کچيږي. سپين او څر له درس څخه پوهيږي، چې د دواړو تودوخيو ترمنځ يو کربنيزه اړيکه شتون لري او 0°C د 32°F تودوخي او 100°C د 212°F تودوخي ده. دوی د يوه تابع برابرون ته اوتيا لري، چې دوی دا تودوخي زر په هغه خپل ورسره بلده درجه وارولۍ شي.

الف – د سپين لپاره يو تابع مساوت وضعه کړۍ، چې له $^{\circ}\text{F}$ څخه په $^{\circ}\text{C}$ شمېرېدلون اجازه ورکوي.

ب- د څر لپاره يو تابع مساوت وضعه کړۍ، چې له $^{\circ}\text{F}$ څخه په $^{\circ}\text{F}$ شمېرېدلون اجازه ورکوي.

پ – په يوه د لمبا اخور کې تودوخي 95°F ده، دا څومره $^{\circ}\text{C}$ وه؟

ت – د د يوه تودوخي 40°C تبه ټيټېدونکي کار بايد سر ته ورسېږي. دا په $^{\circ}\text{F}$ کومه تودوخي ده؟

پوښتنې

کرنیز مساوات XVI

لومړۍ: یوه د میوې وېستنې فابریکه په خپل موټر د څښاک کارتن د رسولو لپاره په هره کارتن $0,80 \text{ €}$ د میاشتي فیکس یا ځای په ځای لگښت 840 € شمیري.

الف – د x کارتنونو د رسولو د لگښت لپاره یو د لگښت تابع منځ ته راوړی. د 2500 کارتنونو د رسولو لپاره څومره لگښت منځ ته راځي؟

ب – یو د موادو رسولو شرکت د څښاک موادو رسولو لپاره په هر کارتن $1,15 \text{ €}$ وړاندیز کوي. د x کارتنونو د رسولو د لگښت یو ترم ولیکی. د کوم د رسولو ګڼون یا –تعداد لپاره د رسولو شرکت لگښت مساعد ده؟

پ- د میوې فابریکې ته یو وړاندیز وړاندې کړی، چې د لگښت سپما د 4000 کارتنونو سره به 680 € وي.

دویم –

په یوه ملي اقتصاد موډل کې مصارف کرنیز د چمتوالي معاش په واک کې دي. د یوه 1000 € معاش سره لگښت 900 € دی. د 1800 € معاش سره به 1460 € وي.

الف – د مصرف تابع K لپاره تابع ترم ولیکی.

ب – د مصرفوني جگوالی وشمیری که معاش 800 € همداسې 2500 € ، همداسې 4000 € وی.

پ- د مصرفکچه (quote) د معاش برخه ده چې د مصرف لپاره کارول کیږي ((Konsumquote = Konsum / Einkommen)) د مصرف کوونکي د په ب – کې معاش څخه وټاکي. کومې ټولیزې اویکې د مصرف کوونکو او معاش ترمنځ شتون لري؟

ت- د معاش زیاتوالی dx دی. څو په سلو کې د معاش زیاتوالی د مصرف لپاره ورکړ شوی دی؟

ټ- کوم تابع S د معاش په واکوالي کې د سیماتوان تشریح کوي. تابع K او S
گرافیکي انځور کړی. د S صفرځای کوم غوره والی لري؟

دریم -

یو اوسپنه وړونکی $l_0 = 85 \text{ m}$ اوږد دی او د پرسېښي ضریب یې

$$\alpha = \frac{12 \cdot 10^{-6}}{\text{K}} \quad (\text{K} \triangleq \text{Grad Kelvin})$$

دی. یو تابع ترم $l(\Delta t) = l_0 + \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta t$ د اوسپنې باروړونکي اوږدوالی په گوته
کوي، د په K تودوخې Δt په واکوالي کې.

الف - د دې اوسپنې وړونکي د تابع ترم ورکړی

ب- د لاندې تودوخې تغیر سره د اوسپنې وړونکي اوږدوالی و شمیرئ.

: 30 K ; 60 K ; 40 K.


پ- اوسپنه وړونکی باید څومره اوږدوي، چې د 25 K تودوخې په جگوالي د اوږدوالی
تغیر 25 mm وکړي؟

پوښتنې


کرنیز توابع برخه XVII

لومړۍ: څیره د یوه کرنیز لگښت گراف ښايي (ټول لگښت)


الف- له گراف څخه ځای په ځای لگښت راواخلئ او متحول دانه قیمت په € سره
ورکړئ. د یوه x ډېرئ یونونو یا ست واحدونو (ME) تولید سره ټول لگښت K
ورکړئ.



دویم: د تنیس توپونو تولید لپاره لگښت K کرښیز د تولید شوو توپونو تعداد x په واک کې دی.



درېم: د دې لپاره چې یوه فنر (بنکه) د فنرتلې په څیر وکارولی شو، په فنر باندې اغیزمنه وزنوزور F_G (په نیوتون N) او د فنر تغیر x (په cm) تر منځ اړیکو څخه کره یا ټاکل کېږي.



څلورم: د یو نړیوال جال چلوونکی مشتریانو ته لاندې وړاندیز وړاندې کوي:

۵۰ ساعته انټرنټ، ټول لګښت € 27,50 . هره پسي دقیقه 1 Ct سنت.

دوه تاريف مودولونو باندې کار وکړئ، چې د انټرنټ استعمال کوونکي ته د ۵۰ ساعتو لپاره همدا یا برابر شرایط ورکړي.

الف- ترخ ۱ بي له بنسټلګښت.

ب- نرخ ۲ : د € 8 بنسټلګښت.

پ-د ۵۰ ساعته څخه زیات د کارولو دوام لپاره کوم تاريف یا نرخ مساعد دی؟

پوښتنې

کرنیز مساوات برخه XVIII

لومړۍ: چټک رستورانټ، MC – پومس(په غوړو کې سره یاپاخه شوي الوګان)، د پومس لوبښي لپاره هره ورځ تازه غوړیو ته اړتیا لري. تر اوسه په زخیره کې 250 kg شته دي.

الف- د تابع مساوات ولیکئ او په یوه مناسب پروت-ولار- یا کواورډینات سیستم کې یې ګراف وکارئ.

ب - د 95 kg زخیري وروسته د رستورانټ مشر باید د نورو فرمایش وکړي. له څومره ورځو وروسته باید فرمایش صورت ونیسي.

پ-دا غوړي ترکومه وخت رسیږي، که پسي فرمایش ورته کړای شي؟

دویم: د ،،رېنسن،، اسونو تیل په پاک شي او له تازه وخو ته تیاری ونیول شي. د ورځي $2,5 \text{ m}^3$ سره ټولیري. ډېران یو د 17 m^3 ډکي یا حجم لري. ماکسیمال یا خورا زیات 50 m^3 سره زخیره کیدی شي.

الف- یو تابع مساوات ولیکئ چې دا حالت تشریح کوي او اړونده ګراف یې په یوه مناسب پروت-ولارسیستم کې وکارئ.

ب – له کوم وخت وروسته باید سره یو وړل شي؟

پ-څو ورځي د مخه د اخر ځل لپاره سره وړل شوې وه؟

دریم: اړین د ،،اران سرف،، نرخ ګوري

نرخ A : اساسي یا بنسټ نرخ € 5 د میاشت لومړي لس ساعتونه ازاد دي، بیا 0,5 Ct په دقیقه.

نرخ B : اساسي یا بنسټ نرخ € 10 د میاشتي لومړي شل ساعتونه ازاد، بیا

0,4 Ct. / min. یا په دقیقه.

نرخ C : Flatrate یا په یوځل نرخ € 25 د میاشتي .

په منځنۍ کچه اړمین د ورځي دویم ساعته سرف کوي یا نړیوال جال ګوري.

الف- د هر نرخ پاره د تابع مساوات وليکئ.

ب- په يوه مناسب پروتولار- يا کواوردينات سيستم کې گرافونه وکارئ.

پ- ټول څه تشرېح کړئ، چې له گرافونو څخه لوستل کېږي (Interpretation).

ت- د ارمين لپاره مساعد نرخ وشميرئ يا پيدا کړئ.

ټ- د نرخ A او B لپاره په کوم ټکي کې د نرخ برابروالی برلاسی دی؟

ث- له کوم سرف وخت څخه د ارمين لپاره فلاتريټ يا ټولنرخ مساعد دی

څلورم: لوگر او علي د ملفون(لاسي تلفون) د قرارداد شرايط هيڅ نه دي لوستلئ.

دواړه غوښتنه لري، چې هغه مساعد قرارداد وکړي او دواړه په لاندې داتا باندې تکیه کوي:

لورا € 10,10 ورکوي، که هغه د مياشتني ديرش دقيقې تلفون وکړي او € 13,70 که هغه شپيته دقيقې تلفون وکړي.

علي € 10,10 ، که هغه د مياشتني ديرش دقيقې تلفون وکړي او € 15,20 که هغه د مياشتني اتيا دقيقې تلفون وکړي.

الف- د دواړو قراردادونو لپاره تابعمساوات وليکئ.

ب- دواړه گرافونه په يوه مناسب پروتولار- يا کواوردينات سيستم کې وکارئ.

پ- له دې دواړو کوم يو مساعد قرارداد لري. نتيجه يې مدله کړئ.

پنځم: يو د انرژي قرارداد د نرخمودل د مياشتني بنسټ نرخ G او يوه لگښتقيمت p pro kWh په يوکيلووات په ساعت څخه جوړ دی.

له دې سره يوه کرښيزه اړيکه منځ ته راځي: $K(x) = p \cdot x + G$

لاندې نرخ راته جمتو لرو:

يو کيلووات قيمت په يورو	د مياشتني لگښت په يورو	نرخ
-------------------------	------------------------	-----

Tarif I	11,80	0,157
Tarif II	9,00	0,172
Tarif III	14,40	0,135
Tarif IV	18,50	0,125

الف: د هر نرخ لپاره تابع مساوات وليکئ او په يوه مناسب پروتولار- يا کواوردينات سيستم وکاوئ.

ب- د 800 kWh (800 کيلرواټ په ساعت کې) د منځنئ کورنئ مياشتني لگښت مساعد پلورونکي پيدا کړئ.

پ- په پروتولار- يا کواوردينات سيستم کې د کرښو غوڅتکي څه مفهوم لري؟

شپږم: کرښيزه تابع $f(x) = 0,4x - 2$ ورکړښوي. د تابع گراف د x محور په زياتيز يا مثبت لور په 4 يوونونو يا واحدونو راکښل کيږي. د راکښلي کرښې تابعترم $g(x)$ وټاکئ. $g(x)$ څنگه له $f(x)$ څخه جوړېدی شي؟

پوښتنې

کرښيز توابع برخه VIII

لومړی: يوه کرښه K_f د هغه د مساوات له لارې ورکړ شوې ده. تابع مساوات $f(x) = a_1x + a_0$ يې وليکئ او د هر گراف په يوه مناسب کواوردينات سيستم کې وکاوئ.

الف - $K_f : 2x - 3y = 7$ ب - $K_f : 3y - 4x - 1 = 0$ پ - $K_f : y - 95x = 0$

$$\text{ت. } K_f: \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \quad \text{ب. } K_f: -\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1 \quad \text{ث. } K_f: y = \sqrt{3}(x-2)$$

دویم: کرښیز تابع $f(x)$ د $f(x) = 1,25x + 1,5 \quad x \in \mathbb{R}$ سره ورکړ شوی دی.

$$\text{الف- د تابع ارزښتونه وشمیرئ: } f(0); f(-1,5); f(0,7); f(\pi); f\left(\frac{\pi}{2}\right); f(u)$$

ب: تابع په کوم ځای کې ارزښت 5- لري؟

پ- د کوم افقي قیمت لپاره ارزښتونه مثبت (زاتیز) دي؟

ت- وښایئ، چې $f(u+2) - f(u)$ له u خپلواک دی.

دریم: د لاندې کرښو مساواتو محور غوڅټکي وټاکئ او په یوه کواورډیناتسیستم کې یې گرافونه رسم کړئ.

$$\text{الف - } f(x) = -\frac{3}{2}x + 4 \quad \text{ب - } f(x) = -4x - 3,5 \quad \text{پ - } f(x) = \frac{3}{7}x - 3$$

$$\text{ت - } f(x) = \frac{x}{6} + \frac{5}{6} \quad \text{ب - } f(x) = 2(x + 1,25) \quad \text{ث - } f(x) = -\frac{8}{3}x + \frac{5}{4}$$

څلورم: د غبرگو مساوات و کرښې د $g(x) = -2x + 4$ سره د ټکي $P(-3|1)$ له لارې وټاکئ.

پنځم: کرښه د تابع مساوات $f(x) = 1,5x$ سره په کواورډیناتسیستم کې رسم کړئ. بې له نورو مرستندویو موادو دا لاندې کرښې هم ور رسم کړئ.

$$g(x) = 1,5(x-2); h(x) = 1,5x - 2; i(x) = 1,5(-x); j(x) = 1,5(2x)$$

شپږم: فیرما "Big Beauty" د شونډورنگ "Amore" تولیدوي. دا په تولید کې منځ ته راغلي لگښتونه د د تولید شوو دانوتعداد پېچ واک کې یا تابع دي. د $x = 100$ دانو په تولید سره € 385 لگښت منځ ته راځي، د $x = 200$ دانو په تولید سره € 410 لگښت منځ ته راځي. د دانوتعداد او د منځ ته راغلو لگښتونو ترمنځ یوه کرښیزه اړیکه شتون لري.


الف- د لگښت ت ابع وليکئ.

ب- د $x = 140$ دانو توليد سره د داني لگښت څومره دی

پ- د خورا زياتو دانو توليد سره د داني لگښت د کوم ارزشت لور ته هڅيږي؟

ت- په کوم ډېرئ يا سټ x سره د گټې ساحه پرته، که د هر شونډو رنگ خرڅلاو قيمت $5,20 \text{ €}$ لاس ته راوړل شي؟

ټ- د $K(x)$ (دلگښت تابع) او $E(x)$ (د خرڅلاو تابع) گرافونه په يوه کواورډيناتسيستم کې وکارئ.



کرنيز برابرېون يا - مساوات

برخه X

لومړی: د يوه کرنيز تابع د تابع ترم دی:

$$f(x) = \frac{4}{3}x - 2$$

الف- ټکی $A(u|-1)$ په گراف پروت دی. u وټاکئ

ب - د $f(x)$ صفرځايونه وټاکئ

پ- د x د کوم ارزښت لپاره باور لري $f(x) > 1$ ؟

ت-د $f(x)$ ارزښتدېری یا سټ وټاکي، که $D_f = \{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$ وي.

ټ-د $f(x)$ گراف داسي و کښوي، چې کښول شوي کرښه د x -محور په $x=-2$ کې غوڅه کړي.

دویم: دوه توابع $f(x)$ او $h(x)$ ورکړي. د کرښیز تابع $h(x)$ گراف له سرچینې یا پیل څخه تیريږي.

$h(x)$ وټاکي، که $h(x)=f(0)$ او $f(x)=2e^x; x \in \mathbb{R}$ وي.

دریم: د کرښیز تابع $f(x)$ سفرځایونه او وټاکي، که لاندې اړیکې معلومي وي:

$$f(-4) = 2$$

$$f(1) = -4$$

څلورم: وښايي:

ټکي $P_3\left(-\frac{\pi}{2} \mid 3\right)$ او $P_1\left(\frac{\pi}{2} \mid -1\right); P_2\left(\frac{3\pi}{2} \mid -5\right)$ په یوه کرښه پراته دي.

پنځم: کرښه g داسي راکښل کيږي، چې راکښلي کرښه h له ټکي P څخه تیريږي. د h مساوات یا برابرې وټاکي.

$$g(x) = -0,25x + 1 \quad P(3 \mid 4)$$

شپږم: د د کومو ارزښتونو لپاره کرښه په ټکو $P_1(0 \mid 1,5k)$ او $P_2(\sqrt{3}k \mid 2k)$ کې

جگوالی $a_1 = 1$ لري؟

اوم: حل کړي:

الف- $f(x) = 0,5x - 3$. د $f(x) > 0$ لپاره د x -ارزښتونه وټاکي

ب- $g(x) = 1,25x$; $f(x) = 0,5x - 3$. غوڅنکي وټاکي.

اتم: په يوه زخيره ټانک کې 9500 لیټره اوبه پرتې يا خوندي دي. هره وځ له ټانک څخه 160 لیټره اوبه وېستل کېږي.

الف- د دې (شي) حالت لپاره تابع مساوات ولیکئ.

ب-له څومره ورځو وروسته ټانک تشیږي؟

پ- د تابع گراف وکارئ.

نهم: یو بایسکلځغاستی A په یوه وختځغاسته کې دچټکتیا منځ ارزښت 25 km/h ته رسیږي.

بایسکلځغاستی B 20 دقیقې د A څخه وروسته خوزي او یو منځنی چټکتیا 45 km/h ته رسیږي.

چیرته او کله بایسکلځغاستی B و A ته رسیږي؟ یوه سکیڅي چمتو کړئ.

۴ -- کرښیز مساوات سیستم د ۲ برابر ونونو او ۲ اوښتونو سره.

داسې سیستم له دوه برابر ونونو یا مساواتو څخه جوړ دی. غوښتونۍ د دواړو مساواتو گډ حل دی. مختلفي تلنلارې شته، چې سړی حل ته ورسیري

په لاندې einsetzen in = په ... کې ایښوول.

د جمعي تلنلار:

د حل پل (قدم) غوڅي (قطاع، که قطعه؟) د جمعي تلنلار ته لومړۍ امکان یا واریانت	مساوات سیستم: $\begin{array}{l} \text{(I)} \quad 5x - 2y = 1 \\ \text{(II)} \quad 3x + 3y = 9 \end{array}$
لومړۍ: مساوات ورته داسې ښه بدل کړئ، چې ضریبونه (ترمخ عددونه یا ځلوني) د y متحولې تر مخنځنۍ پورې سره سروخوري.	$\begin{array}{l} \text{(I)} \quad 5x - 2y = 1 \mid \cdot 1,5 \\ \text{(II)} \quad 3x + 3y = 9 \\ \hline \text{(I)} \quad 7,5x - 3y = 1,5 \\ \text{(II)} \quad 3x + 3y = 9 \end{array}$
دویم: منځ ته راغلي مساوات سره جمعه کړئ او د x - متحولې پسې پي حل کړئ	$\begin{array}{l} \text{(I)} \quad 7,5x - 3y = 1,5 \\ \text{(II)} \quad 3x + 3y = 9 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \end{array}} \right\} +$ $10,5x = 10,5 \mid : 10,5$ $\Leftrightarrow \underline{\underline{x = 1}}$
دریم: د x لپاره میندل شوي ارزښتونه د دواړو څخه په یوه مساوات کې کیږدئ او y پسې پي حل کړئ. څلورم: حلست یا حلېږئ ولیکئ	په $3x + 3y = 9$ کې ایښوونه: $x = 1$ $\begin{array}{l} 3 \cdot 1 + 3y = 9 \\ \Leftrightarrow 3 + 3y = 9 \mid -3 \\ \Leftrightarrow 3y = 6 \mid : 3 \\ \Leftrightarrow \underline{\underline{y = 2}} \end{array}$

	$L = \{(1 2)\}$
--	-------------------

پنجم:

از مابینت د اینوونی له لاری

$$(I) \quad 5x - 2y = 1 \Rightarrow 5 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 \Leftrightarrow 5 - 4 = 1 \Leftrightarrow 1 = 1 \quad (w)$$

$$(II) \quad 3x + 3y = 9 \Rightarrow 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 9 \Leftrightarrow 3 + 6 = 9 \Leftrightarrow 9 = 9 \quad (w)$$

د اینوونی تلنلار: د اینوونی تلنلار لپاره د حل پلونه (قدمونه) وارینت 1	مساواتسیستم (I) $5x - 2y = 1$ (II) $3x + 3y = 9$
لومړی: مساوات (I) د x پسې حل کیري.	(I) $5x - 2y = 1 +2y$ $\Leftrightarrow 5x = 2y + 1 : 5$ $\Leftrightarrow x = \frac{2}{5}y + \frac{1}{5}$
دویم: د بني اړخ میندل شوی ترم په مساوات (II) کې اینوول کیري او د y پسې حل کیري.	$x = \frac{2}{5}y + \frac{1}{5}$ eingesetzt in (II): $3x + 3y = 9$ $3 \left(\frac{2}{5}y + \frac{1}{5} \right) + 3y = 9$ $\Leftrightarrow \frac{6}{5}y + \frac{3}{5} + 3y = 9 - \frac{3}{5}$ $\Leftrightarrow \frac{6}{5}y + 3y = 9 - \frac{3}{5}$ $\Leftrightarrow \frac{21}{5}y = \frac{42}{5} \cdot 5$ $\Leftrightarrow 21y = 42 : 21$ $\Leftrightarrow \underline{\underline{y = 2}}$

دریم: د y لپاره میندل شوی ارزښت
په یو د دې دوه وتونمساواتو کې
ایښوول کېږي، دا بیا په x پسې حل
کېږي.

$$y = 2 \text{ eingesetzt in (II): } 3x + 3y = 9$$

$$3x + 3 \cdot 2 = 9$$

$$\Leftrightarrow 3x + 6 = 9 \quad | -6$$

$$\Leftrightarrow 3x = 3 \quad | : 3$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{x = 1}}$$

څلورم: د حل سټ ولیکئ

$$\underline{\underline{L = \{(1 | 2)\}}}$$

پنځم: د ایښوولو له لارې حل

$$(I) \quad 5x - 2y = 1 \Rightarrow 5 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 \Leftrightarrow 5 - 4 = 1 \Leftrightarrow 1 = 1 \quad (w)$$

$$(II) \quad 3x + 3y = 9 \Rightarrow 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 9 \Leftrightarrow 3 + 6 = 9 \Leftrightarrow 9 = 9 \quad (w)$$

مساواتسې د حل پلونه (قدمونه) د ایښوولو تلنلار لپاره
ستم

$$x - 2y = 1 \quad \text{واریانت 2}$$

$$x + 3y = 9$$

لومړۍ: مساوات (II) د متحولې y پسې حل کېږي.

$$9 - 3x$$

$$9 - 3x \quad | : 3$$

$$3 - x$$

$$5x - 2y = 1$$

دویم: دښی لور میندل سوی ترم په مساوات (I) کې کیردی او په x پسې یې حل کړی.

3.

$$x + 3y = 9$$

دریم: د x لپاره میندل شوی ارزښت په یو د دې دوه وتونمساوتو کې ایښوول کیري، او دا بیا د متحولې y پسې حل کیري.

$$\text{څلورم: جلست وليکئ} = \underline{\underline{\{(1 \mid 2)\}}}$$

پنځم: ازماښت د ایښوولو له لارې

$$(I) \quad 5x - 2y = 1 \Rightarrow 5 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 \Leftrightarrow 5 - 4 = 1 \Leftrightarrow 1 = 1 \quad (w)$$

$$(II) \quad 3x + 3y = 9 \Rightarrow 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 9 \Leftrightarrow 3 + 6 = 9 \Leftrightarrow 9 = 9 \quad (w)$$

ټولې درې تڼلارې د هغه د واریانتو سره په یوه ټکلي مساوتسیستم وکارول شو. که څوک یوگوني تڼلارې ټیک وگوري، پیژني، چې په واریانت ۲ کې لږ د شمیرلو کار غوښتونی دی.

په یوه ټاکلي تڼلار د شمیرلو کار د دې حل کونکي مساوتسیستم په واک کې دی. له دې امله دې لومړی پام وشي، چې کومه تڼلار د لږ کار سره سرته رسیدی شي. د دې لپاره نو یو څو بیلگو ته اړ یو. لاندې بیګي دې د دې لپاره یوه کوچنۍ مرسته وي، چې مناسب د حل – یا ځواب تڼلار پیدا شي.

۴ . ۱ - د مناسب ځواب تڼلار لپاره بیلګې

--	--

بیلګه ۱ :

$(I) \ y = 7x + 8$ $(II) \ y = -2x - 1$ د برابر ایښوونې لار $7x + 8 = -2x - 1 \quad +2x$ $\Leftrightarrow 9x + 8 = -1 \quad -8$ $\Leftrightarrow 9x = -9 \quad :9$ $\Leftrightarrow \underline{\underline{x = -1}}$	$x=1$ په (1) کې ایښوونه $y=7x+8$ $\left \begin{array}{l} y = 7 \cdot (-1) + 8 \\ \Leftrightarrow y = -7 + 8 \\ \Leftrightarrow \underline{\underline{y = 1}} \end{array} \right.$ حل: $L = \{(-1 1)\}$ ازمایښت $\left \begin{array}{l} (I) \ y = 7x + 8 \Rightarrow y = 7 \cdot (-1) + 8 \\ \Leftrightarrow y = -7 + 8 \Leftrightarrow y = 1 \ (w) \\ (II) \ y = -2x - 1 \Rightarrow y = -2 \cdot (-1) - 1 \\ \Leftrightarrow y = 2 - 1 \Leftrightarrow y = 1 \ (w) \end{array} \right.$
--	--

بیلکہ ۲:

$\begin{aligned} \text{(I)} \quad 2x + 4y &= 8 \\ \text{(II)} \quad 2x - 5y &= 35 \end{aligned}$ د جمعې لار: $\begin{aligned} \text{(I)} \quad 2x + 4y &= 8 \\ \text{(II)} \quad 2x - 5y &= 35 \quad \cdot (-1) \\ \hline \text{(I)} \quad 2x + 4y &= 8 \\ \text{(II)} \quad -2x + 5y &= -35 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{(I)} \quad 2x + 4y &= 8 \\ \text{(II)} \quad -2x + 5y &= -35 \end{aligned}} \right\} + \\ \hline 9y &= -27 \quad : 9 \\ \Leftrightarrow y &= \underline{\underline{-3}} \end{aligned}$	$y=3 \text{ اېښوونه په (1) کې}$ $2x+4y=8$ $\begin{aligned} 2x - 12 &= 8 \quad +12 \\ \Leftrightarrow 2x &= 20 \quad : 2 \\ \Leftrightarrow x &= \underline{\underline{10}} \end{aligned}$ حل: $\bar{L} = \{(10 -3)\}$ ازماېښت $\begin{aligned} \text{(I)} \quad 2x + 4y &= 8 \Rightarrow 2 \cdot 10 + 4 \cdot (-3) = 8 \\ \Leftrightarrow 20 - 12 &= 8 \Leftrightarrow 8 = 8 \quad (w) \\ \text{(II)} \quad 2x - 5y &= 35 \Rightarrow 2 \cdot 10 - 5 \cdot (-3) = 35 \\ \Leftrightarrow 20 + 15 &= 35 \Leftrightarrow 35 = 35 \quad (w) \end{aligned}$
---	---

بیلکہ ۳:

$\begin{aligned} \text{(I)} \quad x + 2y &= 5 \\ \text{(II)} \quad -x + y &= 1 \end{aligned}$ د اېښوونې لار: (II) په y پسې حل کړئ	$X=1 \text{ په (1) کې کړدئ } x+2y=5$ $\begin{aligned} 1 + 2y &= 5 \quad -1 \\ \Leftrightarrow 2y &= 4 \quad : 2 \\ \Leftrightarrow y &= \underline{\underline{2}} \end{aligned}$ حل: $L = \{(1 2)\}$
--	--

$-x + y = 1 \quad +x$ $\Leftrightarrow y = x + 1$ پہ (I) کی کیردی $x+2y=5$ $x + 2(x + 1) = 5$ $\Leftrightarrow x + 2x + 2 = 5 \quad -2$ $\Leftrightarrow 3x = 3 \quad : 3$ $\Leftrightarrow \underline{\underline{x = 1}}$	ازماہنت $(I) \quad x + 2y = 5 \Rightarrow 1 + 4 = 5$ $\Leftrightarrow 5 = 5 \quad (w)$ $(II) \quad -x + y = 1 \Rightarrow -1 + 2 = 1 = 35$ $\Leftrightarrow 1 = 1 \quad (w)$ د رشتیا لپارہ
--	--

بیلگہ ۴ :

$(I) \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2$ $(II) \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} = 4$ د زیاتون یا جمعی لار: $(I) \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2 \quad \cdot 2$ $(II) \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} = 4 \quad : (-2)$ $\left. \begin{array}{l} (I) \quad \frac{6}{x} - \frac{5}{y} = 4 \\ (II) \quad -\frac{6}{x} - \frac{5}{y} = -2 \end{array} \right\} +$ $-\frac{10}{y} = 2 \quad \cdot y$ $\Leftrightarrow -10 = 2y \quad : 2$ $\Leftrightarrow -5 = y$ $\Leftrightarrow \underline{\underline{y = -5}}$	$(I) \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2$ $y = -5$ ایښوونه په کې حل: ازمایښت
---	---

127

$$\frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2$$

$$| \frac{12}{x} + \frac{10}{y} = 4$$

Additionverfahren :

$$\frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2 \quad | \cdot 2$$

$$| \frac{12}{x} + \frac{10}{y} = 4 \quad | : (-2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{6}{x} - \frac{5}{y} = 4 \\ -\frac{6}{x} - \frac{5}{y} = -2 \end{array} \right\} +$$

$$-\frac{10}{y} = 2 \quad | \cdot y$$

$$-10 = 2y \quad | : 2$$

$$-5 = y$$

$$\underline{\underline{y = -5}}$$

$$y = -5 \text{ eingesetzt in (I) } \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2$$

$$\frac{3}{x} - \frac{5}{2(-5)} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{x} + \frac{1}{2} = 2 \quad | -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{x} = \frac{3}{2} \quad | \cdot x$$

$$\Leftrightarrow 3 = \frac{3}{2}x \quad | \cdot \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{x = 2}}$$

$$\text{Lösung: } L = \{(2 | -5)\} \quad x, y \neq 0$$

Probe :

$$(I) \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2 \Rightarrow \frac{3}{2} - \frac{5}{2(-5)} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2 \Leftrightarrow 2 = 2 \quad (w)$$

$$(II) \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} = 4 \Rightarrow \frac{12}{2} + \frac{10}{-5} = 4$$

$$\Leftrightarrow 6 - 2 = 4 \Leftrightarrow 4 = 4 \quad (w)$$

دا پورته په ورپورته ځای کېږي. کښته هم

همدا دی.....

$$\begin{aligned} \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} &= 2 \\ | \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} &= 4 \\ \text{Additionsverfahren:} \\ \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} &= 2 \quad | \cdot 2 \\ | \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} &= 4 \quad | : (-2) \\ \hline \frac{6}{x} - \frac{5}{y} &= 4 \\ | \quad -\frac{6}{x} - \frac{5}{y} &= -2 \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \frac{6}{x} - \frac{5}{y} = 4 \\ -\frac{6}{x} - \frac{5}{y} = -2 \end{array}} \right\} + \\ \hline -\frac{10}{y} &= 2 \quad | \cdot y \\ -10 &= 2y \quad | : 2 \\ -5 &= y \\ \underline{\underline{y &= -5}} \end{aligned}$$

$$y = -5 \text{ eingesetzt in (I)} \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2$$

$$\frac{3}{x} - \frac{5}{2(-5)} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{x} + \frac{1}{2} = 2 \quad | -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{x} = \frac{3}{2} \quad | \cdot x$$

$$\Leftrightarrow 3 = \frac{3}{2}x \quad | \cdot \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{x = 2}}$$

$$\text{Lösung: } L = \{(2 | -5)\} \quad x, y \neq 0$$

Probe:

$$(I) \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2 \Rightarrow \frac{3}{2} - \frac{5}{2(-5)} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2 \Leftrightarrow 2 = 2 \quad (w)$$

$$(II) \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} = 4 \Rightarrow \frac{12}{2} + \frac{10}{-5} = 4$$

$$\Leftrightarrow 6 - 2 = 4 \Leftrightarrow 4 = 4 \quad (w)$$

129

$$\begin{aligned} \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} &= 2 \\ | \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} &= 4 \\ \text{Additionsverfahren:} \\ \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} &= 2 \quad | \cdot 2 \\ | \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} &= 4 \quad | \cdot (-2) \\ \hline \left. \begin{array}{l} \frac{6}{x} - \frac{5}{y} = 4 \\ -\frac{6}{x} - \frac{5}{y} = -2 \end{array} \right\} + \\ \hline -\frac{10}{y} &= 2 \quad | \cdot y \\ -10 &= 2y \quad | : 2 \\ -5 &= y \\ \underline{\underline{y = -5}} \end{aligned}$$

$$y = -5 \text{ eingesetzt in (I)} \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2$$

$$\frac{3}{x} - \frac{5}{2(-5)} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{x} + \frac{1}{2} = 2 \quad | -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{x} = \frac{3}{2} \quad | \cdot x$$

$$\Leftrightarrow 3 = \frac{3}{2}x \quad | \cdot \frac{2}{3}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{x = 2}}$$

$$\text{Lösung: } L = \{(2 | -5)\} \quad x, y \neq 0$$

Probe:

$$\text{(I)} \quad \frac{3}{x} - \frac{5}{2y} = 2 \Rightarrow \frac{3}{2} - \frac{5}{2(-5)} = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2 \Leftrightarrow 2 = 2 \quad (w)$$

$$\text{(II)} \quad \frac{12}{x} + \frac{10}{y} = 4 \Rightarrow \frac{12}{2} + \frac{10}{-5} = 4$$

$$\Leftrightarrow 6 - 2 = 4 \Leftrightarrow 4 = 4 \quad (w)$$

يادونه:

مساواتسيستم د كسرونو ترمونو څخه جوړ دی. دا چي مخرج د صفر كيدو اجازه نه لري يا نه شي صفر كيدی، تعريفست بايد وركړ شي. داسي مساواتسيستم كرنيز نه دی.

د رسموني لار

$$(I) \quad x - y = -2 \quad L_I = \{(-2|0); (-1|1); (0|2); (1|3); \dots\}$$

$$(II) \quad -2x - y = 1 \quad L_{II} = \{(-2|3); (-1|1); (0|-1); (1|-3); \dots\}$$

دواړه مساوات د y پسي حل کيږي.

$$(I) \quad x - y = -2 \quad | +y$$

$$(II) \quad -2x - y = 1 \quad | +y$$

$$(I) \quad x = -2 + y \quad | +2$$

$$(II) \quad -2x = 1 + y \quad | -1$$

$$(I) \quad x + 2 = y \Leftrightarrow y = x + 2$$

$$(II) \quad -2x - 1 = y \Leftrightarrow y = -2x - 1$$


د هر مساوات لپاره ارزښتجوړي د حل سټ په گوته کوي.

کا دا په يوه کواورديناټسيستم کې وکښل شي، نو دوه کرښې ترې لاس ته راځي. د کرښو په غوڅتکي يا نقطه تقاطع کې د دواړو مساواتو حلست پروت دی.

$$L = \{(-1|1)\}$$

په هر مساوات کې د x لپاره عددونه ايښوول کيږي.

x	-2	-1	0	1
y_I	0	1	2	3
y_{II}	3	1	-1	-3



د رسمونې لار د مساوات او کرښو ترمنځ هندسي (ځمکچيزي) اړيکي ليدور کوي. د حل لار په حيث زيات وخت مناسب نه دی، چې د گډغوڅتکي کواورديناټ په گرافیک کې ناټيک لوستل کيدی شي.

مساواتسيستم بي له يواځني حل څخه

رسميزه حل يا درسم له لارې حل د مساوات او کرښې په منځ کې هندسي اړيکي ليدور کوي.

- دوه کړنې کیدی شي چې نسبت یو بل ته مختلف پروتخایونه ولري.

- دا کیدی چې په یو ټکي کې سره غوڅي کړي، لکه پورته بیلگه چې لیدور کوي، د دواړو کړنیز مساوات لپاره ټک یو حل شتون لري.

- دا کیدی شي یو بل سره غبرګي وي، نو په دې حالت کې کوم ټکی نه شته، چې دواړه کړنې یې یو له بل سره ګډ ولري. له دې سره اړونده مساوات له دې امله حل نه لري.

- دا کیدی شي یو په بل پرتې وي، یعنې کټمټ وي، نو د یوې کړنې هر ټکی به د بلې کړنې ټکی هم وي. نو له دې امله به دا اړونده مساوات ناپای زیات حلونه ولري.

مساوات سیستم حل نه لري	
$\begin{array}{l} \text{(I)} \quad 10x + 4y = 4 \\ \text{(II)} \quad 5x + 2y = 1 \mid \cdot (-2) \\ \hline \left. \begin{array}{l} \text{(I)} \quad 10x + 4y = 4 \\ \text{(II)} \quad -10x - 4y = -2 \end{array} \right\} + \\ \hline 0 = 2 \end{array}$ نو دا ناتیګ وینا ده، له دې لاس ته راځي $L = \{\}$	دا د حل پیل مو یوه ناتیګ وینا ته بیایي. دا په دې معنا، چې مساواتسیستم ته حل شتون نه لري.. لیدور دا په دې معنا دی، چې دواړه کړنې یو بل ته غبرګي ځلي او کوم ګډ ټکی نه لري.

دا مساواتسیستم ناپای ډېر ځوابونه یا حلونه یا اویونی لري

د ورته بڼه بدلون وروسته د مساوات (I) او مساوات (II) جمعه کونې یو بل سره پورته کوي یا له منځه وړي، دا په دې معنا چې مساوات ورته یا ایدنتیک دي. هره د اعدادو جوړه، چې مساوات (I) پوره کوي، دا مساوات (II) هم پوره کوي. لیدور دا په دې معنا دی، چې کړنې یو په بل پرتې دي.	
$\begin{array}{l} \text{(I)} \quad 10x + 4y = 2 \\ \text{(II)} \quad 5x + 2y = 1 \mid \cdot (-2) \\ \hline \left. \begin{array}{l} \text{(I)} \quad 10x + 4y = 2 \\ \text{(II)} \quad -10x - 4y = -2 \end{array} \right\} + \\ \hline 0 = 0 \end{array}$ له دې لاس ته راځي رښتیا وینا	د ورته بڼه بدلون وروسته د مساوات (I) او مساوات (II) جمعه کونې یو بل سره پورته کوي یا له منځه وړي، دا په دې معنا چې مساوات ورته یا ایدنتیک دي. هره د اعدادو جوړه، چې مساوات (I) پوره کوي، دا مساوات (II) هم پوره کوي. لیدور دا په دې معنا دی، چې کړنې یو په بل پرتې دي.

پوښتنې

مساواتسيستم |

مساوات سيستم ته د دوه متحولو سره ګډوله پوښتنې، کرښيز مساواتسيستم، سيستم د کسري ترمونو سره او شي پوښتنې (د متن سره پ،ښتنې)

لومړۍ: د لاندې مساواتسيستم حلست وټاکئ

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & 4x + 5y = 32 \\ \text{(II)} & y = 5x - 11 \end{array} \quad \text{الف-} \quad \begin{array}{ll} \text{(I)} & 5y - 3x = 1 \\ \text{(II)} & x = y + 1 \end{array} \quad \text{ب -}$$

$$\begin{array}{ll} \text{(I)} & 3x = y + 15 \\ \text{(II)} & 2y - 10 = 2x \end{array} \quad \text{پ-} \quad \begin{array}{ll} \text{(I)} & 15y - 4x = -50 \\ \text{(II)} & x = y + 7 \end{array} \quad \text{ت -}$$

د ویم: د لاندې مساواتسيستم حلست وټاکئ

الف- ب - پ - ت -

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \begin{array}{ll} \text{(I)} & 2y = 2x - 40 \\ \text{(II)} & 3x = 10 - 2y \end{array} \\ \text{b)} & \begin{array}{ll} \text{(I)} & \frac{x}{2} - \frac{3y}{5} = 3 \\ \text{(II)} & \frac{x}{4} + y = 8 \end{array} \\ \text{c)} & \begin{array}{ll} \text{(I)} & \frac{2x}{15} + \frac{7y}{12} = 3 \\ \text{(II)} & \frac{7x}{25} - \frac{5y}{16} = \frac{3}{20} \end{array} \\ \text{d)} & \begin{array}{ll} \text{(I)} & \frac{x+5}{y-7} = \frac{4}{3} \\ \text{(II)} & \frac{x+2}{y-5} = \frac{5}{8} \end{array} \end{array}$$

دریم: د لاندې مساواتسيستم حلست وټاکئ

الف- ب - پ - ت -

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} & \text{(I)} \quad \frac{4}{3x+1} = \frac{2}{3y-13} \quad \text{b)} \quad \text{(I)} \quad \frac{7}{x} - \frac{12}{y} = \frac{5}{6} \\
 & \text{(II)} \quad \frac{2}{5x-10} = \frac{4}{7y-6} \quad \text{(II)} \quad \frac{4}{y} + \frac{5}{2} = \frac{9}{x} \\
 \text{c)} & \text{(I)} \quad \frac{4}{x} + \frac{8}{y} = \frac{5}{3} \quad \text{d)} \quad \text{(I)} \quad \frac{3}{2x-1} - \frac{8}{3y+2} = -\frac{1}{5} \\
 & \text{(II)} \quad \frac{2}{x} - \frac{4}{y} = -\frac{1}{6} \quad \text{(II)} \quad \frac{5}{2x-1} + \frac{4}{3y+2} = \frac{8}{15}
 \end{array}$$

څلورم: د لاندې مساواتسيستم حلست وټاکئ

$$\begin{array}{ll}
 \text{(I)} \quad \frac{7}{2x-5} - \frac{9}{7y+5} = \frac{10}{3} & \text{(II)} \quad \frac{24}{2x-5} + \frac{15}{7y+5} = \frac{19}{3}
 \end{array}$$

پنځم: یو پلار په دې لحظه کې څلورواړه دومره عمر لري لکه څوې یې او په ۵ کاله کې به فقط درې واړه دومره عمر ولري. دا دواړه همدا اوس څومره عمر لري؟

شپږم: په کوم وخت کې به یو (اوبه) ساتونې (بیلر؟) له دوه نلونو څخه نیمم ډک شي، چې لومړی نل د ټول ساتونې د ډکولو لپاره ۱۸ دقیقې اودویم د دې لپاره ۲۲ دقیقو ته اړتیا ولري یا په کار ولري؟

اوم: د یوه مستطیل یا ولاړکونجیز چاپیریال یا محیط ۱۸۰ سانتي متره دی. اړخ a څومره اوږد دی، که اړخ b ۳۰ سانتي متره وي؟


اتم: که د دوه ارزښتخايزه پرته جمعه یا پروت زیاتون عدد 9 دی. که ارزښتونه بدل شي، نو نوی عدد لاس ته راځي چې د زاړه عدد 7/4 ده. دواړه څا ارزښتونه څومره دي؟

۵ - په محور انعکاسونه (- منعکسونه یا هندارونه)

Reflection

یوه ځیره، چې یو څه په هنداره کې منعکس شوي کتل کيږي.....

پېژند(تعریف): که د یوه شکل هر ټکي P په یوه ټکي P' داسې منعکس شي یا راوگرځي، چې و ټکي P ته د محور a په نسبت سیومتريک (په همغه واټن یا فاصله) پروت وي، نو دا انعکاس په محور a منعکسونه (انعکاس کیدنه یا هندارونه) بلل کيږي.



په محور د انعکاس ځویونه

(۱) د ټکي P او د عکس د ټکي P' د وصل قطعه خط په محور a نیميږي او په محور a عمود (ولاره پرته) ده. په پورته شکل کې د وصل کرښې نېمېږنه او عمودیت هم روښانه په نڅېنه شوي دي.

(۲) خط په خط منعکس کيږي.


(۳) دایرې په دایرو منعکس کيږي، داسې چې شعاع یې سره مساوي وي.

۴) قطعه خطونه په مساوي قطعه خطونو منعکس کيږي

۵) زاويې په مساوي لويو زاويو منعکس کيږي.

۶) د يوه شکل په محور انعکاسونه کې عکس خپل شکل په بل لور بدلوي يا خپل شکل په خپل کوي. .

شکل، چې دا پورته د انعکاس خويونه ښايي




فعالیت ۱ :

په پورته شکل کې دې شاگردان وپوهيږي، چې کوم ټکی د کوم ټکي عکس دی او ترمنځ فاصلي دې سره مقایسه کړي.

زده کوونکي دې په شکل کې د انعکاس له امله نورو جوړو شوو مثلثونو ته پام وکړي او تر منځ اړیکې دې وښايي.

تعریف :

هغه ټکي، چې په محور a پراته دي بېرته په خپل ځان منعکس کيږي، چې په ځان منعکسونه (انعکاس شدن به خود Fixppoint انعکاس) بلل کيږي.

	فعالیت ۲ : (۱) د ا م خامخ انعکاس وگورئ. دا په محور m انعکاس دی او وښایئ، چې کوم ټکی په کوم ټکي منعکس شوی.
---	---

(۲) پورته په محور منعکس شکلونه نسبت یو بل ته څه بلل کيږي؟

(۳) زده کوونکي دې په څېره کې د انعکاس خویونه وښايي؟

(۴) داسې تشکیل شوي شکلونه یو بل سره منطبق دي، که څنگه؟

په دې هکله خپل فکري دلایل راوړئ.

تمرین :

(۱) په کمیت سیستم کې ټکي $A(-3,2)$ ټکی $B(-1,0)$ او ټکی $C(0,3)$ ورکړل شوي وي، نو له دې ټکو جوړ شکل انعکاس په همدې کمياتو سیستم کې په لاندې ډول رسم کړئ:


الف) په x محور منعکس کړئ

ب) په y محور منعکس کړئ.


(۲) په یوه - کمیت سیستم کې دې $M(-3,-2)$ د یوې دایرې منځنۍ (نقطه مرکزي) وي. له دې ټکي د یو نیم سانتی متره په اندازه وړانګه (شعاع) دایره رسم کړئ او بیا دا دایره په x محور او همداسې په y -محور منعکس کړئ.

که څه توضیح مو زړه غواړي ، ویې لیکۍ.


دلته که بله وټکل شي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



۳) په لاندې محوري انعکاس کې د ټکو او شکلونو انعکاس - چې څنگه یې صورت نیولی - تشریح کړۍ.




۳) زده کوونکي دی وښايي : که د دایري او منعکسه دایري مرکزونه د محور a د کوم ټکي سره وتړو چې په یوه خط نه وي پراته ، څنگه شکل منځ ته راځي؟



پېژند (تعريف) :

يو مسطح شکل متناظر (سيومتريک) بلل کېږي، که په يوه محور a داسې انعکاس منځ ته راشي، چې دا شکل په خپل ځان منعکس کړي.

فعاليت ۱ :



فعاليت:

- زده کوونکي دې يوه مربع وکارې او په هغې کې دې داسې خطونه رسم کړي، چې سيومتريک محورونه جوړوي.

عکس دې تشریح کړي، چې څنگه؟

متناظر شکلونه دوه ډوله دي

(۱) محوري متناظر :

تعریف :

یو مسطح شکل محوري متناظر بلل کیږي، که په یوه محور s داسې انعکاس صورت ونیسي، چې شکل بېرته په خپل ځان منعکس شي.

بیلگه ۱ :

الف: مستطیل چې ناصف الاضلاع ته د محورونو په ډول متناظر دي.

ب: یو متساوی الاضلاع مثلث ABC د ناصف الاضلاع s_1 او s_2 او s_3 په نسبت محوري متناظر دي.

(۲) مرکزي متناظر:

تعریف :

یو مسطح شکل مرکزي متناظر بلل کیږي، که یو ټکي S داسې موجود وي، چې هر شکل نسبت و دې ټکي ته بېرته په خپل ځان منعکس شي.

۵ . ۲ - مرکزي متناظر شکلونه

بیلگه ۲ :

الف : ټوټه کرښه د منځني (نقطه مرکزي) سره

ب : متوازي الاضلاع د قطرونو د تقاطع ټکي په نسبت مرکزي متناظر دي .



زده کوونکي دېدا پورته تناظر تشریح کړي

بنوونکي دې دا څېره زده کونکو ته د کرښې (خطکش) له لارې روښانه کړي.
فعالیت:

	په مخامخ شکلونو کې فکر وکړئ، چې مرکزي متناظر دي او که نه؟ ولې؟ دلایل یې راوړئ.
---	---

تمرینونه:


- (۱) په یوه متساوي الساقين مثلث کې څو متناظر محورونه شته ؟
- (۲) دا رسم کړئ او وښایئ، چې ولې متناظر محورونه یا وڅور دی؟
- (۳) یو متطیل رسم کړئ او په هغه شکل کې متناظر محورونه رسم کړئ.
- (۴) فکر وکړئ، چې د مربع کوم محورونه په مستطیل کې محورونه نه دي؟
- (۵) په لاندې څېره کې و گورئ، محوري متناظر دي او که نه ؟ دلایل یې راوړئ



- (۶) په پوه دایره کې څو محوري متناظر محورونه موجود دي؟
- (۷) ایا دایره مرکزي متناظر ده؟ که هو نو ولې؟

۵. ۳ - دېرواره هندارونه يا منعکسونه يا بيرته راگرځيدنه

الف - انتقال (Translation)




د پورته شکل په ډول که یو بل خپل شکل وي، خو ښه به وي .

پېژند (تعريف):

که د یوه شکل هر ټکي سملاسي په همغه لور کش کړای شي يا و کښول شي، نو یو مساوي شکل منځ ته راځي. دا انعکاس کونه راکشونه (راکښنه يا ترانسلاشن) بلل کیږي.

په لاندې شکل کې انتقال ورکړ شوی دی.




په پورته شکل کې په محورونو a_1 او a_2 شکونه له کین لور و ښي لورته منعکس شوي.

د وړني يا انتقال خويونه:

دوه واړه هندارونه په غبرگ محور د d فاصلې سره همغه فاصله (قيمت) لري، لکه د یوې $2d$ په محور عمود راکشونه. دا خوي په پورته شکل کې روښانه معلومېږي.

انتقال (غبرگ انتقال کښول يا وړل) یواځنی انتقال دی. دا په دې مانا، چې په غیر له دې بل داسې انتقال نه شته.




فعالیت :

د (x, y) - کمیت سیستم کی دې زده کوونکي یو مثلث ABC رسم کړي او دا دې دوه واره د d په اوږدوالي انتقال کړي. (دا کېدای شي، چې د زده کوونکو په مینه یو گل او یا یوه بله ښه څېره هم وي).
په انتقال کې زموږ لپاره غوره د انتقال فاصله ده، چې یو څه څومره انتقال کيږي.

۵. ۴ - د وړني یا انتقال د جوړولو څیرنه


- ۱ - په هر نڅښه شوي ټکي (په مثلثونو کې رأس الزاويي او په دایرو کې مرکزونه په یو ټاکلي اندازه (د ټاکلي انتقال په اندازه) انتقال کړی (دا باید مساوي اوږده وي په هماغه طرف او غبرگ).
- ۲ - د ټاکلو خطونو اړخنی نقطې د اصل په پرلپسې ترتیب سره وښلوی. (د دایرې په انتقالولو کې : په اخر ټکي د r وړانګې په اندازه دایره ووهی)
انتقال ځای په ځای ټکي نه لري (که د صفر اندازې په نامه $identität$ ایدنتیتی یا کټمټ منعکسوني څخه صرف نظر شو)




څیره ۱۵۶

په یوه ځانګړي ډول یو په بل پسې په ډېرو محورونو انعکاس دې په دې ځای کې یاد شوی وي.

۵. ۵ - څرخون یا دوران (Rotation)

	پيژند : که دیوه شکل هر ټکي P په یوې دایرې په ځای په ځای ټکي M په کونج $\overline{MP}$ په وړانګه وڅرخي یا دوران وڅوري ، نو یو شکل منځ ته راځي. دا انعکاس په څرخونټکي M څرخون بلل کیږي.
---	--

په لاندې څیره کې یو درېګودی په دوه زاویو او له دې امله په دوه محورونو څرخي.

	د دوران خپونه په محورونو دوه واره هندارونه، چې په $\heartsuit$ کونج په ټکي M کې یو بل قطع کړي، په ټکي M باندې دیوه دوران سره مساوي دي، که د دوران زاویه $\heartsuit$ وي.
--	--

پوښتنه


- که په پورته شکل کې که د دوران شعاع دوه متره وي، نو د B او B'' ترمنځ قوس به څومره لوی وي؟

- حدس وکړی، چې د C او C'' تر منځ شعاع او همداسې د قوس لویوالی به د وران کې د B او B'' د قوس سره تفاوت ولری؟ او ولې؟

۵. ۶ - (په) ټکي انعکاس

پیژند:

په ټکي Z یو دوران د دوران د زاويې 180° سره یو مرکزي انعکاس دی. Z د مرکزي انعکاس وسطي نقطه (منځټکی) بلل کیږي. .



په ټکي د منعکسونې یا په څټکونې خوي

یوه انعکاس کوونکې نقطه او د عکس نقطه یو قطعه خط ټاکي، چې په منځټکي نیمیږي.

فعالیت :

په پورته شکل کې په نقطه د انعکاس خواص په ورکړ شوو تورو سره وښایی


که د یوه موټر تیر – چې شکل یې دایروي دی- قطر 120 cm وي ، نو ووايي، چې 30 km لار وهلو که به دا تیر څو واړه دوران وکړي يا وڅرخي؟

تعريف:

يو دوران د دوران د زاويې $\mu = \pm 180^\circ$ سره په ټکي انعکاس بلل کيږي.

دا انعکاس خپله لور ساتي يا همغه لوريزه انعکاس دی.

لاندې څېره دې وکتل شي



په ټکي د انعکاس د جوړولو تحليل يا څېره

۱ – د اصلي شکل د هر په نځېنه ټکي څخه یوه کرېنه وکارئ، چې له منعکس کوونکي ټکي Z تیر شي او د |PZ| په فاصله د Z په بله لور وباسي.

۲ – داسې منځ ته راغلي ټکي په ترتيب يو د بل سره وتړئ (وصل کړئ) (همداسې په M' يوه د $r' = r$ شعاع ووهئ)

دوران :


تعريف :

دوران يا څرخون D هغه انعکاس دی، چې په ورکړل شوي ټکي Z (دوران منځ) هر اصلي ټکي P په یوه منعکس شوي ټکي P' داسې تنظيم کړي، چې |PZ| او


د $\mu = W(PZP')$ چي μ د مخه په ځای ورکړ شوی زاویه داس په نامه دوران زاویه ده.

یو دوران د دوران د ټکي او د دورا له زاويې څخه یواځنی ټاکلی دی. دوران نور په علامه له مخه ورکړ شوي (ددي لپاره دي تېرو لوستونو ته پاموي).

د دوران د جوړښت تحلیل:



۱ - په ټولو په نڅېښه ټکو (د مضلعو د زاويو د رأس ټکي، په دایره د مرکز ټکي) او د دوران په مرکز Z یوه وړانګه کېږدی. د هر ټکي P فاصله PZ په کومکي شعاع وکارې، کومه چې له PZ سره زاویه μ جوړوي




۲ - لاس ته راغلی ټکی د اصل سره په یو په بل پسې په ترتیب ونښلوی (په همدې ترتیب په یوه دایره شعاع ووهی). دوران په همغه لور کونګرواینڅ څېره کونه ده.

خوی انعکاس یا خوی رگرخیدنه یا بیرته راگرخینه the glide
 die Gleitspiegelung
انعکاس انزلاقی

یادونه: خوی د زیر مخامخ یا برعکس دی.

پېژند: خوی هندارونه د محور هندارونې یوه یو پرېل پسې هندارونه او محور ته
 غبرګه راکښنه ده او یا په خټ..

لاندې خپره دي وکتل شي.



د خوی هندارونې خوي:

یوه خوی هندارونه کېدی شي، چې په دوه غبرګو محورونو او یوه په دې ولاړ محور
 باندې د دریواړه هندارونې له لارې منځ ته راشي یا جوړه شي.

نتیجه:


مور دلتا انعکاس، سیومتری، دوران لنډ انعکاسو سیومتری او دوران وځېړل . ومو لیدل، چې په دې ټولو کې شکلونه یو په بل پرېوزي، یواځې او یواځې په ځنو عملیو کې د شکل لور بدله وي.

دا هر څه مو چې ولوستل د انطباق خواص دي.

۵. ۷ - طلايي غوڅی

طلايي نسبت یا ناپرېکيدونکي وېشنه یا ټوټه ونه یو ځانگړی د وېشنې نسبت دی، چې د تاریخي دلایلو پر بنسټ اوږده ټوټه د **Major (M) Majority** یانې ستره ټوټه سره بڼایو یا په نڅېنه کوو او کوچنۍ برخه یا ټوټه د **minor (m) Minority** یانې کوچنۍ سره په نڅېنه کوو.

ددې نڅېنوني سره د طلايي نسبت شرایط په لاندې توگه ورکړل شوي دي.



$$m : M = M : (M+m)$$

لنډه ټوټه ځان و لوي ټوټې ته داسې نيسي يا لنډه ټوټه نسبت و لوی ټوټې ته داسې ده، لکه لویه ټوټه د لوي ټوټې او کوچنۍ ټوټې جمعې ته .

$$\frac{m}{M} = \frac{M}{m+M} \Leftrightarrow \frac{M}{m} = \frac{M+m}{M}$$

د طيلايي نسبتونو د مساواتو د کينډي لور حل

$$\left(\frac{m}{M}\right)^2 + \frac{m}{M} = 1 \mid \sigma = \frac{m}{M} \Rightarrow$$

مربع مساوات $\sigma^2 + \sigma - 1 = 0$

$$\sigma = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{ فقط مثبت حل}$$

$$\sigma \approx 0,6180339887498484820$$

د طلايي نسبتونو د بني اړخ اوبيونه:

$$\frac{M}{m} = \frac{M+m}{M}$$

$$\frac{M}{m} = \frac{M}{m} + \frac{m}{M} \mid \tau = \frac{M}{m} \Leftrightarrow \frac{m}{M} = \frac{1}{\tau} \Rightarrow$$


$$\tau = 1 + \frac{1}{\tau}$$

$$\tau^2 = \tau + 1$$


مربع مساوات $\tau^2 - \tau - 1 = 0$

$$\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad \text{فقط مثبت حل}$$

$$\tau \approx 1,61803398874989484820$$



توتیه کرینه a دې ورکړ شوی وي



د $[AB]$ څخه د ورکړ شوي توتیه کرینې a اوږدوالي حل د x په مرسته، چې په

$[AT]$ کې پروت دی.

$$\frac{x}{a} = \frac{a-x}{a}$$

$$x^2 = a^2 - ax$$




$$x^2 + ax - a^2 = 0$$

د حل سټ فرمول د مثبت حل سره (د قطعه خط اوږدوالی)

$$\Rightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} a$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{x}{a} = \frac{a-x}{a} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0,618$$

دې پسي به نور غوره او په زړه پورې عزونه راشي



Beispiele:

1.



خیره ۱۴۹

پیشنند: هندسي شكلونه كونگروينخ (برابر) بلل كييري، كه په فورم ، بڼه (خيره) او



ټولګه

هره کونګرواینڅ څیرونه د کرنې اینونې د تړلو څخه لاس ته راځي. دلته بیا هر کرنې اینونه څرخون لور بدلوي. له دې امله لرو:

د کرنې اینونو (څرخونو یا کښونو) جوړه تعداد یا ګڼون یو همغه لوریز کونګرواینڅ څیرونه ده. د نا جوړه تعداد یا ګڼون کرنې اینونو (کرنې اینونې یا کښونو اینونې) یو نا همغه لوریز کونګرواینڅ څیرونه ده.

دیو په بل پسې د کونګرواینڅ څیرونو کارونه بیرته کونګرواینڅ څیرونه لاس ته راګوي. دا چې هرکونګرواینڅ کرنې اینونه ده نو د پای کونګرواینڅ یو په بل پسې اینونه ده. برسیره پر دې هر کونګرواینڅ بیرته راګرځیدلی یا په خټ کیدلی شي. که له دوه وو زیات کونګرواینڅ څیرونې یو په بل پسې منځ ته راشي ، نو په خوښه اسوځیاتيو را یوځاي کیدی شي. الجبري ټول کونګرواینڅ څیرونې یو ګروپ جوړوي د ناپیلي کټمټ څیرونې سره، دا په دې مانا چې ناپیلي څیرونه ، چې په کارونه کې تغیر نه راوړلی کټمټ څیرونه ده. (د ګروپ لپاره دې نښلونې برخه وکتل شي)



په عمل کې د دریګونو یی کونګرواینڅ جملې له پوره اهمیت ډکې دي

کونګرواینڅجملې:

الف) په خپلو دري اړخونو کې (SSS) یا
 ب) په دوه اړخونو او لهدې اړخونو رابند کونج کې (SWS) یا
 پ) په دوه اړخونو کې او د اوږداړخ مخامخ کونج کې (SSW) یا
 ت) په یوه اړخ او دواړو راګیر کونجونو کې (WSW) یو بل سره وځوري یا
 سره مساوي شي

تمرینونه

- ۱ - په یوه غبرگ اړخیز ABCD هندارونی $S_{BC}^{\circ} S_{AB}$ وکارۍ.
- ۲ - د کونگرواینڅ جملو په مرسته وښایي، چی غوڅکرنی پیلخیرې په کونگرواینڅ برخو ټوټه کوي.



خیرې ۱۶۲

- ۳ - په یوه بیلگه وښایي :
- $$S_g^{\circ} S_h = S_h^{\circ} S_g \quad (\text{الف})$$
- $$S_g^{\circ} (S_h^{\circ} V_g) = (S_g^{\circ} S_h)^{\circ} V_g \quad (\text{ب})$$
- ۴ - د «هیلگولند» کیشتی او د «کون ماری» لوي کینستی ترمنځ واټن ۵ کیلو متره دی . هیلگولند کیشتی په شمال لودیځ ۶۰ درجي (N60°W) دلته N د شمال او W د لودیځ لپاره دی، کرنلایني حرکت کوي او «کون ماري» په ۸۲ درجو جنوب لودیځ لور حرکت کوي (S82°W) دلته S د جنوب لپاره دی.

په دې وخت کې د «هیلګولند» څخه «کوبن ماری» په ۷۰ درجو شمالشرق (N70°O)

دلته O د ختیز لپاره ده، لیدل کېږي. Nord,, Süd, West, Ost

الف) په کوم کونج دواړه لارې یو بل غوڅوي؟

ب) د دې وخت له ځای څخه به هغه غوڅتګی څومره لرې وي؟

۵- وي دې ABC یو مساوي پنبیز دریګوډی، له بنسټ AB سره، g او h د

کونجونو α او β کونجني دي. وښایي چې دریګوډي ABP او ABQ

کونګرواینټ دي. (P او Q د مخامخ اړخ سره د کرښو غوڅتګي دي).

۶- څومره کوروننتخپرونی موجود دی چې لاندې څیرې یې په خپل ځان څیره کوي:

کرښی، گردی، غبرګ اړخي، مساوي پنبیز دریګوډي، ولاړ ګوډی، راوتی،

مربع، مساوي اړخیز دریګوډي؟ کټمټخپرونه دې نه په کی شمیرل کېږي.

۷- یو څرخیدونکی هنداره، یوه هنداره ده، چې په یوه خپله ایښوول شوي هواره

پروت محور باندې څرخوړ ایښوول شوي. ترتیب په څیره کې له پورته لور

انځورېږي.

د نور له چینی L څخه یوه وړانګه په هنداره د (a) په ځای یا ځاینیوون کې

پریوزي او د هندارونې یا انعکاس قانون سره سم (پریووتکونج = وتلکونج)




د $\overline{OA}$ لور باندې بیرته غورځول- یا اینه کېږي یا منعکس کېږي. اوس

نو هنداره د α په کونج د (b) ځای یا ځاینیوون ته راوړل کېږي یا

راڅرخېږي. دلته نو د نور وړانګه د $\overline{OB}$ په لور هچیندازه کېږي یا غورځول


کېږي یا منعکس کېږي. وښایي:

$$w(\overline{OA}; \overline{OB}) = 2\alpha$$



۸ - د کوتی منځ کی دوه توپونه ایښول شوي یو سپین او بل تور. د کوتی له دیوالونو څخه توپ بلی لور ته نه شي تللی سپین توپ دې داسی ووهل شي چي تور توپ ووهي. دا د اینه ونی یا انعکاس د قانون سره سم په دیوال AB لگيږي. (څیره) د کرښو لار وکارۍ « تور توپ - اینه ټکی یا انعکاستکی - سپین توپ »

۹ - دا د یوه کور څلور برجونه دي، چي په A, B, C, D سره یی ښایو (څیره) داسی یو ځای S شته ، له کوم چي برج A د برج C څخه یا سره پټ شي او برسیره پر دې له دې ځای څخه A د B او D د منځني په څیر ښکاره شي یا ځان وښايي ؟





د یوه کور پروت غوڅی یا تقاطع د [Giovanni Denti](#) له مخې

مشهور ساختماني اینجینیر لو کوریوسیر (1887 – 1965) *Le Corbusier* په دېرو
دولونو د خپلو جوړښتونو په جوړښت کې کارولی


دا لاندې شکل هم د یوه طلايي غوڅي دست لباره یوه ښه
بیلگه ده، چې پیدایښتي یا په طبیعت کې یې لرو
ستاسو سرگرمۍ له پاره

159




159

Die Glockenblume



په منظم پنځه گوډي يا مخمس کي طلايي نسبت

Im regelmäßigen Fünfeck ist der goldene Schnitt enthalten.



دا لاندې د درېگوډيکچېرخه په نهم، لسم، او یولسم
ټولگي لوستل کیږي. زه دا ټول په هره برخه راوړم،
چې گران لوستونکي ورڅخه اړوندگټه واخستل شي

۶ - درېگوډي کچ يا تربگونومتري.

دریگوډیکچ یا تريگونومتري Trigonometrie

تعريفونه

د دریگوډیکچ یا تريگونومتري دنده ده چی په هواره یا په هوا کی دریگوډي کچ کړي ، د ځانگړو بلواکو له لارې، دې په نامه تريگونومتري بلواکو. برسیره پر دې د دې په مرسته پریودی کی یعنی په منظمه فاصله پرلپسی تکراریدونکی پینښي (موزی تل راگرځیدوني بللی شو) خپل کيږي.

تريگونومتري تر هیپارچ (Hipparch ۱۶۰ - ۱۲۵ له م پخوا) پوري تعقیبیدی شي، وروسته له مصري پتولیمویس Patolemäus چې په ۱۶۸ م کال کی مړ شوی او بیا له هندي او عربو شمیرپوهانو له خوا پرمختگ ورکړ شو. له پیل دا د کارونی یا عملي کیدو د ستونځو سره مخامخ وه. دریگوډیکچ خپل کارونه په استرنومي او فزیک، د ځمککچ یا اندازه کولو، د ځمک اندازونی، نقشو علم، او ابادی او نوتیک Nautik (د کیشتیو د لارو نقشه ویستلو پوهنه) کی مومي.


د تريگونومتري مانا یا مهموالی په ځانگړي ډول په دې ریښتینوالی یا واقعیت کی نغښتی، چی د دې په مرسته د پایکرښلواکوالی ، د کونجبلواکوالی سره تړلی شي (پام دې وي، چی دا تړاو شمیرپوهینیز مفهوم لري).

پیلبللگه: د په مانایا مهم جگوالي یا لویدکړښو نڅښه لوحی یا په بله عبارت د زوړي او پیچومی لیکتختی (دې ته دې پام وي چی ما دا کلیمی هر چیرې د زوړي او پیچومی په نامه نه دې بللی، خو دا به ښه وي ، چی په هغه مناسب ځای

کى ، که ما بیرته اصلاح نه کړې، نو په دې نومونو دې ونومول شي (وهل شوي

د دې له لارې کوم معلومات ورکول کیدی شي؟


پیچومی یا جگوال 12 % په دې مانا چې په راتلونکو سلو مترو کې یو جگوالی د ۱۲ مترو وهل کیږي، دا ۱۲ متره ټیک ۱۲ له سلو دي. په نورو سلو مترو کې نور ۱۲ متره پیچومی یا جگوالی تې کیږي، نو په عمومي ډول یا ټولیزه توګه له ۲۰۰ متره پراته اوږدوالي وروسته ۲۴ متره پیچومی یا جگوالی. له یو کیلومتر وروسته دا پیچومی یا جگوالی لیدیدونکي ۱۲۰ متره ته جګیږي. کتل کیږي یا لیدل کیږي، چې په ورکړشوي پیچومي یا جگوالي کې د پیچومي توپیر متناسب یا په ځاننښونه و هواری فاصلي ته تغیر خوري . د پایکړښو تناسب یا ځاننښونه ثابت یا ځای په ځای پاتیري او د په سلو کې ګڼ په لوحه ورکوي. د واقعي جگوالي اوږدوالي معلومات نه



خیره ۱۹۴

ورکوي همداسي زوړی یا لويدون. په داسي حالت کې هم بيا نورې لوجي هم زوړندې وي.

په همدې ډول پېچومي کيدی شي، لکه په سلو جمله کې، د کونج له لارې هم ورکړشي، چې د سرک ټوټه يی د پرتون سره جوړوي. تريگونوميټري يا د په سلوکي (د پېچومي يا جگوالي تناسب) د پېچومي يا جگوالي ويناوي دي او يا په څرگندو پېچومي کونج يا جگکونج چې سلبيز پېچومي يا جگوالي ټاکي. په دې ډول په سلو کې ۱۲ جگوالي سره د پېچومي کونج په لاندې ډول دی $\alpha = 6,48^\circ$.




څيره ۱۹۵

په پيلېلگه کې څرگندېږي چې دا پاېکړنې د يوه ولاړه دريگودي اړخونه انځوروي، چې د دوه دريگوديو تناسب يا ځاننيونه د کونج په بلواکي يا اړتوب ټايی. زيات وخت هيوپوتينوزي (اوږداړخ) په c ښوول کيږي او هغه ته مخامخ کونج په γ . نورې دواړه کتيتي a او b دي او د دوي مخامخ کونجونه α او β .

اوس نو لاندې جملې پاور لري:

سايټېلواک sinusfunktion: بليگه:




$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

څيره ۱۹۶

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{\text{مخامخ کاتيت}}{\text{هيوپوتينوزي}}$$

کوساینلوک Cosinusfunktion بیلگه:



$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{\text{پرتہ کتیت}}{\text{هیپوتینوزی}}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{1.73}{2} = 0.8660$$

۱۹۷

تینجنتیلواک Tangensfunktion بیلگه:



$$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{\text{مخامخ کاتیت}}{\text{پروت کاتیت}}$$

خیره ۱۹۸

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{1.73} = 0.577$$

یادونه : پام دې وي چی د مخامخ کاتیت لاندې د دریگودی هغه اړخ پوهیږو، چی په هیپوتینوزی پراته کونج ته، چی خمور موخه وي، مخامخ پروت وي او هغه اړخ چی په همدې کونج پروت وي ، هغه ته په کونج پروت اړخ چی مور یی لنډ پروت کاتیت بولو.

دا لاندې نور کونجیلواک دي، چی کم کارول کیږي

کوتنجنتیلواک Kotangensfunktion بیلگه




$$\cot \alpha = \frac{b}{a} = \frac{\text{پرتہ کاتیت}}{\text{مخامخ کاتیت}}$$

خیره ۱۹۹

$$\cot 30^\circ = \frac{1.73}{1} = 1.73$$

ډیر کم ، د بیلګې په توګه استرونومي کی، لاندې کونجبلواک کارول کیږي



سیکانسبلواک sekansfunktion بیلګه

هیپوتینوزې پرتہ کاتیت

$$\sec \alpha = \frac{c}{b}$$

خیره ۲۰۰


$$\sec 30^\circ = \frac{2}{1.73} = 1.156$$

یوه تګ پایکرېښي $c = 15 \text{ km}$ او کونج $B = 58^\circ$ وروسته.

په دوم ډز کی کیښتی له ډز رڼا اور څخه څومره لرې ده؟

د A څخه و B ته د کیښتی نزدې واټن e د ډز رڼا اور څخه څومره لري دی؟

په A کی له اور څخه څومره لرې وه؟



خیره ۲۰۲

اوبی یا حل:

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta = 79^\circ; \quad \sin \beta = h_b / c \text{ او } \sin \gamma = h_b / b$$

د h_b په لور اوبصول یا حلول او په همدې وخت کی لاس ته راځي:

$$\begin{aligned}
 h_b &= c \cdot \sin \beta \quad \text{und} \quad h_b = b \cdot \sin \gamma \\
 \Rightarrow c \cdot \sin \beta &= b \cdot \sin \gamma \Leftrightarrow \frac{c}{b} = \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} \\
 \Rightarrow b &= \frac{c \cdot \sin \beta}{\sin \gamma} = \frac{15 \cdot \sin 58^\circ}{\sin 79^\circ} = 12,959 \text{ km}
 \end{aligned}$$

د لنډ واټن e لپاره باور لري:

$$\sin \alpha = \frac{e}{b} \Rightarrow e = b \cdot \sin \alpha = 12,959 \cdot \sin 43^\circ = 8,838 \text{ km}$$

$$\sin \beta = \frac{e}{a} \Rightarrow a = \frac{e}{\sin \beta} = \frac{8,838}{\sin 58^\circ} = 10,421 \text{ km}$$

لکه چې په یاد راوړل شو، د همغه دریګوډي اړخونو a او b په شمیرنه کی


د ساین جمله :

په خوبه دریګوډي کی د اړخونو ځاننیزه یا تناسب د اړخونو مخامخ کونجونو د ساین ځاننیزه یا تناسب دی.

$$\begin{aligned}
 \sin \alpha / \sin \beta &= a / b & \sin \beta / \sin \gamma &= b / c \\
 \sin \gamma / \sin \alpha &= c / a
 \end{aligned}$$

د ساین جمله په پخ دریګوډي کی هم باور لري (تمرین دې وکتل شي). ددې سره په یوه دریګوډي کی نه موجودې ټوټې هلته شمیرل کیږي، چیرته چې دوه اړخونه او یو مخامخ کونج یا دوه کونجونه او یو مخامخ اړخ ورکړ شوی وي. سړی بیا څه کوي که دریواړه اړخونه ورکړ شوي وي او یا دوه اړخونه او د هغوتر منځ راگیر کونج؟

پیلبلگه : په یوه د ډبروسکرو کان کی دوه ستنی $b = 350 \text{ m}$
 او $c = 480 \text{ m}$ دي او یو کونج $\angle C = 65^\circ$ څښودوي.
 د B څخه و C ته به د نښلولو ستن یا تیر څومره لوي وي ؟



څیره ۲۰۳

اوبی یا حل :
 جگوالی یا جگۍ h_c کرښه $AB = c$ په دوه ټوټو x او $c-x$ ویشي.
 دلته دی $x = b \cdot \cos \angle C$ ،
 ځکه چی $\cos \angle C = x / b$ دی . د پیتاگوراس د جلی له مخی
 لرو : $h_c^2 = b^2 - x^2$

او

$$\begin{aligned} a^2 &= h_c^2 + (c-x)^2 . \\ a^2 &= h_c^2 + c^2 + x^2 - 2cx \\ a^2 &= b^2 - x^2 + c^2 + x^2 - 2cb \cos \angle C \\ \Rightarrow a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \angle C \end{aligned}$$

د اړخونو اوږدوالی نوموړی او کونج کیدی شي چي منظم بیرته راگرځیدونکی
(خیکلکي یوناني کلیمه ده گردی ډوله یا منظم بیرته راگرځیدونکی zyklisch)
یو بل سره بدل شي» له دې امله باور لري

کوساین جمله

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma$$

په هر یوه دریګوډي کې د هر اړخ مربع مساوي ده، د نورو دواړو اړخونو د مربع زیاتون سره ترې کم دوه ځله د دې دوه اړخونو ځل او ددې دوه اړخونو رابند شوي کونج کوساین سره ځل.

د کوساین جمله د پیوتاګوراس د جملې عمومیت یا ټولیز ته هم وایي. (تمرین ۶

مخ دې وکتل شي)

د کونجبلواک له لارې یو بل متود، د ډیرګوډي شمیرلو لپاره، ترڅو دا په دریګوډیو ویشل کیدی شي چی پوره اړخونه او کونجونه یی څرګند وي، پیدا شو. د دې ټولو سره د څلورګوډي یو وربرسیره بل د شمیر فرمول پیدا شو:

$$A = 0,5 \cdot d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = w(d_1; d_2) \quad \text{چیرته چي}$$

$$A = 0,5(d_2 h_1 + d_1 h_2) \quad \text{اوبی یا حل :}$$


که d_1 په e او f ټوټه یا تجزیه شي، نو لرو

$$h_1 = e \cdot \sin \alpha$$

$$h_2 = f \cdot \sin \alpha$$

$$\Rightarrow A = 0,5 \cdot d_2 \cdot (e + f) \sin \alpha$$

$$\Rightarrow A = 0,5 \cdot d_2 \cdot d_1 \sin \alpha$$



څيره ۲۰۴

د په خوښه کونجونو تريگونوميټريکي بلواکي

په اخره برخه کې مو وويل، چې کونجبلواک، نه يواځې د دننه لورته تېرو درېگونديو لپاره، بلکه د هغو کونجونو لپاره چې له 90° درجو لوي وي، هم هدفمند (موخور) تشرېحوي دي. له دې وروسته کونجبلواکو خپله پوره موخه يا هدف تر لاس کېږي.


دا پراختيا څنگه تصور يا د خيالوړ کيدی شي ؟

په ښه توگه داسې کيدی شي چې په يوه ولاړ پروت سيستم يا کواورديناټسيستم کې يوه گردې ووهي چې وړانگه يې ۱ يعنې يو يوون يا واحد دی (دې ته يوونگردي ويل کيږي، ځکه چې وړانگه يې يو يوون دی) او د گردې منځتکي او د پروت ولاړ سيستم کواوردېنات سرچينه يو په بل پړيوخي. نو بيا هر درېگوندي، چې د هغې يو کونج د گردې ځنټريکونج دی، يعنې کونج يې د گردې په منځ يا ځنټر پروت دی، (څيره ۱۴۲) کم له کمه يې يو اړخ ۱ يعنې يو يوون اوږدوالی لري. دا د درېگوندي په دننه کې شميرنه او اړيکي اسانه کوي.

لمړی د یوه ولاړ کونجیز دریځوډي څخه پیل کوو، چی په لمړي لمړي څلورمه یا کوادرنانت (Quadrant) کی پروت دی. نو هیپوتینوزې ۱ اوږدوالی لري، او په گردی، د کونجېگي $P(x_0|y_0)$ په پام کی نیولو سره، باور لري:

$$\sin \alpha = y_0 / 1 = y_0, \quad \cos \alpha = x_0 / 1 = x_0$$

دا کرښی د پریوستون او یا د سیورېدرځونو په څیر لاس ته راځي، که موږ وړانګه د یوه ټالوونکی مړوند په څیر ونیسو یعنی فرض کړو، کوم چی د محور غبرګي رڼا لاندې راشی.



په دې ولاړ کونجیز دریځوډي کی کیدی شي چی د پیتاګوراس جمله وکارول شي:

تریګونومتريکي پیتاګوراس:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

څیره ۲۰۵


چیرته چی $\sin^2 \alpha = \sin \alpha \cdot \sin \alpha$ په مانا دی.

کیدي شي، چی پوښتنه وشي چی همدا « سیوری » بیا کله لاس ته راتلی شي. دا حالت بیاتیک هلته لاس ته راځي، چی وړانګه د منفي x -محور سره یو کونج α جوړ کړي، یعنی څنتریکونج یی $180^\circ - \alpha$ وي.

د « سیوروڅیرو » څخه لاس ته راځي:

$$\sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos (180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$



خیره ۲۰۶

څکه چی دا سیوری همغومره اوږد
دی لکه د مخه، مگر اوس له صفر
پیل مخامخ (منفی) لور ښایی.

په ورته توگه لاس ته راځی :

$$\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha;$$


$$\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin(360^\circ - \alpha) = \sin(-\alpha) = -\sin \alpha;$$


$$\cos(360^\circ - \alpha) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

د کونج $360^\circ + \alpha$ لپاره بیرته د سرچیني کونج اړیکي لاس ته راځي: همدا ډول
د $720^\circ + \alpha$ لپاره اوهمداسی نور. په دې توگه د په خوښه کونجفنکشنونو یا
کونجبلواکو لپاره د ساین او کوساین بلواک تعریف دي.
د $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$ له امله (مقایسه مخ | ۱۵) دا د تنجنت بلواک لپاره
هم صدق کوي. له دې امله لاندې د بلواکگرافونه لاس ته راځی


خیره ۲۰۷



د ساین کچه




Die Tangenskurve: $y = \tan x; x \in \mathbb{R} \setminus \{x | x = (2z+1)\frac{\pi}{2} \wedge z \in \mathbb{Z}\}; y \in \mathbb{R}$



Die Kosinuskurve: $y = \cos x; x \in \mathbb{R}; y \in [-1; 1]$


دکوساین کبی



Die Kotangenskurve: $y = \cot x$; $x \in \mathbb{R} \setminus \{x | x = z \cdot \pi \wedge z \in \mathbb{Z}\}$; $y \in \mathbb{R}$
 د کونجنت کوربه

لینده اندازه (لینده کچ) Das Bogenmaß

په زړه درجه د کونجکچ یا - اندازه سره بلد یو (دمخه ولیدل، چی ۳۶۰ درجی پوره گردی-نهایی. هغه، چی لږ ورسره بلد یو یا زیات ورسره بلد نه یو، هغه نوې درجه ده، چی گردی په ۴۰۰ مساوي برخو ویشل کیږي. دا په دواړو کچیوونونو یا کچواحدونو کی گډ دي، چی په گڼونو اندازه کیږي، بی له کچ یوون، ارزښت پیری رییلگڼونه دي، په داسی حال کی چی وتل گڼونه (= د تعریف پیری گڼونه) یو یوون یا واحد (درجه یا گون) لري. دا په کارونه یا عمل کی موږ زیات وښت د خنډ سره مخامخ کوي. له دې امله د لیندې کچ سره د کونجکچ لپاره یو ور زیات امکان پیدا شو.



څيره ۲۱۱

کونج لويي په واقعيت کې
يوون «راد (rad)» لري،
مگر دا په کارونه يا عمل
کې کيدی ونه ليکل شي
يا صرف نظر پرې وشي،
که بدلون ته مو نه
راهڅوي. دا کونجکچونه
چی د کونج لپاره په
تريگونوميتریکي بلواکو
کې اينسودل کيږی (د
بيلگي په توگه $\sin$)

ارگومنټ (Argument تعريفیږی) بلل کيږي. په تعريفیږي کې کيدی شي چی
نوې درجه ، زره درجه او يا لينده کچ وکارول شي. کاروونکی دې پام ولري چې په
جېشميري کې همغه مودوس په کار اچول شوي دی. (راتلونکی دې وکتل شي)

په برخه گردیبرخوکی وښوول شو (گردیبرخی د مخه خپرل شوي دي) چی هر کونج پورې یوه گردیبرخه یا گردی لینده اړه لري، نو ټولی گردی پورې 360° درجی کونج یا $2\pi r$ اړه لري، یوه کونج α پورې بیا یوه لینده b اړه لري، کومه چی په چاپیری کی π همداسی نیسي لکه په پیل کی π و 360° درجو ته . دلته گردیگن دی : $\pi = 3,14....$ (دا مو له دې پخوا لاس ته راوړی دی)

پیلبللگه:

کونج $\alpha = 60^\circ$ له گردی د 10 سانتیمتره وړانگی سره یوه په لاندې ډول گردی لینده $b = 20\pi \cdot 60^\circ : 360^\circ = 10,47 \text{ cm}$ غوڅوي یا بیلوي. د گردی چاپیری دی : $U = 20\pi = 62,83 \text{ cm}$
همغه کونج α د 5 سانتی متره وړانگی سره گردیلینده $b = 10\pi \cdot 60^\circ : 360^\circ = 5,236 \text{ cm}$
غوڅوي. دا گردی لاندې چاپیری لري : $U = 10 = 31,416 \text{ cm}$.
له گردی د وړانگی $r = 1 \text{ cm}$ سره ددې په خټ یا برعکس کونج گردیلینده $b = 2\pi \cdot 60^\circ : 360^\circ = 1,047 \text{ cm}$
غوڅوي» د دې گردی چاپیری فقط $U = 2\pi = 6,283$ دی .

له بیلگی څرگندیږي، چی لینده اندازه په همغه اندازه زیاتیږي لکه وړانگه. له دې امله کیدی شي خپله شمیرنه په یوونگردي د وړانگی 1 سره رابنده یا محدوده کړي او روښانه کړي:

تعریف: په یوونگردي د گردیلیندی اوږدوالي کچگن، چی په خنتریکونج

باندې خیره شوي، لینده کچ بلل کیږي. لاندې شمیراوړون باوري کوي:

$$x = (\alpha / 180^\circ) \cdot \pi \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = (x / \pi) 180^\circ = \frac{x}{\pi} \cdot 180^\circ$$

دا چی د وړانګي خرخون په پوره کونج هم وراوړیدی شي، نو له دې امله د لینده کچ لپاره په خوښه ریلګڼونه پریښوول شوي.
بیلګی :

$$\begin{aligned} \alpha = 1^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{1^\circ}{180^\circ} \pi = 0,0175 \text{ (rad)} & \alpha = 180^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{180^\circ}{180^\circ} \pi = \pi = 3,1416 \\ \alpha = 30^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{30^\circ}{180^\circ} \pi = \frac{\pi}{6} = 0,5236 & \alpha = 360^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{360^\circ}{180^\circ} \pi = 2\pi = 6,2832 \\ \alpha = 45^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{45^\circ}{180^\circ} \pi = \frac{\pi}{4} = 0,7854 & \alpha = 720^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{720^\circ}{360^\circ} \pi = 4\pi = 12,5664 \text{ usw.;} \\ \alpha = 60^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{60^\circ}{180^\circ} \pi = \frac{\pi}{3} = 1,0472 & & \\ \alpha = 90^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{90^\circ}{180^\circ} \pi = \frac{\pi}{2} = 1,5708 & \alpha = -75^\circ &\Leftrightarrow x = \frac{-75^\circ}{180^\circ} \pi = \frac{-5}{12} \pi = -1,309 \end{aligned}$$

ارکوسبلواکي Arcusfunktionen





زیات وخت دا پوښتنه هم رامنځ ته کیږي ، چي لکه په ورکړشو کرښځاننیونو راپیداشوې کونجونه څنګه معلومیږي یا څنګه راڅرګندیږی یا بهتره څنګه ځانونه نیسی. ددې لپاره چی دا پوښتنه ځواب شي، باید امکانات ولټول شي، چی د کونجبلواک ارزښتونو څخه څنګه بیرته کونج یا په همدې توګه د هغه تعریفیږي ته، په لینده کچ راتلی شو. دا کونجبلواک پریودیکی یا تل بیرته راګرځیدونکي بلواک دی، دا په دې مانا، چي د بلواک ارزښت په منظمه توګه د مختلفو کونجونولپاره یا .

مختلفو واپتونو وروسته، بلواک ارزښتونه تکرارېږي. د دې لپاره چې په څپکيدنه ممکن شي، نو باید د خپل تعريف ډیري په یوه برخه ډیري رابند یا محدود شي.

تعريف: د یوه (رابند یا محدود) تريگونوميتریکي بلواک په څپ بلواکونه ارکوس بلواک Arcusfunktion بلل کېږي یا ځيکلوميتریکي بلواک (لاتین: ارکوس Arcus = Bogen = لينده)

دلته $\arcsin(x)$ لوستل کېږي «د x ارکوس ساين. د کونجبلواک تعريف ډیري دلته اړونده ارکوسبلواک ارزښت ډیري دی او په څپ ارگومنټ یا تعريف ډیري دلته تل یو ريلگن دی.

Trigonometrische Funktion تريگونوميتریکي بلواک	Arcusfunktion ارکوسبلواک
$f: x \mapsto \sin(x)$ $ID = \left\{x \mid -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right\}$ $W = \{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$	$f^{-1}: x \mapsto \arcsin(x)$ $ID = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ $W = \left\{y \mid -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\right\}$
$f: x \mapsto \cos(x)$ $ID = \{x \mid 0 \leq x \leq \pi\}$ $W = \{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$	$f^{-1}: x \mapsto \arccos(x)$ $ID = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ $W = \{y \mid 0 \leq y \leq \pi\}$
$f: x \mapsto \tan(x)$ $ID = \left\{x \mid -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$ $W = \{y \mid -\infty < y < \infty\}$	$f^{-1}: x \mapsto \arctan(x)$ $ID = \{x \mid -\infty < x < \infty\}$ $W = \left\{y \mid -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}\right\}$
$f: x \mapsto \cot(x)$ $ID = \{x \mid 0 < x < \pi\}$ $W = \{y \mid -\infty < y < \infty\}$	$f^{-1}: x \mapsto \operatorname{arccot}(x)$ $ID = \{x \mid -\infty < x < \infty\}$ $W = \{y \mid 0 < y < \pi\}$



فایده

Beispiele:

1. $\arcsin(0,8) = 0,9273(\text{rad}) = 53,13^\circ$
2. $\arccos(1) = 0(\text{rad}) = 0^\circ$
3. $\arctan(-100) = -1,5608(\text{rad}) = -89,43^\circ$
4. $\text{arccot}(-70) = -0,0143(\text{rad}) = -0,82^\circ$

بینگی:

۵ - دا چی کونجبلواک و ارکوسبلواک یو د بل په ختې بلواک دې نو باور لري:

$$\begin{aligned} \sin(\arcsin(y)) &= y; & \arcsin(\sin(x)) &= x \\ \cos(\arccos(y)) &= y; & \arccos(\cos(x)) &= x \\ \tan(\arctan(y)) &= y; & \arctan(\tan(x)) &= x \\ \cot(\text{arccot}(y)) &= y; & \text{arccot}(\cot(x)) &= x \end{aligned}$$

یعنی پدې توگه چې

$$\begin{aligned} \sin(\arcsin(0,4)) &= \sin(23,58^\circ) = 0,4 \\ \arccos(\cos(\pi/3)) &= \arccos(0,5) = 1,0472 \\ \tan(\arctan(-40)) &= \tan(-88,5679^\circ) = -39,9999 \\ \text{arccot}(\cot(60^\circ)) &= \text{arccot}(0,5774) = 1,0472 \end{aligned}$$

د تريگونوميټريکي بلواکو خويونه

دا چې کونجکچ په درجه کچ او هم په لينده کچ ورکول کيدی شي، کيدی شي چې يوه کونج بلواک تعريفیږی يا α او يا x وي. ددې لپاره چې د يوه بلواک خوي باندې ټينگار وکړو، بايد په لاندې په لينده کچ تکیه وکړو.

د لاندې خويونو لمړۍ ډله يواځي له تعريف مساوات (د مخه راغلی) او د پيتاگوراس له جملی لاس ته راځي (د مخه لوستل شوې) لاندې صدق کوي :

تعريف :

$$\tan(x) = \frac{\text{مخامخ کاتيت}}{\text{هيپوتينوزي}} = \frac{\text{مخامخ کاتيت}}{\text{پرتة کاتيت}} = \frac{\text{هيپوتينوزي}}{\text{پرتة کاتيت}} = \sin(x) / \cos(x)$$

ورته:

$$\cot(x) = \cos(x) / \sin(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

له دې لاس ته راځي

$$\cot(x) = 1 / \tan(x) \Leftrightarrow \tan(x) = 1 / \cot(x)$$

برسيره پر دې لرو:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

د دې سره لاس ته راځي:

$$1 / \cos^2 x = 1 + \tan^2 x ; 1 / \sin^2 x = 1 + \cot^2 x$$

په لاندې کې $gegeben$ ورکړی او $gesucht$ غوښتونې یا پلټونې په مانا دي

$\begin{matrix} gegeben \\ gesucht \end{matrix}$	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$
$\sin x$	$\sin x$	$\pm \sqrt{1 - \cos^2 x}$	$\pm \frac{\tan x}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 x}}$
$\cos x$	$\pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$	$\cos x$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \frac{\cot x}{\sqrt{1 + \cot^2 x}}$
$\tan x$	$\pm \frac{\sin x}{\sqrt{1 - \sin^2 x}}$	$\pm \frac{\sqrt{1 - \cos^2 x}}{\cos x}$	$\tan x$	$\frac{1}{\cot x}$
$\cot x$	$\pm \frac{\sqrt{1 - \sin^2 x}}{\sin x}$	$\pm \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{1}{\tan x}$	$\cot x$

لکه چې د مخه مو په گوته کړل، کیدی شي چې تریگونومتريکي بلواک د مختلفو گونجونو لپاره روښانه شي. که لمړي ورکړ شوي بلواک ارزښتونه مقایسه شي، نو په کره توګه یا په کلکه توګه لاس ته راوړی شو


تعریف : تریگونومتريکي بلواک ټول پریودیګي یعنې بیرته راګرځیدونکي دي، دا په دې مانا، چې د بلواک ارزښتونه په منظمو واټنونو کې تکرارېږي. په دې د ساین بلواک او د کوساین بلواک راګرځیدنه (یا 360° درجې) لري،

کوټنجنت بلواک راګرځیدنه (یا 180° درجې) لري.

$$\sin(x \pm 2k\pi) = \sin x \quad \left. \begin{matrix} \\ \tan(x \pm k\pi) = \tan x \end{matrix} \right\} k \in \mathbb{N}$$


$$\cos(x \pm 2k\pi) = \cos x \quad \left. \begin{matrix} \\ \cot(x \pm k\pi) = \cot x \end{matrix} \right\} k \in \mathbb{N}$$

$$\cot(x \pm k\pi) = \cot x$$



خیره ۲۱۴

د ساین - او کوساین فنکشن
په وجود یاس راځي چې دغه



د قنجنیت او توپنجنیت فنکشن په وجود

په ښکاري :

$$\begin{array}{llll}
 \sin 50^\circ & = \sin (50^\circ + 360^\circ) & = \sin (50^\circ - 720^\circ) & = 0,76604 \\
 \cos -30^\circ & = \cos (-30^\circ - 360^\circ) & = \cos (-30^\circ + 1080^\circ) & = 0,86603 \\
 \tan 2,5 & = \tan (2,5 - \pi) & = \tan (2,5 + 5\pi) & = -0,74702 \\
 \cot 10 & = \cot (10 + \pi) & = \cot (10 - \pi) & = 1,54235 \\
 \sin 35^\circ & = \sin (180^\circ - 35^\circ) & = -\sin (180^\circ + 35^\circ) & = -\sin (360^\circ - 35^\circ) = 0,573576 \\
 \cos 35^\circ & = -\cos 145^\circ & = -\cos 215^\circ & = \cos 325^\circ = 0,81952 \\
 \tan 0,6109 & = -\tan 2,5307 & = \tan 3,7525 & = -\tan 5,6723 = 0,700208 \\
 \cot 0,6109 & = -\cot 2,5307 & = \cot 3,7525 & = -\cot 5,6723 = 1,428042
 \end{array}$$

که د فنکشن گراف ته په ځیر شو نو په دې برسيره په ټينگه روښانيږي :

x	$\pi - x$	$\pi + x$	$2\pi - x$	
$\sin x = \sin(\pi - x) = -\sin(\pi + x) = -\sin(2\pi - x)$				(Abb. 179)
$\cos x = -\cos(\pi - x) = -\cos(\pi + x) = \cos(2\pi - x)$				(Abb. 179)
$\tan x = -\tan(\pi - x) = \tan(\pi + x) = -\tan(2\pi - x)$				(Abb. 180)
$\cot x = -\cot(\pi - x) = \cot(\pi + x) = -\cot(2\pi - x)$				(Abb. 180)

بیلگی:

	α	$180^\circ - \alpha$	$180^\circ + \alpha$	$360^\circ - \alpha$
	35°	145°	215°	325°
sin	0,573576	0,573576	-0,573576	-0,573576
cos	0,819152	-0,819152	-0,819152	0,819152
tan	0,700208	-0,700208	0,700208	-0,700208
cot	1,428148	-1,428148	1,428148	-1,428148

که څه هم نن د کونجبلواکو شمیرلو لپاره، یواځی د جیشمیری یا کمپیوتر څخه کار اخستل کیږي، هدفمند بولو، چی یو څو زیات د استعمال وړ ارزښتونه په لاندې ورکړو.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
$\sin x$ bzw. $\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\cos x$ bzw. $\cos \alpha$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	-1	0	1
$\tan x$ bzw. $\tan \alpha$	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{3}\sqrt{3}$	0	-	0
$\cot x$ bzw. $\cot \alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	0	$-\frac{1}{3}\sqrt{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	-	0	-

د نته ماچو د هداړل په مانا دس او کیدس تیږی یا ځوی .

له دې جدول څخه کیدی شي په خیال کی یا گوماني لاس ته راوړی شو

$$\begin{aligned}\sin x &= \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) & \cos x &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \\ \tan x &= \cot \left(\frac{\pi}{2} - x \right) & \cot x &= \tan \left(\frac{\pi}{2} - x \right)\end{aligned}$$

دا گومان کیدی شي په ولاړ کونجیز دریگوډي کې د تعریف په مرسته په ساده توګه وپسول شي. :

$$\sin \beta = a / c \quad \text{او} \quad \cos \beta = a / c$$

د $\beta = 90^\circ -$ له امله لاس ته راځي :

$$\sin \beta = \cos (90^\circ - \beta)$$

په ورته توګه نورې غوښتنې هم لاس

ته راتلی شي.

دا له څیرو څخه هم لاس ته راوړل کیدی شي، ځکه د سین او کوساین

بلواکو یا په همدې ډول د تانجنټ او کوتنجنټ بلواکو گرافونه د $x = \pi/2$ کرښی

ته یو بل سره محوریو مترې ځغلي :

له څیرو او بیلګو څخه په دې برسیره لاس ته راځي:

تعریف: د کوساین بلواک جفت دی، لرو:

$$\cos(x) = \cos(-x)$$

ساین -، تنجنټ - او کوتنجنټ بلواک نا جفت دي» د دوي لپاره باور لري:

$$\sin(x) = -\sin(-x), \tan(x) = -\tan(-x); \cot(x) = -\cot(-x)$$

یادونه: په دې نلواکو کې کیدی شي چې x له نوکانو دباندې هم وي:

بیلگی:

$$\sin 60^\circ = -\sin (-60^\circ) = 0,86603$$

$$\cos 0,75 = \cos(-0,75) = -0,70711$$

$$\tan 150^\circ = -\tan (-150^\circ) = -0,57735$$

$$\cot 1,3 = -\cot(-1,3) = 0,27762$$

د زیاتون قضیې یا تیورمونه

دا چې کونجبلواک لایني نه دي (د فنکشنګراف کرښه نه ده، بلکه کرښه ده) ، نو ډبل تعریفیږي پورې ساده ډبل بلواک ارزښت اړه نه لري. لکه

$$\sin 30^\circ = 0,5 \quad \sin 90^\circ = 1 \quad \sin 180^\circ = 0$$

د داسې په نامه زیاتونمسئلي په مرسته ممکن کیږي، چې د بلواک ارزښت د کونج په دوه برابرولو یا په همدې ډول د دوه کونجونو یو په بل زیاتولو د یوگونو کونجونو لپاره ارزښتونه رابې کړي شو.

بیلگی :

$$1. \quad \sin(x + y) = \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y$$

$$1'. \quad \sin (x - y) = \sin x \cdot \cos y - \cos x \cdot \sin y$$

$$2. \quad \cos(x + y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$$

$$2'. \quad \cos (x - y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y$$

$$3. \quad \sin 2x = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$$

$$4. \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$5. \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$6. \cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$7. \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{0,5(1 - \cos x)}$$


$$8. \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{0,5(1 + \cos x)}$$

$$9. \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \cdot \tan y} \quad \text{mit } \tan x \cdot \tan y \neq 1$$

$$9'. \tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \cdot \tan y} \quad \text{mit } \tan x \cdot \tan y \neq 1$$

$$10. \cot(x+y) = \frac{\cot x \cdot \cot y - 1}{\cot x + \cot y} \quad \text{mit } \cot x \neq -\cot y$$

$$10'. \cot(x-y) = \frac{\cot x \cdot \cot y + 1}{\cot x - \cot y} \quad \text{mit } \cot x \neq \cot y$$



1. und 2.:

$$|OA| = 1$$

$$|AC| = \sin y; \quad |OC| = \cos y$$

$$|AB| = \sin(x+y); \quad |OB| = \cos(x+y)$$

$$\frac{|EC|}{|AC|} = \sin x \Rightarrow |EC| = |AC| \cdot \sin x = \sin x \cdot \sin y$$

$$\frac{|OD|}{|OC|} = \cos x \Rightarrow |OD| = |OC| \cdot \cos x = \cos x \cdot \cos y$$

$$\frac{|EA|}{|AC|} = \cos x \Rightarrow |EA| = |AC| \cdot \cos x = \cos x \cdot \cos y$$

$$\frac{|DC|}{|OC|} = \sin x \Rightarrow |DC| = |OC| \cdot \sin x = \sin x \cdot \sin y$$

$$|AB| = |AE| + |EB| = |AE| + |CD|$$

$$|OB| = |OD| - |BD| = |OD| - |EC|$$

در کای به کای کولو تغه منبونه به لاس راجه

$$\sin(x+y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$$

$$1'. \quad 2'.$$

$$3. \quad 4. \quad x = y.$$

$$5.: \text{ Setze } z+t=x; z-t=y \Rightarrow z = \frac{x+y}{2}; t = \frac{x-y}{2}$$

کین ره

$$\sin(z+t) = \sin z \cdot \cos t + \cos z \cdot \sin t$$

پس نه و

$$= \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} + \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\sin y = \sin(z-t) = \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} - \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

همه

$$\Rightarrow \sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

6. منبونه به وریه توکه خه نه می

$$7.: \quad x = y = z/2$$

لیج ده

$$\Rightarrow \cos(x+y) = \cos z = \cos 2 \cdot \frac{z}{2} = \cos^2 \frac{z}{2} - \sin^2 \frac{z}{2}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \frac{z}{2} = \cos^2 \frac{z}{2} - \cos z = 1 - \sin^2 \frac{z}{2} - \cos z \quad (*)$$

$$\Rightarrow 2 \sin^2 \frac{z}{2} = 1 - \cos z \Rightarrow \sin^2 \frac{z}{2} = \frac{1}{2} (1 - \cos z)$$

در نتیجه نیونی له لاری منبونه لرو

$$8.: \quad (*) \sin^2 \frac{z}{2} \text{ durch } 1 - \cos^2 \frac{z}{2}.$$

به (*) کی و لیکنه لیج ده

9-10: د 11 پیکه له 1 ادم او تنبنت له تعریف تغه لاس ته راجه

بلواک یا فنکشن $y = a \cdot \sin(bx+c) + d$

لکه چي په پيل کی مو وویل په طبیعت او تخنیک کې ډیرې پېښې شته دي چې تل بیرته راکړځي یا لنډ: راکړځي، یعنې پریودیکي دي. د دې د تشریح لپاره په خپل سوچه یا خالصه بڼه تل د ساین بلواک بسیا نه کوي.

دا زیات علتونه لري: لمری د ساینبلواک د -1 او 1 ترمنځ ارزښت نیسي، له بلي لور داواقي د کونج په واک کې نه دي بلکه د وخت په واک کې دي د یوې راگرځیدنې سره، چې دا په ساده توګه د 2π په ډول نه شي رانیولکیدی. له دې امله د ساین بلواک د دې کارونو د روښانولو لپاره باید موډیفیکشن شي یا یې بڼه واوړي. دا بڼه اوږون او د هغې تاثیر په لاندې لیدنه کې راټول شويدي، ګراف یې ورزیاتې څیړونې لپاره دی. په ورته ډول د نورو کونجبلواکو لپاره باور لري په عمل کې مګر یواځې د ساینبلواک (په همدې توګه د هغې مخامخ د کوساین بلواک چې په 2π سره راکښل شوی وي) د مانا ډک دي. (لوستن: له پېل لور څخه)

بیلګې	د کارونې ساحه	تاثیر	بلواک
څلور ۲۱۷	ټولې تلپیرته راگرځیدونې تعاملونه		$y = \sin(x)$
څلور ۲۱۸	د یوه مساوي او ډول شپاړتو ډول یو په بل مړیون	د -1 لور باندي راکښنه	$y = \sin(x) + d$

$y = \sin(x+c)$	د فاز تغییر یا های بدلون	په بدل بوښنه جریان د بوښنه او شیاؤونک تغییر د وښانویه	۲۱۹
$y = a \cdot \sin(x)$	د امپلیتود د ټاکل بدلون فالتور - ۱ د 180° فاز های بدلون ده	د یوه بندل خوږ بدنه	۲۲۰
$y = \sin(bx)$	د یو یو د تغیر یا بدلون سیریت $b > 1$ $0 < b < 1$ $b < 0$ په کثرت کېدنه کم مخور ده	د یو بنسټیزو ټاکل تغییر د یوه وخت دا وړنه او رهغی بره لنډه او لږه د مخور الویه او ازوونکی	۲۲۱
$y = a \cdot \sin(bx+c)+d$	عمومي حالت	کمپلکس پروډې جریان یا عمل	۲۲۲

تمرینونه

۱ - د لاندې ورکړې سره څیره بله کړی

$$4^\circ 6' = 4,1^\circ \quad ; \quad 10^\circ, 5' = 10^\circ 30'$$







$$\begin{array}{lll} \text{a) } 6,75^\circ = & \text{b) } 120,48^\circ = & \text{c) } -75,65^\circ = \\ \text{d) } 52^\circ 16' = & \text{e) } 97^\circ 13' = & \text{f) } 44^\circ 44' 44'' = \end{array}$$

۲ - په درجه کچې وليکي

$$\begin{array}{lll} \text{a) } x = \pi/3, & \text{b) } x = -\pi/4, & \text{c) } x = (2/3)\pi \\ \text{d) } x = 4 & \text{e) } x = -3 & \text{f) } x = 4,7 \end{array}$$

۳ - په لینده کچې یې وليکي

$$\text{a) } 15^\circ \quad \text{b) } -60^\circ \quad \text{c) } 540^\circ \quad \text{d) } 20^\circ 15' \quad \text{e) } 15,75^\circ$$



د دې بلواک ګراف د ساین کړې $y = \sin x$ څخه لکه چی ګورو لاس ته راځي:

- ۱- د ارزښت دوه ځله کیدل
- ۲- د نیمې راګرځید اوږدوالی باندې پرسیدنه
- ۳- په یوه یوون د ښي لور ته راکښنه
- ۴- په $1/2$ پورته لورته 100% راکښنه

۴ - وټاکي


- a) $\sin 20^\circ$ b) $\sin(-30^\circ)$ c) $\sin 172^\circ$ d) $\sin 1^\circ 4'$
 e) $\cos 35^\circ$ f) $\cos 380^\circ$ g) $\cos(-27^\circ)$ h) $\cos 47,9^\circ$
 i) $\tan 11^\circ$ k) $\tan(-15^\circ)$ l) $\tan 33,33^\circ$ m) $\tan 13^\circ 13'$
 n) $\cot 870^\circ$ o) $\cot(-11^\circ)$ p) $\cot 14^\circ 14'$
 q) $\cot(-2^\circ 2')$
 r) $\sin \alpha = 0,8$ s) $\cos \alpha = 0,9$ t) $\tan \alpha = 2,5$
 u) $\cot \alpha = -1$ v) $\sin \varphi = 0,3$ w) $\cos \varphi = -0,13$
 x) $\tan \varphi = -4$ y) $\cot \varphi = 0,3$ z) $\arcsin(x) = \pi/2$

۵ - په يوه ولاړ کونجيز دريگوډي کې لرو $\angle = 90^\circ$ او په دې برسيره :

a) $a = 7 \text{ cm}$; $b = 6 \text{ cm}$

b) $a = 16 \text{ cm}$; $\angle = 66^\circ 45'$

c) $c = 5 \text{ cm}$; $a = 3 \text{ cm}$



خيږه ۲۲۳

پاتې ټوټې وشميرئ

۶ - په مساوي پښيز دريگوډي

کي (a = پښه ده) دى

a) $a = 10 \text{ cm}$; $\angle = 80^\circ 40'$

b) $a = 12 \text{ cm}$; $h = 8 \text{ cm}$

c) $\beta = 40^\circ$; $a = 7 \text{ cm}$

پاتې ټوټې وشميرئ

۷ - د يوه پخکونجيز ($90^\circ < \alpha$)

دريگوډي لپاره ساين وشميرئ

۸ الف) کوساين د يوه پخ کونجيز

دريگوډي لپاره وشميرئ ($\alpha > 90^\circ$)

ب) په يوه ولاړکونجيز دريځکودي کوم فرمول لاس ته راځي؟

۹ - په يوه مکعب کې د يوه هوا نيمې او بنسټهوارې ترمنځ کونج څومره لوي دي؟

څيره د دواړو هوا يا فضا يا بدن نيميو ترمنځ کونج څومره لوي دي؟

۱۰ - د دوه گردیو وړانګی

$$r_1 = 5 \text{ cm}, r_2 = 4 \text{ cm}$$

دي او همداسی د منځتکو واټن $|M_1M_2| = 8 \text{ cm}$ ورکړ شوی دی.

د دواړو گردیو د تماس

مماسونو غوڅکونجی وټاکي

او د کپې غوڅونی اوږدوالی .

۱۱ - په يوه دريځکودي کې د يوه

کونجنيښی مخامخ اړخ په داسی

ځان نیونه يا تناسب غوڅوي لکه

په دې پرتي خواوې. دا غوښتنه د

ساین جملی په مرسته حل

(اوبی) کړی (څيره ۲۲۴).

۱۲ - که يوه بار ځاي ته،

چي ۵۰، ۱ متره جگ دی،

يوه زینه ورجگه شي

ميلانکونج دې زیات ترزیات 33° وي، زینه دې څومره لويه وي؟


۱۳ - الف) د يوې پورته ختلی کوڅي جگوالي توپیر دې څومره وي، که دا

کوڅه ۱۶۰۰ متره اوږده او 12% جگه وي؟

ب) د ۱۵۴۰ پرتی لارې وهلو وروسته د جگوالي توپیر څومره دی؟

پ) د يوه زوړندې پټیلار، چی ۱۷۰۰ متره اوږده ده، په سلو کې څومره


لوي دي، که دا د جگوالی توپیر ۵۰۰ متره ولري؟




څيره ۲۲۴

- ۱۴ - یو د اوبو بیلر (کتله = ۱۰۰ کیلوگرامه) په یوه ډره پورته خپژول کيږي، چی میلانکونج $\angle = 25^\circ$ لري. د وزن زور په زوړند زور تختی سره غبرگ او نورمال یعنی ولاړ زور (د فشار زور) ولاړ تجزیه یا ټوټه کيږي، دواړه زوره څومره لوي دی ؟ (۱ کیلوگرام = ۸۱ ، ۹ نیوتن $1 \text{ kg} = 9,81 \text{ N}$).
- ۱۵ - یو تلفونستن په څلور رسیو، چی هره یوه یی ۵۳ متره اوږده ده، درول کيږي. درسیو میلانکونج 60° دی په پنبه باندې په کوم جگوالی باید رسی ورلی شي ؟
- ۱۶ - د یوې ۵۳ متره جگي ونی سیوری ۵ ، ۱۲ متره اوږد دی. په ځمکه لمرورانگي په کوم جگوالی یوبل سره مخامخ کيږي؟
- ۱۷ - د یوه ۵ متره جگ کتونکي (لکه د یوه کور، په دوم منځل کی کړکی) ، څخه د یوه برج څوکه لیدل کيږي چی جگیدونکوج یی $\angle = 18,5^\circ$ او پنبیټکی یی $\beta = 8^\circ$ لوید کونج ، برج څومره جگ دی ؟ د لیدټکي څخه یی پروت لریوالی څومره دی ؟
- ۱۸ - الف (د پیزا (Pisa) کور برج ۴۷ متره جگ دی، او څوکه یی د پنبی ټکي څخه ۵۰ ، ۴ متره وراوړي. دا برج څومره مایل دی ؟
- ب (د یوه جومات برج چی ۱۵۰ متره جگ وي، لیدونکی د کوم کونج لاندې دا برج کتلی شي، که دا برج په ځمکي ټکي (یعنی د سترگي جگوالی د برج بنسټټکي سره برابر وي)، څخه وکتل شي، چی د برج له بنسټ څخه ۵۰۰ متره واټن ولري؟
- پ (د ۵ ، ۱ کیلو متره لریوالی څخه یو بل برج د کوم کونج لاندې لیدل کيږي
- که جگوالی یی ۱۶۰ متره وي؟
- که جگوالی یی ۱۳۷ متره وي ؟
- ت (د پراته کوم اوږدوالی لاندې د بنسټ څخه د ۱۲ درجی کونج لاندې
- د بل برج څوکه بنکاريزي چی جگوالی یی ۱۴۳ متره وي ؟

- د پاریس د ایفل برج ښکاریزې چی جگوالی یی ۳۰۰ متره دی ؟
- ۱۹ - د ښیپس اهرام (Cheops pyramide) ۱۳۷ متره جگوالی لري او د بنسټ د یوه اړخ اوږدوالی یی ۲۳۰ متره دی چی بنسټ یی مربع شکل لري
- الف) د اړخهوارې میلانکونج څومره دی ؟
- ب) د څنگهوارې دریواړه دنننی کونجونه څومره لوي دي؟
- ۲۰ - یو ژوری یا قبر -۸ ، ۱ متره ژور دی، بنسټسور یی ۵ ، ۲ متره دی، د پورته لور ته وازکونج ی دواړو لورو ته ۶۰ درجی دی
- الف) دا کبر پخپل وازوالی یا سر کی څومره پراخ دی؟
- ب) که ۱۰ متره اوږد وي، نو بیا دا څومره اوبه ځایکوي ، که جگوالی یی ۵۰ ، ۱ متره وي؟
- ۲۱ - یو ډنډ په سر کی ۶ متره سرور دی او ۵ ، ۴ متره جگوالی لري د بحیرې لور ته 14° میلان لري، د دننه لور ته 28° میلان لري. د ډنډ بنسټ څومره سور لري؟ د هغی د نیمی هواره څومره ده؟
- ۲۲ - د ریفلډنډ Riffelsee څخه یو ښه لید د ماترهورن (ماترننسرک یا د ماترن د غره څوکه Matterhorn) دواړه په زیرمات ، سویس Zermatt / Schweiz کی دی) اچول کیږي که دا د یوه لیدتکي څخه چی ۱۰۰ متره جگ دی د ډنډ په لور ښکته وکتل شي، نو د غره د څوکی هندارونه د 12° پریوتکونج لاندې لیدل کیږي. د غره څوکه د یوپورته کونج 11° لاندې لیدل کیږي. د ریفلډنډ باندې د ماترننسرک څوکه څومره جگه پروته ده؟
- خیره



خیره ۲۲۵



خیره ۲۲۶

۲۳ - الف (یوه د کښولو کړی،

چي په دوه د کښولو چیترو

باندې راتاو ده، خومره اوږده

ده، که لاندې اندازې ولري


$r = 22 \text{ cm}$, $R = 35 \text{ cm}$,

$|M_1 M_2| = 2 \text{ m}$?


ب (دا کړی به خومره اوږدې وي

که د اټیران په خیر له چیتروگانو یا ټیکلیو راکی خیدل وي ؟

۲۴ الف (د ونی په سټه یو کایل)موری (په خټک د D زور سره وهل کیږي. د فشار هغه زورونه D څومره لوي دي، کوم چی د سټی درځونه ، که د کایل یا تېرگي کونج $\alpha = 6^\circ$ وي. (حیره ۱۹۴) ؟
 ب (په کوم کایل کونج یا تېرگی کونج لرو: $|D|=|F|$ ؟



خیره ۲۲۷



خیره ۲۲۸

۲۵ - د یوه الوتماشین څخه

ځمکه د یوه α کونج لاندې

لیدل کیږي (خیره) دا الوتماشین


څومره جگ الوزې ؟ (د ځمکې

وړانگه : ۶۳۷۰ کیلومتره)

۲۶ - یو گاډی د $v_{\alpha} = 120 \text{ km/h}$ سرعت

سره روان دی، نو د باران څاڅکی په

پټلی د تلنلور باندې په 115° کونج



د چیترو (مطلب د گاډې د اوسپنې
تیر یا گاډیل دی) مخامخ ځغلي.
له دې ورکړو څخه د باران د څاڅکو
د لویدلو سرعت v_g وټاکي ؟
۲۷ - که د لمروړانگه په دوه مختلفو
طبقو ولویري، نو خپلی لور ته تغیر
یا بدلون ورکوي. د سنیلوس Snellius
د ماتقاعدي له مخی کیدی شي چی د
ماتیدو قانون وشمیرل شي. دا قانون
وایی، چی پروتوړانگه ، ماتوړانگه او
ولاړکرنه یا عمود په بیلیدونکی هواری په یوه هواره پراته دي او برسیره پر
دې لاندې اړیکي باور لري یا صدق کوي:


$$\sin \alpha / \sin \beta = n$$

که د رڼاوړانگه په یوه بنسینه (اوبو) پریوزي، نو $n = 1,5$ (1,33) دی. ونبایی،
چی ماتکونجونه څومره لوي دي، کوم چی په لاندې پروتکونجونو اړه لري:

$$10,5^\circ, 15,8^\circ, 27,3^\circ, 41,2^\circ, 67,6^\circ, 72,4^\circ, 81,9^\circ$$

۲۸ - په ۱۸مه میلادي پیړی کی د سپورمی لریوالی تریگومتريکي وټاکل
شو. په برلین کی (جغرافیوي اوږدوالی $\varphi_1 = 52, 52^\circ$) او لکه د بنو هیلو
په کونج کی ($\varphi_2 = -33,93^\circ$)، کوم چی په همغه اوږدگراډ پراته دي، د
سپورمی سره په همغه وخت کی تړل کیږي. له دې لاس ته راغلل:
 $\delta_1 = 32,08^\circ$ او $\delta_2 = 55,72^\circ$.

و شمیری $|BK|, \beta, |KM|$ او له دې څخه d_{EM} .



۲۹ - لرځيدنی Schwingungen تل د وخت په اړه شميرل کيږي يعني د وخت t ترواک لاندې دي. دا د بلواک $y = a \cdot (\sin(2\pi/T)) \cdot t + k$ له لارې ورکړ شوي. دلته $(2\pi/T)t = x$ هغه کونج دی، کوم چي په T وخت کی وهلکيږي. $1/T = f$ د يوه څرخون پريود يا راڅرخيدنی وخت په گوته کوي او د لرځيدنی دوام بلل کيږي « f فرکونڅ frequenz بلل کيږي».

۷- مربع مساوات (خلوری برابرونونه)

۷ . ۱ - سوچه خلوری برابرون

مساوات $x^2=25$ حل کری

د ازماښت سره حل $x_1=5$ یا $x_2=-5$ لاس ته راځي

ځکه چې $(x_1)^2 = 5^2 = 25$ یا $(x_2)^2 = (-5)^2 = 25$

مساوات د ورته بڼه بدلون له لارې لاس ته راوړل کيږي.

په دواړو لورو رینه ونیسی $x^2=25$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{25}$$

ارزښت حل کری $\Leftrightarrow |x| = 5$

(Fall حالت ته وايي)

$$\text{Fall 1: } x \geq 0 \Rightarrow |x| = x = 5 \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 5}}$$

$$\text{Fall 2: } x < 0 \Rightarrow |x| = -x = 5 \Leftrightarrow x = -5 \Rightarrow \underline{\underline{x_2 = -5}}$$

ارزښت يا مطلقه ارزښت ته روښانه ونه

يو سړی 120 € گټي، موږ داسې هم وايو چې يو سړی 120 € د پيسو ارزښت گټي.

يو سړی د 120 € جزا پانه اخلي، موږ وايو چې دی بايد د 120 € پيسو ارزښت تاديه کړي يا ورکړي.

د اقتصادي تخنيک له مخې گټل د مثبت او جزا د منفي په معنا دي.

نو: گټل 120 €+, د جزا پانه 120 €-,

په دواړو حالتونو کې دا 120 € دي.

د يوه حقيقي گڼ يا عدد ارزښت لرو، که دا مخخښه + بدله شوه.

بيلگې:

$$\begin{array}{llll} |4| = 4 & |5,12| = 5,12 & |\sqrt{3}| = \sqrt{3} & |\pi| = \pi \\ |-4| = 4 & |-5,12| = 5,12 & |-\sqrt{3}| = \sqrt{3} & |-\pi| = \pi \end{array}$$

دا دومه ساده هم نه دی، که موږ د يوې اووښتونې x ارزښت غواړو وټاکو $|x| = x$ تل د ټولو حقيقي گڼونو يا اعدادو لپاره باور نه لري.

بيلگه:

--	--	--

گومان $|x| = x$ فقط هلته تیک دی، چي $x \geq 0$ وي.

د $x < 0$ لپاره ناتیګ دی..

موږ دا رزښت ټاکلو کي باید دوه حالتونه سره توپیر کړو:

لومړی حالت که $x \geq 0$ وي $|x| = x$

دویم حالت که $x < 0$ وي $|x| = -x$

بیله:

$x = 5$ دا چي $x > 0$ دی باور لري $|x| = x$ ځکه چي $|5| = 5$ (لومړی حالت)

$x = -5$ داچي $x < 0$ دی باور لري $|x| = -x$ ځکه چي $|-5| = 5$ (دیم حالت)

د یوه حقيقي عدد ارزښت تل مثبت دی.

ارزښت د یوه عدد لویوالی ورکوي، بی له دې چي مخ نخښه په پام کي ونیل شي.

د حل بدیل |

د بني $ax^2 = b$ يا $ax^2 = +c = 0$ برابرونونه سوچه مربعيز بلل کيږي..

دا د مناسب بڼه بدلون وروسته د ريښه نيونې له لارې حل کيږي.

په لاندي کې fall د حالت په معنا دی.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8 &= 0 & | +8 \\ \Leftrightarrow 2x^2 &= 8 & | :2 \\ \Leftrightarrow x^2 &= 4 & | \sqrt{} \\ \Leftrightarrow \sqrt{x^2} &= \sqrt{4} \\ \Leftrightarrow |x| &= 2 \end{aligned}$$

لومړۍ حالت	$x \geq 0: x = x = 2 \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 2}}$
دويم حالت	$x < 0: x = -x = 2 \Leftrightarrow x = -2 \Rightarrow \underline{\underline{x_2 = -2}}$

بيلگه:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x^2 &= 9 & | \cdot 2 \\ \Leftrightarrow x^2 &= 18 & | \sqrt{} \\ \Leftrightarrow \sqrt{x^2} &= \sqrt{18} & | \\ \Leftrightarrow |x| &= \sqrt{18} \end{aligned}$$

لومړۍ حالت:	$x \geq 0: x = x = \sqrt{18} \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = \sqrt{18}}}$
دويم حالت:	$x < 0: x = -x = \sqrt{18} \Leftrightarrow x = -\sqrt{18} \Rightarrow \underline{\underline{x_2 = -\sqrt{18}}}$

د حل بديل||

د مساوات $x^2 + 2x = 0$ حل

د ازمیلو له لارې لرو : $x_1=1$ یا $x_2=-2$

$$x_1^2 + 2x_1 = 0 \Leftrightarrow 0^2 + 2 \cdot 0 = 0 \quad \text{ځکه چې}$$

$$x_2^2 + 2x_2 = 0 \Leftrightarrow (-2)^2 + 2 \cdot (-2) = 4 - 4 = 0 \quad \text{یا}$$

د نوکانو بندولو له لارې هم همدا نتیجه لاس ته راځي:

$$x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \underbrace{x(x+2)}_{\text{Produkt}} = 0$$

ضرب Produkt

دوه امکانات (شونتیاوې) شتون لري، چې دا ضرب صفر شي:

$$x = 0 \Rightarrow 0 \cdot (0+2) = 0 \cdot 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$(x+2) = 0 \Rightarrow x \cdot 0 = 0 \quad \text{دویم حالت: د په دې معنا چې}$$

$$(x+2) = 0 \Leftrightarrow x = -2 \Rightarrow \underline{\underline{x_2 = -2}}$$

د صفر ضرب جمله:

یو ضرب صفر دی، که لږ تر لږه د هغه یو ضریب صفر وي.

پام:

د بڼې یا مساوات سیستم تل کیدی شي د اووښتوني یا متحولي له نوکانو راوستنې له لارې حل شي.

بیلگه:

Probe از مابینت mit...سره. ausklammern د نوکانو وباسی،
Nullprodukt صفر ضرب

$$\begin{aligned}
 3x^2 + 2x &= 0 && | \times \text{ausklammern} \\
 \Leftrightarrow x(3x + 2) &= 0 && | \text{Nullprodukt} \\
 \text{Fall 1: } x &= 0 && \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 0}} \\
 \text{Fall 2: } 3x + 2 &= 0 && | -2 \\
 \Leftrightarrow 3x &= -2 && | : 3 \\
 \Leftrightarrow x &= -\frac{2}{3} && \Rightarrow \underline{\underline{x_2 = -\frac{2}{3}}}
 \end{aligned}$$

بیلگه:

Probe از مابینت mit...سره. ausklammern د نوکانو وباسی،
Nullprodukt صفر ضرب

$ \begin{aligned} \frac{2}{3}x^2 &= \frac{3}{4}x && -\frac{3}{4}x \\ \Leftrightarrow \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}x &= 0 && \times \text{ausklammern} \\ \Leftrightarrow x\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}\right) &= 0 && \text{Nullprodukt} \\ \text{Fall 1: } x &= 0 && \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 0}} \\ \text{Fall 2: } \frac{2}{3}x - \frac{3}{4} &= 0 && +\frac{3}{4} \\ \Leftrightarrow \frac{2}{3}x &= \frac{3}{4} && \cdot \frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{9}{8} && \Rightarrow \underline{\underline{x_2 = \frac{9}{8}}} \end{aligned} $	$ \begin{aligned} \text{Probe: mit } x &= \frac{9}{8} \\ \frac{2}{3}x^2 &= \frac{3}{4}x \\ \Leftrightarrow \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^2 &= \frac{3}{4} \cdot \frac{9}{8} \\ \Leftrightarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{9 \cdot 9}{8 \cdot 8} &= \frac{3 \cdot 9}{4 \cdot 8} \\ \Leftrightarrow \frac{27}{32} &= \frac{27}{32} \end{aligned} $
--	--

۷. ۲ - د مربع مساوات عمومي بڼه

$$ax^2 + bx + c = 0$$

بیلګه:

$$2x^2 - 3x + 4 = 0; \quad -x^2 + x - 5 = 0; \quad \frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - 8 = 0$$

د عملي شمیرنې لپاره زموږ مشوره داده، چې دا انځورونه ساده شي.

د دې لپاره د برابرې دواړه خواوې په a وېشو او په دې توګه په لاندې ډول د مربع مساوات نورمال بڼه لاس ته راوړو

$$\frac{ax^2}{a} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = \frac{0}{a} \Leftrightarrow x^2 + \underbrace{\frac{b}{a}}_p x + \underbrace{\frac{c}{a}}_q = 0 \Leftrightarrow x^2 + px + q = 0$$

۷. ۳ - د مربع تکمیلونې په مرسته د حل تګلار

بیلګه:

$$2x^2 - 16x - 40 = 0 \quad | :2 \quad \text{په نورمال بڼه راوړنه:}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 8x - 20 = 0 \quad \text{مربع تکمیلنه} \quad |$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{x^2 - 8x + 4^2}_{2. \text{ binomische Formel}} - 4^2 - 20 = 0 \quad | +4^2 + 20$$

$$\Leftrightarrow (x - 4)^2 = 36 \quad | \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow |x - 4| = 6$$

$$\text{Fall 1: } (x - 4) \geq 0 \Rightarrow x - 4 = 6 \quad | +4$$

$$\Leftrightarrow x = 10 \Rightarrow \underline{\underline{x_1 = 10}}$$

$$\text{Fall 2: } (x - 4) < 0 \Rightarrow -(x - 4) = 6 \quad | \cdot (-1)$$

$$\Leftrightarrow x - 4 = -6 \quad | +4$$

$$\Leftrightarrow x = -2 \Rightarrow \underline{\underline{x_2 = -2}}$$

په پورته کې Fall د حالت په معنا دی.

هر مربع مساوات د مربع تکمیلوني له لارې یتا متود په مرسته حل کیدی شي.

د مربع تکمیلوني ته یادونه:

د x ضربونه نیمیري، مربع کیري، جمعه کیري او بېرته منفي کیري.

د لومړي یا دویم بینوم فرمول له لارې بیا مربع جوړیږي.

۷. ۴ - د - q - p فرمول

که مربع مساوات په نورمال بڼه دا د مربع تکمیلیدني تلنلار وکارول شي، نو د - q - p - فرمول ته راځي، د کوم سره چې مربع مساوات نور هم ساده حل کیري.

Oder یا $x^2+px+q=0$

$$\Leftrightarrow x^2+px+q=0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + px + \underbrace{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2}_{1. \text{ binomische Formel}} + q = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$$

$$\Leftrightarrow \left|x + \frac{p}{2}\right| = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{p}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \text{oder} \quad -\left(x_2 + \frac{p}{2}\right) = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{x_1 = -\left(\frac{p}{2}\right) + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}}} \quad \text{oder} \quad \underline{\underline{x_2 = -\left(\frac{p}{2}\right) - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}}}$$

$$\underline{\underline{x_{1/2} = -\left(\frac{p}{2}\right) \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}}}$$

یا په لنډه بڼه لیکو:

دلته د ریښې لاندې $\pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ ځانګړې معنا لري.

دا دیسکریمینانت D بلل کیږي

له دې سره کېدای شي د حل فرمول په لنډ ډول ولیکل شي

$$x_2 = -\left(\frac{p}{2}\right) - \sqrt{D} \quad \text{یا} \quad x_1 = -\left(\frac{p}{2}\right) + \sqrt{D}$$

دوه حلتوکي (عناصر؟)	$D > 0 \Rightarrow L = \{x_1; x_2\}$	که وي
يو حالتوکي (ډبل حل)	$D = 0 \Rightarrow L = \{x\}$	که وي
حلتوکي نه شته	$D < 0 \Rightarrow L = \{ \}$	که وي

د مربع مساوات د حل سره دې لومړۍ ډیسکریمینانتي وټاکل — یا معلومه شي، چې د حلونو ګڼون یا تعداد لاس ته راوړو.

کله کله له دې سره شمېرکار کميږي.

بیلګه:

$$x^2 + 6x + 10 = 0 \Rightarrow p = 6 \quad q = 10$$

$$D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = 3^2 - 10 = 9 - 10 = -1 \Rightarrow$$

له دې لاس ته راځي چې حل نه شته

بیلګه:

په لاندې کې also د ,,يعني,, او يا ,,نو,, په معنا دی

$$\begin{aligned}
 3x^2 - 5x + 2 &= 0 \quad | : 3 \\
 \Leftrightarrow x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{2}{3} &= 0 \quad \Rightarrow p = -\frac{5}{3}; q = \frac{2}{3} \Rightarrow D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q \\
 \text{also } D &= \left(-\frac{5}{6}\right)^2 - \frac{2}{3} = \frac{25}{36} - \frac{2 \cdot 12}{3 \cdot 12} = \frac{25}{36} - \frac{24}{36} = \frac{1}{36} \Rightarrow \sqrt{D} = \sqrt{\frac{1}{36}} = \frac{1}{6} \\
 x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D} &= \frac{5}{6} \pm \frac{1}{6} \quad \left| \begin{aligned} \Rightarrow x_1 &= \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1 \\ \Rightarrow x_2 &= \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

د مربع توابعو صفرخايونه

د دې لپاره چې د يوه مربع تابع صفرخايونه پيدا كړو، تل بايد يو مربع مساوات حل كړو.

كه دا دوه حلتوكي لري، نو مبع تابع د گراف د x - محور په دوه ټكو كې غوڅوي..

كه يو حلتوكی لري، نو دا گراف د x محور په يوه ټكي كې لمسوي (د خپل ككرټكي سره).

كه حل ونه لري، نو گراف د x محور پورته لور ته يا كښته لور ته ځغلي او غوڅتکی نه لري.

د حل كنترول

لكه په هر مساوات كې كېدې شي حل داسې كنترول شي، چې د حلتوكي په سرچينيز مساوات كې ځايه ځای شي، يعنې كنترول وكړي.

په مربع مساواتو كې دا ساده دی، د ویتا د ریښې جملې سره.

د ویتا **Vieta** جمله :

که مربعیز مساوات $x^2 + px + q = 0$ دوه حلونه ولري، نو باور لري:

$$x_1 \cdot x_2 = q \quad \text{او} \quad -x_1 - x_2 = p$$

دد مربع مساوات په نورمال بڼه کې په ساده ډول ایښوونې سره سپری دا ثبوتولی شي.

x_1 او x_2 سره جمعه کړئ

$$x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} + \sqrt{D} + \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{D}\right)$$

$$\Leftrightarrow x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} + \sqrt{D} - \frac{p}{2} - \sqrt{D}$$

$$\Leftrightarrow x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} - \frac{p}{2} = -p$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{p = -x_1 - x_2}}$$

x_1 او x_2 سره ضرب کړئ

$$x_1 \cdot x_2 = \left(-\frac{p}{2} + \sqrt{D}\right) \cdot \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{D}\right)$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 = \left(-\frac{p}{2}\right)^2 + \underbrace{\frac{p}{2} \cdot \sqrt{D} - \frac{p}{2} \cdot \sqrt{D}}_0 - D$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 = \left(-\frac{p}{2}\right)^2 - \left[\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q\right]$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 = \left(-\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{x_1 \cdot x_2 = q}}$$

بیلگه:

غوښتنه یا ثبوت:

مربع مساوات $x^2+x-6=0$ او $x_1 = 2$ او $x_2 = -3$ حلونه لري.

$$p = 1 \text{ او } q = -6$$

ازماينښت

$$-x_1 - x_2 = -2 - (-3) = 1 = p$$

$$x_1 \cdot x_2 = 2 \cdot (-3) = -6 = q$$

برعکس يا په څنډ د وينا د جملې سره کيدی شي چې مربع مساوات جوړ کړو، کوم چې ټاکلي حلونه لري.

بيلگه:

يو څلوريز يا مربع مساوات څنگه بايد وپريښي، چې د هغه حلېږی $L = \{-2; 1\}$ وي؟

$$p = -x_1 - x_2 = -(-2) - 1 = 1$$

$$q = x_1 \cdot x_2 = (-2) \cdot 1 = -2$$

له دې لاس ته راځي، چې $x^2+x-2=0$ اړونده مربع مساوات دی.

پام:

دا فقط يو مربع مساوات دی د دې حلېږی سره.

د دې ټول ډېرځله هم همدا حل لري.

بيلگه: يو مربع مساوات دې څنگه وي، که د هغه حلېږی (حلسټ) $L = \{-2; 1\}$ وي؟

$$p = -x_1 - x_2 = -(-2) - 1 = 1$$

$$q = x_1 \cdot x_2 = (-2) \cdot 1 = -2$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \quad |$$

(له دې لاس ته راځي) د دې اړونده مربع مساوات دی.

یادونه: دا فقط یو مربع مساوات دی، د دې حل سره.

د دې ټول زیاتځله یا هم همدا حلېږي لري.

کرښیز ضریبونه (ځلووني) یا فاکتورونه:

ید بل امکان هم شته، چي مربع مساوات جوړکړای شو.

بېلگه:

$$L = \{x_1 | x_2\} \quad | \quad \text{دې د یو مربع مساوات حل وي،}$$

$$\underbrace{(x - x_1)}_{\text{Faktor 1}} \cdot \underbrace{(x - x_2)}_{\text{Faktor 2}} = 0$$

(ضرب) نو باور لري.

دا د یوه مربع مساوات کرښیزه بڼه ده.

یو شرب ټیک هلته صفر دی، چي لږ تر لږه یو له دې دوه ضریبونو څخه صفر وي.

$\Rightarrow (x - x_1) = 0 \Leftrightarrow x = x_1$ $\Rightarrow (x - x_2) = 0 \Leftrightarrow x = x_2$	ضریب ۱ صفر دی: لاس ته راځي ضریب ۲ صفر دی: لاس ته راځي
---	---

بېلگه: $x_1=3$ یا $x_2=-2$ دې د یوه مربع مساوات حلونه وی.

$$(x-3)(x+2)=0 \quad \text{کرښیزه بڼه بدلون:}$$

$$\text{مربع : } x^2 - x - 6 = 0$$

کرنیز ضریبونه:

یو بل امکان هم شته، چې مربع مساوات جوړ کړو.

بیلگه:

$$L = \{x_1; x_2\} \text{ د یوه مربع مساوات حلېږی وي.}$$

$$\underbrace{(x - x_1)}_{\text{Faktor 1}} \cdot \underbrace{(x - x_2)}_{\text{Faktor 2}} = 0 \quad | \quad \text{نو باور لري: (faktor: ضرب)}$$

دا د یوه مربع مساوات کرنیزه بڼه ده.

یو ضرب ټیک هله صفر دی، که لږ تر لږه یو له دواړو ضریبونو صفر وي.

ضریب ۱ صفر دی:

$$\Rightarrow (x - x_1) = 0 \Leftrightarrow x = x_1$$

ضریب ۲ صفر دی:

$$\Rightarrow (x - x_2) = 0 \Leftrightarrow x = x_2$$

بیلگه: $x_1 = 3$ یا $x_2 = -2$ د یوه مربع مساوات حلونه وي.

$$\text{کرنیزه بڼه: } (x-3)(x+2)=0$$

$$\text{مربع مساوات: } x^2 - x - 6 = 0$$

$$p = -1 \quad q = -6 \Rightarrow D = (-0,5)^2 + 6 = 6,25$$

$$x_1 = 0,5 + \sqrt{6,25} = 3 \quad \text{oder} \quad x_2 = 0,5 - \sqrt{6,25} = -2$$

ټولگه:

$$ax^2 + c = 0 \text{ لومړۍ بڼه:}$$

بڼه بدلون و $x^2 = ?$ ته او د ریښه نیونې له لارې حل

$$ax^2 + bx = 0 \text{ دویم بڼه یا ډول:}$$

د اووښتونې یا ماحولې x له نوکانو اېستلو له لارې حل.

$$x(ax + b) = 0 \text{ او د صفر ضرب جمله و کاروی.}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ دریمه بڼه:}$$

مساوات په نورمال بڼه راوړی

$$x^2 + px + q = 0 \text{ او د } P-q \text{ فرمول سره حل کړی.}$$

$$D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q \quad x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D} \quad \text{د سره}$$

$$D > 0 \text{ لپاره دوه حلونه شتون لري. } L = \{x_1; x_2\}$$

$$D = 0 \text{ لپاره ډبل حل شتون لري } x_1 = x_2 \Rightarrow L = \{x_{1/2}\}$$

$$D < 0 \text{ لپاره حل شتون نه لري. } L = \{ \} = \emptyset$$

د ویتا د ریښې جمله (موخه د مربع مساواتو د حلونو جمله هم کېدی شي):

که مربع مساوات $ax^2 + bx = 0$ دوه حلوه ولري، نو باور لري:

$$x_1 \cdot x_2 = q \quad \text{او} \quad -x_1 - x_2 = p$$

د یوه مربع مساوات کرښیزه بڼه:

$L = \{x_1 \mid x_2\}$ دې د یوه مربع مساوات حل وي.

نو باور لري: $\underbrace{(x - x_1)}_{\text{Faktor 1}} \cdot \underbrace{(x - x_2)}_{\text{Faktor 2}} = 0$ (ضرب)

یا $a(x - x_1)(x - x_2) = 0 \Leftrightarrow L = \{x_1 \mid x_2\}$

پوښتنې:

لاندې مربع مساوات حل کړئ.
د دې لپاره اړونده هغه بڼه تلنلار و کاروئ او د ځای په ځای کولو له لارې یې و ازمایئ.

1. $4x^2 = 1$ 2. $x^2 + 4x = 0$

3. $2x^2 - 16x + 14 = 0$ 4. $(x + 2)^2 = 16$

5. $4x^2 - 16 = 0$ 6. $x^2 - 8x + 7 = 0$

7. $x^2 + \pi x = 0$ 8. $2(x + 3)^2 - 18 = 0$

9. $-x^2 + x = -\frac{1}{2}$ 10. $3x^2 + 12x + 3 = 0$

11. $-x^2 + 8x - 8 = 0$ 12. $4(x - 4)^2 = 32$

$$13. \quad \frac{1}{12}x^2 - x = 0 \quad 14. \quad \frac{1}{4}x^2 + 2x - \frac{2}{5} = 0$$

$$15. \quad \frac{3}{16}x^2 - \frac{3}{4}x = 0 \quad 16. \quad -\frac{3}{4}x^2 + 3x + 9 = 0$$

$$17. \quad \frac{3}{2}x^2 - x - 4 = 0 \quad 18. \quad \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{3}x = 0$$

$$19. \quad 2x^2 - \frac{10}{3}x - \frac{4}{3} = 0 \quad 20. \quad \frac{2}{3}x^2 + 4x = 0$$

بیلکہ ۱:

پہ لاندی کی Probe ازماہنت.

$$8x^2 = 2 \mid : 8 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \mid \sqrt{} \Leftrightarrow |x| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x_{1/2} = \pm \frac{1}{2}$$

$$\text{Probe: } x_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2 \quad x_2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2$$

بیلکہ ۲ :

$$2x^2 + 8x = 0 \Leftrightarrow x(2x + 8) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0 \mid$$

$$2x + 8 = 0 \mid -8 \Leftrightarrow 2x = -8 \mid : 2 \Leftrightarrow x_2 = -4 \quad (\text{د صفر ضرب جملہ})$$

ازماہنت:

$$x_1 = 0 \Rightarrow 2 \cdot 0 + 8 \cdot 0 = 0 \quad x_2 = -4 \Rightarrow$$

$$2 \cdot (-4)^2 + 8 \cdot (-4) = 2 \cdot 16 - 32 = 0$$

بیلکه ۳:

$$4x^2 - 32x + 28 = 0 \mid : 4 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 7 = 0$$

$$\Rightarrow p = -8 \quad q = 7 \quad D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = 16 - 7 = 9 \Rightarrow \sqrt{D} = \sqrt{9} = 3$$

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D} \mid \begin{array}{l} x_1 = 4 + 3 = 7 \\ x_2 = 4 - 3 = 1 \end{array} \quad \text{Probe: } \begin{array}{l} 4 \cdot 49 - 32 \cdot 7 + 28 = 0 \\ 4 \cdot 1 - 32 \cdot 1 + 28 = 0 \end{array}$$

بیلکه ۴:

$$2(x+2)^2 = 32 \mid : 2 \Leftrightarrow (x+2)^2 = 16 \mid \sqrt{} \Leftrightarrow |x+2| = 4$$

$$\Leftrightarrow \begin{array}{l} x+2 = 4 \Leftrightarrow x_1 = 2 \\ x+2 = -4 \Leftrightarrow x_2 = -6 \end{array} \quad \text{Probe: } \begin{array}{l} 2(2+2)^2 = 2 \cdot 16 = 32 \\ 2(-6+2)^2 = 2 \cdot 16 = 32 \end{array}$$

مربع مساوات ته پوښتنې

I خلوريز (مربع) مساوات

لومړۍ –

لاندې مربع مساوات په x پسې حل کړی

$$\frac{5}{4} - \frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{4}x^2 \quad \text{پ.} \quad \frac{4}{5}(x^2 - 3) = 0 \quad \text{ب.} \quad 4 - x^2 = 0 \quad \text{الف.}$$

$$x^2 - \frac{a^2}{2} = 0 \quad \text{ث.} \quad \frac{1}{2}x^2 - 2t^2 = 0 \quad \text{پ.} \quad 3x^2 + 8 = 5 \quad \text{ت.}$$

دویم –

جانان غواړي خپله بډایۍ په دوه کاله کې دوه برابره کړي.

گټه باید څومره وي، که گټه هم ورسره په گټه وي.

درېم –

200 باکتریاگانې په دوه ساعته کې 450 باکتریاو ته زیاتوي.

دا باکتریاوې په ساعت کې څو په سلو یعنې % کې زیاتیږي.
څلورم –

د یوه مربع دوه کونجترې یا قطر 8 cm اوږد دی..

د مربع اړخ څومره اوږد دی؟

پنځم –

یو ولاړکوډیز یا مستطیل $60,75 \text{ m}^2$ سطحه لري.

د اړخونو اوږدوالی وټاکي، که

الف – یو اړخ درېواړه دومره اوږد وي لکه دا بل.

ب – اړخونه یې په 3 m یو له بل توپیر لري.
شپږم –

دوه گڼونه په 4 یو له بل توپیر لري. د دواړو عددونو ضرب 480 دی.

دواړه اعداد وټاکي. اوم –

دوه گڼونه وټاکي، چې زیاتون یا جمع یې 4,1 او ضرب یې 4 وي.
اتم –

t په واکوالي کې حلونو گڼون یا تعداد او ځای وټاکي

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t\right)x^2 + 2t = 0; t > 1$$

الف- $tx^2 + 1 = 0; t \neq 0$ ب- $x^2 + t - 2 = 0$ پ- $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t\right)x^2 + 2t = 0; t > 1$
نهم-

مربع مساوات په x پسې حل کړی.

الف- $2x^2 + 2x - 24 = 0$ ب- $-3x^2 - 5x + 8 = 0$ پ- $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 8 = 0$
 ت- $3 - 2x + \frac{1}{3}x^2 = 0$ ټ- $x(x+t) = 1$ ټ- $-x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{5}{4} = 0$
 ج- $(x+2)^2 - 2 = 0$ چ- $-x^2 + 4ax - 4a^2 = 0$ ح- $2tx^2 + tx - t = 0 ; t \neq 0$
 خ- $x^2 - 2tx + 6t = 3x$ ځ- $x^2 - 4tx + 3t^2 = 0$ ځ- $\frac{1}{4t}x^2 - t = 0 ; t \neq 0$
 لسم —

ډیسکریمینانتي Diskriminante وټاکي

الف- $ax^2 + ax - 2 = 0 ; a \neq 0$ ب- $(a+1)x^2 - x + a = 0 ; a \neq -1$
 پ- $\frac{a^2}{2}x^2 - 4x = x^2 - ax + 1 ; a \neq 0$ ت- $(ax)^2 - \sqrt{a} \cdot x + \frac{2}{a} = 0 ; a > 0$
 یولسم —

وښایی، چې برابر و $x^2 + ax - 1 = 0$ د هر $a \in \mathbb{R}$ لپاره دوه حلونه لري.
 دولسم —

د a په واکوالي کې د مساواتو حلونه وښایی یا وټاکي.

الف- $-ax^2 + 2ax - a + 1 = 0 ; a > 0$ ب- $x^2 - 2ax - 6a = -3x$ پ- $x^2 - ax + a = x$
 ت- $-ax^2 + 2a^2x + 3a^3 = 0$ ټ- $ax^2 + 2x - 3 = 0$ ټ- $-x^2 + 1,5ax - 0,5a^2 = 0$
 ج- $2x^2 + x - 3a = 0$ چ- $-\frac{1}{a}(x^2 - 5x) = 0 ; a \neq 0$ ح- $\frac{x^2}{3} - \frac{2}{3}ax - a^2 = 0$
 دیارلسم —

وښایی چې $L = \{1 + \sqrt{2-3t} ; 1 - \sqrt{2-3t}\}$ د ټول $t \leq \frac{2}{3}$ لپاره

$$x^2 - 2x + 3t - 1 = 0.$$

د حلونه دي.

څوارلسم –

و بنایي چې t د کومو ارزښتونو لپاره $x = t$ د $x^2 - 5x + t = 0$ حل دی. پنځلسم –

و بنایي: $x^2 - 2x - t^2 = 0$ د ټولو $t \in \mathbb{R}$ لپاره دوه حلونه لري.

پوښتنې

مربع مساوات II

لومړۍ: مربع مساوات x پسي حل کړئ.

$$\frac{3}{2}x = \frac{1}{2}x^2 \quad \text{الف.} \quad 8x^2 + 3x = 0 \quad \text{ب.} \quad x^2 - x = 0 \quad \text{پ.} \quad -\frac{3}{2}x = \frac{1}{2}x^2$$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} = 0 \quad \text{ت.} \quad -\frac{1}{5}x - \frac{1}{2}x^2 = 0 \quad \text{تب.} \quad \frac{4}{5}(x^2 - 4x) = 0 \quad \text{ث.} \quad \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} = 0$$

$$\frac{t}{2}x - tx^2 = 0; t \neq 0 \quad \text{ح.} \quad \frac{x^2}{t} - tx = 0; t \neq 0 \quad \text{چ.} \quad -\frac{1}{8}x^2 + 2tx = 0 \quad \text{ج.}$$

دویم: a په واکوالي کې د حلونو تعداد یا ګڼون وټاکئ.

$$x^2 - 2x = (2 - a)x^2 \quad \text{ب.} \quad ax^2 - 6x = 0 \quad \text{الف.}$$

دریم: مساوات $4x^2 = 12x$ دې ورکړ شوی وي. سپینګل دواړه اړخونه د x سره ویشي او لاس ته د حل په څیر $x = 3$ راوړو. په دې هکله مو موقف څرګند کړئ.

مربع مساوات ته پوښتنې

مربع مساوات III

لومړۍ: لاندې مربع مساوات د ټوټه ونې (تجزیې) له لارې حل کړئ.

الف- $x^2 + 8x + 16 = 0$ ب- $x^2 + 5x - 24 = 0$ پ- $-2x^2 + 4x + 30 = 0$

دویم:

الف- $(x+4)(x-5) = 0$ ب- $(2x+7)(4x-1) = 0$ پ- $(x+t)(x-2t) = 0$

ت- $0,5x^2 - 3x + 4 = 0$ ټ- $-0,5x^2 - x + 1,5 = 0$ ټ- $\frac{1}{3a}(2x - x^2) = 0; a \neq 0$

مربع - یا څلوریز مساوات IV

لومړۍ: بې له فرمول څخه یې حل کړئ.

الف- $(x-5)^2 = 49$ ب- $(3x+4)^2 = 1$ پ- $9 - (2x+5)^2 = 0$

ت- $\frac{3}{4}(x-2)^2 = 12$ ټ- $\frac{1}{12}x^2 = x$ ټ- $\frac{4x}{t^2}(2t+x) = 0; t \neq 0$

ج - $2tx - (t-1)x^2 = 0; t \neq 1$ - چ - $1,5(x - 0,5a)^2 = 0$ - ح - $(x-1)^2 - t = 0; t > 0$

دویم: لاندې برابر ونونه یا مساوات حل کړئ

الف - $-2x(x-5) = 0$ - ب - $-\frac{1}{2}(2x-1)(x-5) = 0$ - پ - $1 - \frac{1}{(1-x)^2} = 0$ دریم: د a

د کومو ارزښتونو لپاره مساوات $(x+2)(x-a)=0$ ټیک یو حل لري؟

څلورم: د جشمیري سره د ټیک دوه لسمیزو سره حلېږئ وشمیرئ.

الف - $436x^2 + 18x - 12 = 0$ - ب - $x^2 + 6x - 1024 = 0$ - پ - $x^2 + 92x - 9876 = 0$

ت - $119,6\pi + 9,6\pi x - 2\pi x^2 = 0$ - ټ - $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}x - 1 = 0$ - ټ -

$0,025x^2 + 2x - 0,254 = 0$

پنځم: وښایئ: $(a+b)^{-1} = a^{-1} + b^{-1}$ د ټول $a, b \neq 0$ لپاره یو ناتییک حل

لري.

مربع مساوات v

لومړی: لاندې مربع مساوات حل کړئ

الف - $\frac{x^2}{a} - e^{-2} = 0$ - ب - $\frac{x}{3} - x^2 = 0$ - پ - $73 - 52s + 14s^2 = 25$

ت - $\frac{1}{4}x^2 + 65x - 3600 = 0$ - ټ - $2a^2 + 7a + 3 = 0$ - ټ -

$8,5x = \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{2}x + 200$

دویم: مساوات $2x + \frac{2}{x} = 5$ ورکړ شوي دي.

الف- تعریفور شو او حلډبرئ یې وټاکئ.

د مساوت په بني لور د 5 په ځای کوم عدد باید ځای ونیسي، له کومې سره چې دا ناغیره مساوات حل $2^{1/2}$ ولري؟

دریم: د پارامتر د کومې ټاکنې لپاره مساوات ټیک یو حل لري؟

$$\text{الف- } 3x^2 + ax - a = 0 \quad \text{ب- } ax^2 + \frac{a}{2}x - 1 = 0 \quad \text{پ- } -\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(a-x)^2} = 0$$

څلورم: یو مربع مساوات وټاکئ.

الف- د حل $L = \{-5; 3\}$ سره، ب- له حل $L = \{-2, 5\}$ سره. پ- چټ کوم حل ونه لري. ت- چې د $x^2 - 5x - 24 = 0$ د حل سره برابر حل ولري.

پنځم: د ارزښت(مطلق) مساوات حل کړئ.

$$\text{الف- } |(x+2)^2| = 2 \quad \text{ب- } |x^2 - x + 3| = 1 \quad \text{پ- } |x+1| = x^2$$

شپږم: د ولاړکودیز یا مستطیل د اړخونو اوږدوالی وټاکئ، که دا ولاړکودیز

الف- یو چاپیریال د $U = 38 \text{ m}$ او یو مساحت د $A = 88 \text{ m}^2$ ولري.

ب- یو مساحت د $A = 16 \text{ m}^2$ ولري او د سور اوږدوالی یې $4/3$ وي.

اوم: وښایئ: که د دوه حقیقي عددونو کمښت یا تفریق د ضرب په څلور ځله زیات شي، نو سړی د دواړو حقیقي عددونو مربع زیاتون یا جمعه لاس ته راوړي.

اتم: د یوه دیوال په اوږدوالي یو ولاړکودیز پټي د $A = 800 \text{ m}^2$ سطحې سره د یوه ټول 100 m متره سیم سره رابندیږي. د اړخونو اوږدوالي څنګه ټاکل کیږي؟ کوم ماکسیمال یا خورا لویه سطحه له دې سره رابندیږي؟

نهم: د x د جوړښت ټوټو قیمت $K(x)$ دی. یو جوړښت ټوټه یا برخه په $E(x)$ پلورل کیږي. څومره جوړښت ټوټې باید تولید شي، چې د 200 € یوه ګټه لاس ته راوړل شي؟

$$K(x) = x^2 + 100x + 80 \quad (\text{د ارزښت تابع يا فنکشن})$$

$$E(x) = 160 - 2x \quad (\text{د خرڅلاو تابع})$$

لسم: يوه فابريکه مواد توليدوي، چې ارزښت يې په هره دانه € 65 دی. د x توليدولو دانو ټول قيمت يا لگښت $E(x)$ دی. کوم تعداد دا داني بايد توليد شي، چې ګټه ترې لاس ته راشي؟ د څومره تعداد دانو سره يوه ګټه د € 1500 لاس ته راځي.


$$K(x) = \frac{1}{5}x^2 + 20x + 1000 \quad (\text{لگښت فنکشن})$$

يولسم: يو شی G د عدسي له لارې، چې د سوزونټکي اوږدوالی يې $f = 0,2 \text{ m}$ دی په يو اوپټيکي څيره B باندې پريوځي يا څيره کيږي. د شي او څيري ترمنځ واټن يې 1 m دی.

الف- دا شی G او همداسي څيره B يې د عدسي څخه څومره لرې دي؟

ب — عدسه بايد ماکسيمال څومره د سوزونټکي واټن ولري؟

په لاندې څيره کې: Linsengleichung د عدسي مساوات.



۸ - ماتېر اېرون يا د کسرونو مساوات

۸. ۱ - د ماتیرابرونونو حلونه یا اوبیونه

کسر مساوات — لکه کرینیز مساوات — د ورته بڼه بدلون له لارې حل کیدی شي. مگر مخ ته له دې دې تعریف-یا پیژندور شو وټاکل شي. بنسټېږئ IR ده، که بل څه نه وي ورکړ شوي. نو تعریفېږئ اووښتون ارزښتونه یا د متحولو ارزښتونه خوندي لري، د کومو لپاره چې مساوات باوري وي. د تعریفوړ شو لپاره دې تر څیرنې لاندې ونيول شي، چې ماتلاندې یا مخرج د کومو ارزښتونو لپاره صفر کیږي. ټیک دا ارزښتونه تعریف وړشو پورې اړه نه لري.

بیلگه:

$$\frac{4+x}{x-2} = 6 \quad \text{له دې لاس ته راځي: } D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

ځکه چې ویش په صفر اجازه نه لري.

$$\begin{aligned} \frac{4+x}{x-2} &= 6 && | \cdot (x-2) \\ \Leftrightarrow 4+x &= 6 \cdot (x-2) \\ \Leftrightarrow 4+x &= 6x-12 && | -6x \\ \Leftrightarrow 4-5x &= -12 && | -4 \\ \Leftrightarrow -5x &= -16 && | : (-5) \\ \Leftrightarrow x &= \frac{16}{5} && \text{da } x \in D \Rightarrow L = \underline{\underline{\left\{ \frac{16}{5} \right\}}} \end{aligned}$$

بیلگه:

$$\frac{5}{x+3} + \frac{1}{x-1} = 0 \quad D = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$$

ځکه چې د $x=-3$ لپاره لومړی مخرج د $x=1$ لپاره، دویم مخرج صفر کیږي.

اسلي ماها لاندې یا — مخرج: $(x+3)(x-1)$

$$\begin{aligned}
& \frac{5(x-1)}{(x+3)(x-1)} + \frac{1(x+3)}{(x+3)(x-1)} = 0 \quad | \cdot (x+3)(x-1) \\
& \Leftrightarrow 5(x-1) + (x+3) = 0 \\
& \Leftrightarrow 5x - 5 + x + 3 = 0 \\
& \Leftrightarrow 6x - 2 = 0 \quad | + 2 \\
& \Leftrightarrow 6x = 2 \quad | : 6 \\
& \Leftrightarrow x = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{da } x \in D \Rightarrow L = \left\{ \frac{1}{3} \right\}
\end{aligned}$$

بیلگه:

Hauptnenner د اصلي ماتلاندې يا مخرج په معنا

$$\begin{aligned}
& \frac{x}{x+1} + \frac{4}{x-1} = \frac{x}{x-1} \quad D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\} \quad \text{Hauptnenner: } (x+1)(x-1) \\
& \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} + \frac{4(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} \quad | \cdot (x-1)(x+1) \\
& \Leftrightarrow x^2 - x + 4x + 4 = x^2 + x \\
& \Leftrightarrow 3x + 4 = x \quad -x \\
& \Leftrightarrow 2x + 4 = 0 \quad | - 4 \\
& \Leftrightarrow 2x = -4 \quad | : 2 \\
& \Leftrightarrow x = -2 \quad \text{da } x \in D \Rightarrow L = \{-2\}
\end{aligned}$$

وروسته له دې چې په دواړو لورو يا خواوو مساوات په اصلي مخرج راپړل شو يا واپړول شو، پای ضرب مو د اصلي مخرج سره دې ته بيايي، چې نور کسرونه نور شتون نه لري.

بیلگه:

$$\begin{aligned}
\frac{a-x}{b-x} - \frac{a-b}{a+b} &= 0 \quad D = \mathbb{R} \setminus \{x=b\}; a+b \neq 0 \quad \text{Hauptnenner: } (b-x)(a+b) \\
\frac{(a-x)(a+b)}{(b-x)(a+b)} - \frac{(a-b)(b-x)}{(a+b)(b-x)} &= 0 \quad | \cdot (b-x)(a+b) \\
\Leftrightarrow (a-x)(a+b) - (a-b)(b-x) &= 0 \\
\Leftrightarrow a^2 + ab - ax - bx - [ab - ax - b^2 + bx] &= 0 \\
\Leftrightarrow a^2 + \cancel{ab} - \cancel{ax} - bx - \cancel{ab} + \cancel{ax} + b^2 - bx &= 0 \\
\Leftrightarrow a^2 - 2bx + b^2 &= 0 \quad | -a^2 - b^2 \\
\Leftrightarrow -2bx &= -a^2 - b^2 \quad | : (-2b) \\
\Leftrightarrow x &= \frac{a^2 + b^2}{2b} \Rightarrow L = \left\{ \frac{a^2 + b^2}{2b} \right\}; b \neq 0
\end{aligned}$$

دا چي بنی لور فقط له صفر ارزښتونو جوړه ده، نو کینه لور په اصلي مخرج راوړل کيږي. دآله مخرج سره ضرب مو دلته هم دي ته لارښودوي، چي نور کسرونه شتون نه لري. مگر په پام کي دي ونيول شي، چي ماتکرښه په نوکانو کي نیول کيږي. که د کسرکړښي يا ماتکرښي مخ ته کمیزه يا منفي مخنځښه شتون ولري، نو د کسر له منځه تلني وروسته دي اړونده صورت يا ماتباندې په يوه منفي نوک کي کيښوی شي.

د په څنې- يا معکوس ارزښت جوړولو سره چلول:

په لاندي کي: Kehrwertbildung معکوس ارزښت جوړونه، HN اصلي مخرج.

$$\begin{aligned}
\frac{2}{x+1} &= \frac{4}{x-2} \quad | \text{Kehrwertbildung } D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\} \\
\Rightarrow \frac{x+1}{2} &= \frac{x-2}{4} \quad \text{HN} = 4 \\
\Rightarrow \frac{2x+2}{4} &= \frac{x-2}{4} \quad | \cdot 4 \\
\Rightarrow 2x+2 &= x-2 \Leftrightarrow x = -4 \Rightarrow L = \{-4\} \in D
\end{aligned}$$

په ځنو حالتونو کيږي شي
شميرنه د د په څنې - يا
معکوس ارزښت جوړوني له
لاري ساده کړای شي.

دا په ځانگړي توگه هلته باور
لري، چي د مسرونو صورت
فقط له عددونو جوړ وي.

د ضرب سره چلول د اټیران (صلیب) له لارې:

شمیرنه کیدی شي

Multiplikation über Kreuz

چلیپا یا اټیران ضرب له لارې هم
لنډه شي.

$$\frac{4}{x+2} = \frac{3}{5x-4} \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \left\{-2; \frac{4}{5}\right\}$$

$$\frac{4}{x+2} = \frac{3}{5x-4} \quad | \text{Multiplikation über Kreuz}$$

$$\Leftrightarrow 4(5x-4) = 3(x+2)$$

$$\Leftrightarrow 20x - 16 = 3x + 6 \quad | -3x + 16$$

$$\Leftrightarrow 17x = 22 \quad | :17 \Leftrightarrow x = \frac{22}{17}$$

$$\Rightarrow L = \left\{\frac{22}{17}\right\}$$

دلته د لومړي مات یا کسر

مخرج (ماتلاندې) د دویم کسر له

صورت سره ضربیږي او د دویم

مخرج د لومړي کسر له صورت

سره ضربیږي.

مګر دا ټیک هلته شونې دی، چې

کسر مساوات دا ترڅنګ بڼه

ولري.

د اټیرا – یا چلیپا ضرب د باوریوالي لپاره ساده بڼونه:

$$\frac{2}{x+1} = \frac{4}{x-2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = \frac{x-2}{4} \quad \text{غوښتنه یا ثبوت:}$$

بڼونه د یوه ساده ورته بڼې بدلون له لارې سرته رسوو.

$$\frac{2}{x+1} = \frac{4}{x-2} \quad | \cdot (x+1) \Leftrightarrow 2 = \frac{4(x+1)}{x-2} \quad | \cdot (x-2)$$

$$\Leftrightarrow 2(x-2) = 4(x+1) \quad | :8 \Leftrightarrow \frac{1}{4}(x-2) = \frac{1}{2}(x+1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-2}{4} = \frac{x+1}{2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = \frac{x-2}{4} \quad \text{q.e.d (was zu beweisen war)}$$

q.e.d (was zu beweisen war) څه چې د بڼولو وو

بیلګه:

په لاندې کې: Definitionsmenge تعریفوړشو یا-ست،

Kehrwertbildung د معکوس ارزښت جوړونه.

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{2}{x-2} = 0 &\Rightarrow \text{Definitionsmenge: } D = \mathbb{R} \setminus \{0; 2\} \\ \frac{1}{x} + \frac{2}{x-2} = 0 &| -\frac{2}{x-2} \Leftrightarrow \frac{1}{x} = -\frac{2}{x-2} \quad | \text{ Kehrwertbildung} \\ \Leftrightarrow x = -\frac{x-2}{2} &| \cdot 2 \Leftrightarrow 2x = -(x-2) \Leftrightarrow 2x = -x+2 \quad | +x \\ \Leftrightarrow 3x = 2 &| : 3 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3} \quad \text{da } x \in D \Rightarrow L = \underline{\underline{\left\{ \frac{2}{3} \right\}}} \end{aligned}$$

$$\frac{x^2 + 4x + 3}{x + 3} = x - 2 \Rightarrow \text{Definitionsmenge: } D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$$

Hauptnenner: $x + 3$

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + 4x + 3}{x + 3} &= \frac{(x-2)(x+3)}{x+3} \quad | \cdot (x+3) \\ \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 &= x^2 + 3x - 2x - 6 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 3 = x^2 + x - 6 \quad | -x^2 \\ \Leftrightarrow 4x + 3 &= x - 6 \quad | -x \Leftrightarrow 3x + 3 = -6 \quad | -3 \\ \Leftrightarrow 3x &= -9 \quad | : 3 \Leftrightarrow x = -3 \quad \text{da } x \notin D \Rightarrow L = \underline{\underline{\{ \}}} \end{aligned}$$

بیلګه:

دا بیلګه په ګوته کوي، چې د تعریفوړشو ټاکل څومره غوره دي. ورته بڼه بدلون مو په رښتیا یوې نتیجې ته بیایي، مګر وتونمسوات د دې ارزښت لپاره تعریف نه دی.

بیلګه:

Trick چلول ته وایي

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{x^2 - 1} - \frac{x - 1}{x + 1} &= \frac{1 - 2x}{1 - x^2} \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\} \\ \text{Trick: } \frac{1 - 2x}{1 - x^2} &= -\frac{1 - 2x}{x^2 - 1} = \frac{2x - 1}{x^2 - 1} \end{aligned}$$

له دې سره اصلي مخرج $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$ دی. د بېنوم درېیمې جملې په بنسټ.

$$\Leftrightarrow \frac{x^2}{x^2-1} - \frac{(x-1)\underbrace{(x-1)}_{x^2-1}}{(x+1)\underbrace{(x-1)}_{x^2-1}} = \frac{2x-1}{x^2-1} \mid \cdot (x^2-1)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - \underbrace{(x-1)(x-1)}_{2. \text{ binomische Formel}} = 2x-1 \Leftrightarrow x^2 - (x^2 - 2x + 1) = 2x-1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x^2 + 2x - 1 = 2x - 1 \Leftrightarrow 2x - 1 = 2x - 1$$

دا مساوات د هر $x \in \mathbb{D}$ لپاره پوره دی: له دې لاس ته راځي: $L = \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$

دا مساوات ناپای زیات حلونه لري، ځکه چې مساوات شرایط د تعریفورشو د هر x لپاره پوره دي.

ماتمسواتو (کسر مساواتو) ته پوښتنې

ماتمسوات |

لومړۍ: تعریفورشو وټاکئ او مساوات حل کړئ.

الف- $\frac{2}{x} + 3 = \frac{5}{2}$ ب- $\frac{2}{3x-4} - \frac{1}{20} = \frac{5}{6x-8}$ پ- $\frac{2}{x-1} - \frac{4}{x+1} = \frac{1}{x-1}$

ت- $\frac{2+x}{x-1} = \frac{3+2x}{x+1} - 1$ ټ- $\frac{x^2+4x+3}{x+3} = x-2$ ټ- $\frac{-3x+6}{2x-4} + \frac{x}{x-2} = -\frac{7}{6}$

ج- $\frac{4}{x-1} + \frac{1}{5} = \frac{3}{1-x} + \frac{8}{5}$ چ- $x + \frac{2x}{x-1} = 0$ ح- $\frac{32}{8x+16} = \frac{5x}{2x+4}$

خ- $\frac{x^2}{x^2-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{1-2x}{1-x^2}$ ځ- $\frac{5x-5}{x+1} + 2 = \frac{6x-3}{2x-1} + 4$ ځ- $\frac{x}{x-2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2x-4}$

د- $\frac{3-x}{x+1} - 4 = 0$ ډ- $\frac{1}{x} + \frac{2}{x-2} = 0$ ډ- $3u^2 + 6u = \frac{4}{3} + \frac{8}{3u}$

دویم: ایا غوښتنه ټیک ده؟

$$\frac{2x^2 + 4x - 30}{2x - 6} = x + 5 \quad \text{د ټول } x \in \mathbb{R} \text{ لپاره}$$

دریم: تعریفوړشو وټاکئ او ساواتت حل کړئ.

$$\text{الف -} \quad 2x + (4 - 2u) \frac{u+3}{u-1} = -2u + 6 \quad \text{ب -} \quad ux + (u+3) \frac{u}{u-3} = -u$$

څلورم: وښایئ:

$$(a+1)^{-1} = a^{-1} + 1; a \in D \quad \text{حل نه لري.}$$

پنځم: مساواتسیستم حل کړئ:

$$\text{I: } \frac{3}{x-23} = \frac{-2}{y+2} \quad \text{II: } \frac{x-4}{y+2} = \frac{x-2}{y+5}$$

شپږم: یوه لاری 405 m^3 بار زخیره ځای ته په x تلمو وړي. یوه ستره لاری د دې لپاره ۹ کمو تلمو ته اړتیا لري. دواړه لاری د دې بار لپاره په ګډه ۲۰ تلمو ته اړتیا لري. هره لاری ځانله څومره تلمو ته اړتیا لري او هره یوه د څومره د بارولو توان لري؟

اوم: کوم طبیعي عدد(عددونه) کیدی شي د صورت ته ورزیات کړي او په همدې وخت کې د مخرج څخه کم کړي، چې ۲- ترې لاس ته راوړي؟

$$\text{اتم: مساوات} \quad \frac{6-2x}{x^2-9} = \frac{3}{2} \quad \text{ورکړشوي دي.}$$

الف- تعریف ورشو او حلورشو یا حلېږئ یې وټاکئ.

ب- د $3/2$ په ځای بل عدد داسې ولیکئ، چې پرته له دې دا بې تغیره یا تغیر نه خورونکی مساوات $x = -1$ حل ولري.

د کسر مساواتو د تعریفوړشو لپاره بیلګه:

بیلگه ۱:

$$\frac{2}{x} + 7 = 3 : \text{ له دې لاس ته راځي } D = \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ تعريف ورشو:}$$

د کسر مساوات د متحولي ټولو ارزښتونو لپاره باور لري، پرته له صفر.

بیلگه ۲ :

$$\frac{3}{x-7} = 2 \text{ له دې لاس ته راځي تعريف ورشو: } D = \mathbb{R} \setminus \{7\}, \text{ ځکه چې}$$

$$x-7=0 \Leftrightarrow x=7$$

د کسر مساوات باور لري د ټولو متحولو x ارزښتونو لپاره پرته له ۷. ځکه چې د $x = 7$ لپاره مخرج صفر کیږي.

بیلگه ۳:

$$\frac{4}{x+2} + \frac{3}{5x-4} = 1 \text{ له دې لاس ته راځي: } D = \mathbb{R} \setminus \left\{-2; \frac{4}{5}\right\}$$

$$\text{ځکه چې } x+2=0 \Leftrightarrow x=-2 \text{ او } 5x-4=0 \mid +4 \Leftrightarrow 5x=4 \mid :5 \Leftrightarrow x=\frac{4}{5}$$

په لومړي کسر کې مخرج د $x=-2$ لپاره صفر کیږي.

په دویم کسر یا مات کې د $x=4/5$ لپاره مخرج یا ماتلاندې صفر کیږي.

په صلیب یا اټیران باندې د ضرب له لارې چلول :

$$\frac{4}{x+2} = \frac{3}{5x-4} \mid$$

د اټیران یا چلیپا یا صلیب له لارې ضرب

$$: \Leftrightarrow 4(5x-4) = 3(x+2)$$

$$\Leftrightarrow 20x - 16 = 3x + 6 \mid -3x + 16 \Leftrightarrow 17x = 22 \mid 17 \Leftrightarrow x = \frac{22}{17} \Rightarrow L = \underline{\underline{\left\{ \frac{22}{17} \right\}}}$$

پوښتنې

کسر نابرابرونونه

کسر نامساوات |

لومړۍ: تعریفېږئ وټاکئ او نامساوات حل کړئ

الف- $\frac{3-x}{x-2} > \frac{x+4}{2(x-2)}$ - پ $\frac{1}{2x} > \frac{1}{3x} - 2$ - ب $\frac{3}{x+4} < 0$

ت - $4 - \frac{3+2x}{1-x} \geq 0$ - ب $\frac{x-2}{x-5} \geq 0$ - ث $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} \leq 0$

ج - $\frac{x}{x-1} < 1$ - چ $\frac{3-2x}{5x+2} \leq 1$ - ح $\frac{x-2}{x^2} \geq 0$

دویم: کوم طبیعي عدد(اعداد) د $2/5$ صورت ته ورزیات کړي او په همدې وخت کې له
مخرج څخه کم کړي، چې د کسر ارزښت له څلورو لوی وي؟

دریم: وښایئ: د $ux^3 - (4u+1)x^2 = 0$ حل د $u > 0$ لپاره په انټروال $\left[\frac{1}{2}; 2 \right]$
کې نه دی پروت.

څلورم: وښایئ:

$$\frac{-1-8u}{-2u} > 4 \quad d \cdot u > 0 \text{ لپاره باور لري:}$$

نامساوات په ورته توګه لکه مساوات د ورته بڼه بدلون له لارې حل کېږي. د لته دې په پام کې وي، چې د کمیز ګڼ يا عدد سره د ضرب له لارې يا د وېش له لارې اړیک نڅېنه بدلیږي يا معکوسه کېږي. که چېرې یو نامساوات د یو عدد سره ضربېږي، نو باید د حالت توپیر وشي. لومړی حالت، که د اووښتوني يا متحولي ارزښت زیاتیز وي، دویم حالت که د متحولي ارزښت کمیز وي.

بیلګه: په لاندې کې Fall د حالت په معنا دی.

$$-x + 2 > 1 \mid -2 \Leftrightarrow -x > -1 \mid \cdot (-1) \Leftrightarrow x < 1$$

$$\frac{1}{x} < 4 \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Fall I: $x > 0$

$$\frac{1}{x} < 4 \mid \cdot x \Leftrightarrow 1 < 4x \mid : 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} < x \Leftrightarrow x > \frac{1}{4}$$

Fall II: $x < 0$

$$\frac{1}{x} < 4 \mid \cdot x \Leftrightarrow 1 > 4x \mid : 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} > x \Leftrightarrow x < \frac{1}{4} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L = \left\{ x \mid x < 0 \text{ oder } x > \frac{1}{4} \right\}$$

له شرایطو

$$x > 0 \text{ und } x > \frac{1}{4} \Rightarrow x > \frac{1}{4}$$

له شرایطو


$$x < 0 \text{ und } x < \frac{1}{4} \Rightarrow x < 0$$

په پورته کې und د او په معنا دی.

د مربع توابعو د محورونو غوڅتکي

د محورونو غوڅتکي

	په څنگ څېره کې د گراف کتلو کې یوڅو ټکي په ځانگړې توگه پام ته راځي د y-محور سره
--	---



څيرنبيلگه:

د څيرنبيلگي په توگه دا $f(x) = x^2 - 6x + 5$ تابع په چوپړکي لرو.

د y -محور سره غوځټکي

گراف د y -محور په P_y ټکي کي غوځوي.

د هر ټکي لپاره، چې د y محور باندې پروت دی، د x کواوردینات صفر دی.

د P_y لپاره شرطونه: $f(0)$

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 \Rightarrow f(0) = 0^2 - 6 \cdot 0 + 5 = 5 \Rightarrow \underline{\underline{P_y(0 | 5)}}$$

په دې حالت کي به توانيدلي وي، چې د y -کواوردینات سيده د تابع مساوات څخه ولولو.

بيلگه:

$$f(x) = (x-3)^3 - 4 \quad (\text{ککرتکی یا د راس تکی}) S(3;4)$$

$$P_y(0|y_y) \Rightarrow y_s = f(0) = (0-3)^2 - 4 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow \underline{\underline{P_y(0|5)}}$$

د x محور سره غوڅتکی

گراف د x محور د P_{x1} او P_{x2} په ټکو کې غوڅوي.

د هر ټکي لپاره، چې د x په محور پروت دی، د y کواوردینات صفر دی.

د لپاره شرایط:

داسې $f(x) = (x-3)^3 - 4 = 0$ ایښونه مو مربع مساوات $(x-3)^3 - 4 = 0$ ته بیايي:

د مربع تکمیلیدوله لارې حل یا ښوونه:

$$x^2 - 6x + 3^2 - 3^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 - 9 + 5 = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-3)^2 = 4 \mid \sqrt{} \Leftrightarrow |x-3| = \sqrt{4}$$

$$\Leftrightarrow x-3 = \pm\sqrt{4}$$

$$\Rightarrow x_1 = \sqrt{4} + 3 = 2 + 3 = 5 \quad \vee \quad x_2 = -\sqrt{4} + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$\underline{\underline{P_{x1}(5|0) ; P_{x2}(1|0)}}$$

تمرینونه :

د مربع تکمیلیدنو له لارې د صفرخای ټاکنه د یوه پارابول (2-مه درجه ټول راشنل تابع) د تابع مساوات ورکړل شوي دي. د لاندې پارابول لپاره صفرخایونه او د محورونو غوڅتکي وټاکي. د ککرتکي په مرسته گراف وکاري.

اول - $f(x) = x^2 + 4x - 5 \quad S(-2 | -9)$ دویم - $f(x) = -x^2 - x + 6 \quad S\left(-\frac{1}{2} | \frac{25}{4}\right)$

دریم - $f(x) = -x^2 - 4x - 4 \quad S(-2 | 0)$

څلورم - $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 6 \quad S\left(-\frac{1}{2} | -\frac{49}{8}\right)$

پنځم - $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 5 \quad S(4 | -3)$ شپږم - $f(x) = x^2 - 4x + 5 \quad S(2 | 1)$

اوم - $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + x - 1 \quad S(-2 | -2)$ اتم - $f(x) = 4x^2 + x - 5 \quad S\left(-\frac{1}{8} | -\frac{81}{16}\right)$

نهم - $f(x) = -4x^2 - x + 5 \quad S\left(-\frac{1}{8} | \frac{81}{16}\right)$ لسم - $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 2 \quad S\left(1 | -\frac{7}{3}\right)$

ارزښت (مطلقه ارزښت)

يادونه:

يو کس 120 € گټي، موږ هم وايو چې هغه د 120 € ارزښت گټي. يو کس د 120 € جزا پاته تر ګوتو کوي، موږ وايو هغه بايد د 120 € د پيسو جزا ورکړي. په دواړو حالتونو کې مطلب يا موخه 120 € دي.

د اقتصادي تخنيک له مخې ګټه د مثبت (زياتيز) او جريمه د منفي (کميز) په معنای.

د يوه عدد ارزښت يا مطلقه ارزښت د شمير پوهنې له مخې تل مثبت دی.

د دې لپاره چې د يوې متحولي ارزښت وشميرلی شو، نو يو د شميرلو قانون ته اړ يو.

د شميرلو قانون:	که $x \geq 0$ وي.
$ x = \begin{cases} x \\ -x \end{cases}$	که $x < 0$ وي.

بيلګه:

د مطلقه ارزښت مساوات $|x + 2| = \sqrt{3}$ دې حل کړای شي. د شميرني قانون:

$ x+2 = \begin{cases} x+2 \\ -(x+2) \end{cases}$	که $x+2 \geq 0$ وي که $x+2 < 0$ وي
---	---------------------------------------

دا مو د حالت توپیر ته بیایي:

لومړۍ حالت: که $x+2 \geq 0$ وي، نو لاس ته راځي

$$x+2 = \sqrt{3} \Leftrightarrow x_1 = -2 + \sqrt{3}$$


دویم حالت: که $x+2 < 0$ وي، نو لاس ته راځي

$$-(x+2) = \sqrt{3} \Leftrightarrow x+2 = -\sqrt{3} \Leftrightarrow x_2 = -2 - \sqrt{3}$$

حل په لنډه بڼه:

$$|x+2| = \sqrt{3} \Rightarrow x+2 = \pm\sqrt{3}$$

د نورو څیړنو لپاره د بیلگې گراف کارو:



د تعریف او ارزښت سټ (ډېری)

زیات وخت د تابع تلنه په یوه ټاکلي ورشو یا ساحه کې تر څېړنې نیول کېږي.

دا مو تعریف ډېری او ارزښت ډېری ته لارښودوي.

ځمور د بیلگې تابع دې فقط له $x = -1$ تر $x = +6$ د ارزښتونو په ورشو کې په

هلته رامنځ ته کېدونکو تابع ارزښتونو وڅېړل شي.

تعریف سټ (-ډېری): $D = \{x \mid -1 \leq x \leq 6\}_{\mathbb{R}}$ په دې معنا چې له $x=-1$ تر $x=6$ پورې دتابع خورا کوچنی ارزښت (مینیموم) ککړتکی دی، ځکه چې پارابول پورته لور ته واز دی، پس $x_{\min} = -4$. اوس د انټروال پولې $x=-1$ او $x=6$ څیرل کیږي.


$$f(-1) = (-1)^2 - 6 \cdot (-1) + 5 = 1 + 6 + 5 = 12$$

$$f(6) = 6^2 - 6 \cdot 6 + 5 = 36 - 36 + 5 = 5$$


له دې سره ارزښت سټ دی:

$$W = \{y \mid -4 \leq y \leq 12\}_{\mathbb{R}}$$

د ارزښت ډېری یا -سټ تل د تعریف سټ له لارې ورکول کیږي. د نوري څیړنې لپاره ځمور د بیلگې تاب گراف ترڅیړنې لاندې نیسو.



د سیومټري څیړنه:



له صفرځایونو څخه د ککړتکي شمیرنه

صفرځایونه: x_1, x_2 څرگندېږي. له دې لاس ته راځي:

$$\Rightarrow x_s = \frac{x_1 + x_2}{2} \Rightarrow S(x_s | f(x_s))$$

زموږ د بیلگې لپاره باور لري:

$$x_1 = 1; x_2 = 5 \Rightarrow x_s = \frac{1+5}{2} = 3 \Rightarrow S(3 | f(3))$$

که د مربع تابع صفرځایونه معلوم وي، نو د دې اریتمیتیکي منځ د ککړتکي x کواوردینات دی.

د $-p - q$ فرمول پیداکونه

د یوه مربع تابع د صفرځایونو پیداکولو امکانات د مربع تکمیلیدنو له امله د مربع مساوات د حل له لارې صورت نیسي. د دې لپاره یو د حل فرمول هم منځ ته راوړی شو.

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \text{ مربع مساوات}$$

مو د مربع مساوات نورمالينې ته بيايي:
د $x^2 - 6x + 5 = 0$ حل د مربع تکميليدني له لاري.

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q &= 0 \\ \Leftrightarrow \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q &\Leftrightarrow \left|x + \frac{p}{2}\right| = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \Leftrightarrow x + \frac{p}{2} = \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \\ \Leftrightarrow x_1 = -\left(\frac{p}{2}\right) + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad x_2 = -\left(\frac{p}{2}\right) - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \end{aligned}$$

د ريښې لاندې افاده (ويينه) دېسکريمينانت بلل کيږي.

$$\text{Diskriminante} = D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = \text{دېسکريمينانت}$$

$$\underline{x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D}} \quad \text{د } p-q \text{ -فرمول:}$$

زموږ د بيلگې تابع صفرخايونه دي اوس د $p - q$ -فرمول په مرسته وشميرل شي.

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow p = -6; q = 5$$

لومړی دې دېسکريمينانت وشميرل شي:

$$D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = (-3)^2 - 5 = 9 - 5 = 4$$

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D} = 3 \pm \sqrt{4} \Rightarrow x_1 = 3 + 2 = 5 \vee x_2 = 3 - 2 = 1$$

دېسکريمينانت او د حلونو ست

مربع مساوات تل حلونو نه دي.

بېلگه:

$$x^2 - 6x + 10 = 0 \Rightarrow p = -6 ; q = 10$$

$$\Rightarrow D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = (-3)^2 - 10 = -1$$

-p-q فرمول

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D} = 3 \pm \sqrt{-1} \Rightarrow$$

حل نه لري.

که دېسکریمینانت منفی (کمیزه) مخنځېنه ولري، نو مساوات حلون نه دي، ځکه چې ریښې فقط د مثبت ارزښتونو لپاره تعریف دي.

مربع مساوات کېدی شي چې فقط یو حل هم ولري.

بېلگه:

$$x^2 - 6x + 9 = 0 \Rightarrow p = -6 ; q = 9$$

$$\Rightarrow D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = (-3)^2 - 9 = 0$$

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D} = 3 \pm \sqrt{0} = 3$$

-p-q فرمول: فقط یو حل.

تولگه:

دېسکریمینانت D د یوه مربع مساوات د حلونو تعداد ټاکي


$$x_1 = -\left(\frac{p}{2}\right) + \sqrt{D} \quad \vee \quad x_2 = -\left(\frac{p}{2}\right) - \sqrt{D}$$

د دوه حلونو	$D > 0 \Rightarrow L = \{x_1 ; x_2\}$
دېرې (سټ)	$D = 0 \Rightarrow L = \{x\}$
د یوه حل سټ	$D < 0 \Rightarrow L = \{ \}$
د حلونو سټ نه شته	

د حلونو سټ او د تابع گراف

د یوه مربع تابع د گراف تلنه د مربع مساوات د حلونو سټ باندې څه معنا لري؟
زموږ په بیلګه موږ مربع مساوات لرو دوه، هیڅ او فقط یوه حل سره.

موږ د دې اړونده تابع گراف رسموو.



که دوه صفرځایونه شتون ولري، نو د تابع گراف د x محور دوه واړه غوڅوي.
د یوه صفرځای سره د تابع گراف د x محور په ککړ ټکي کې لمسوي.
که صفرځای مو مخ ته نه پروت، نو د پورته لور ته واز پارابول ککړ ټکی د x محور
پورته لور ته پروت دی، کښته لور ته واز پارابول ککړ ټکی د x محور کښته لور ته
پروت دی.

د ویتا Vieta جمله:

جمله:

x_1 او x_2 د مربع مساوات $x^2 + px + q$ حلونه دي، نو د ویتا د ریښې جمله باور لري:

$$x_1 + x_2 = -p \quad \text{او} \quad x_1 \cdot x_2 = q.$$

بڼوونه (ثبوت): ثبوت د سپړنې له لارې صورت نیسي:

x_1 او x_2 سره ضرب کړی	x_1 او x_2 سره جمعه کړی
----------------------------	-----------------------------

$x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} + \sqrt{D} + \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{D}\right)$ $\Leftrightarrow x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} + \sqrt{D} - \frac{p}{2} - \sqrt{D}$ $\Leftrightarrow x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} - \frac{p}{2} = -p$ $\Rightarrow \underline{\underline{x_1 + x_2 = -p}}$	$x_1 \cdot x_2 = \underbrace{\left(-\frac{p}{2} + \sqrt{D}\right) \cdot \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{D}\right)}_{3. \text{ Binomische Formel}}$ $\Leftrightarrow \left(-\frac{p}{2}\right)^2 - (\sqrt{D})^2 = \left(-\frac{p}{2}\right)^2 - D$ $\Leftrightarrow \left(-\frac{p}{2}\right)^2 - \left[\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q\right] = q$ $\Rightarrow \underline{\underline{x_1 \cdot x_2 = q}}$
--	--

دا جمله د حل د کنترول لپاره بڼه د کار (استعمال) وړ ده.

بیلګه:

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow p = -6; q = 5$$

$$x_1 = 5; x_2 = 1 \quad \text{حل:}$$

$$x_1 + x_2 = 5 + 1 = 6 = -p \quad (w)$$

$$x_1 \cdot x_2 = 5 \cdot 1 = 5 = q \quad (w)$$

صفر خایونه او کرښیز ضریبونه (فاکتورونه)

د وینا جملې له مخې باور لري:

$$\therefore x_1 + x_2 = -p \quad \wedge \quad x_1 \cdot x_2 = q$$

په نورمال بڼه یې د $p = -x_1 - x_2$ سره کیږدی

$$x^2 + px + q = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (-x_1 - x_2) \cdot x + x_1 \cdot x_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x_1 x - x_2 x + x_1 x_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - x_1) - x_2(x - x_1) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{(x - x_1)}_{\text{Linearfaktor}} \underbrace{(x - x_2)}_{\text{Linearfaktor}} = 0$$

د پورته پښتو: کرښیز ضریبونه

یو مربع مساوات چې صفرخایونه یې معلوم وي، کېدی شي د کرښیزو ضریبونو په ضرب سره ولیکل شي.

جمله:

د صفر ضرب جمله:

یو ضرب ټیک هلته صفر دی، چې لږ تر لږه یو ضریب یې صفر وي.

دا زموږ د مربع تابع د مربع مساوات لپاره په دې معنا دی:


$$x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow p = -6; q = 5$$

$$x_1 = 5; x_2 = 1$$

حل:

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 5)(x - 1) = 0$$

اوس پخپله کولی شو، چې مربع مساوات د مخه ورکړشوي صفرخایونو سره جوړ کړو: یو مربع مساوات دي د صفر خایونو $x_1 = -2$ او $x_2 = 3$ سره دې منځ ته راوړل شي، چې کښته لور ته واز وي او ضریب $\frac{3}{4}$ ولري.



بیلګه

د صفرخایونو ټاکلو لپاره د مربع تکمیلیدني له لارې مفصله بیلګه:

په ټوليزه بڼه د پارابول تابع مساوات

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$$

د صفر ځايونو لپاره شرطونه

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 6 = 0$$

$$-\frac{1}{2}x^2 - 2x + 6 = 0 \quad \text{مربع مساوات}$$

باید اوس د مربع تکمیلیدني له لارې حل شي.

$-\frac{1}{2}x^2 - 2x + 6 = 0 \mid : \left(-\frac{1}{2}\right)$ $\Leftrightarrow x^2 + 4x - 12 = 0$ $\Leftrightarrow x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 - 12 = 0$	په نورمال بڼه راوړل نورمال مربع مساوات مربع تکمیلونه
---	---

$$\Leftrightarrow \underbrace{x^2 + 4x + 4}_{1. \text{ binomische Formel}} - \underbrace{4 - 12}_{-16} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+2)^2 - 16 = 0 \mid +16$$

$$\Leftrightarrow (x+2)^2 = 16 \mid \sqrt{}$$

$$\Leftrightarrow |x+2| = \sqrt{16} = 4$$

رینه و بسته یا رینه نیونه

ارزښت حل کړی

$x+2=4 \mid -2 \Leftrightarrow x=2 \Rightarrow x_1=2$	لومړۍ حالت
$x+2=-4 \mid -2 \Leftrightarrow x=-6 \Rightarrow x_2=-6$	دویم حالت

$$x_2 = -6$$

همداسې

$$x_1 = 2$$

صفرخایونه:

$$P_{x_2}(-6 \mid 0)$$

همداسې

$$P_{x_1}(2 \mid 0)$$

د x محور سره غوڅتکی:

د y محور سره غوڅتکی شرطونه:

$$y_s = f(0) = -\frac{1}{2} \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 + 6 = 6 \Rightarrow P_y(0 \mid 6)$$

پوښتنې

پارابولونه د ورکړ شوو شرطونو سره

لومړۍ - د تابع $f(x) = x^2 + a_1x + a_0$ د ضریبونو لپاره باید کوم شرایط پوره شي، له کومو سره چې تابع $f(x)$ صفرخایونه ونه لري؟

دویم - د $f(x)$ او $g(x)$ برعکس ځایونه د x په واکوالي (تابعیت) کې وڅیړی، که باور ولري:

$$f(x) = -x^2 + 1; x \in \mathbb{R} \quad \text{او} \quad g(x) = ax^2 - a; x \in \mathbb{R}; a \in \mathbb{R}^*$$

دریم - د $f(x)$ او $g(x)$ مربع توابع په لاندې توګه ورکړ شوي دي:

$$f(x) = -x^2 - 3x; x \in \mathbb{R} \quad \text{او} \quad g(x) = 0,5x(x+3); x \in \mathbb{R}$$

الف - په کواوردینات - یا پروتولار سیستم کې د $f(x)$ او $g(x)$ گرافونه وکارې. بې له شمیرني دلیل روارې، چې ولې $f(x)$ او $g(x)$ د x په محور سره غوڅوي..

$S(1,5;2,25)$ د $f(x)$ ککره (رأس) دی.

د $g(x)$ ککره ورکړی.

ب - کرښه د $x=u$ سره د $-3 < u < 0$ لپاره $f(x)$ په ټکي P او $g(x)$ په ټکي Q کې غوڅوي.

د P او Q کواوردیناتونه وټاکي.

پ - د PQ بنده کرښه د یوه مستطیل یا ولاړګوډیز یو اړخ (ضلع) دی، چې په دواړو پارابولونو کې دننه ده. د مستطیل منځ یا سطحه د $u = -1$ لپاره او چاپیریال U د u په واکوالي کې وټاکي.

ت - پارابول $g(x)$ د y په لور داسې وکښوي، چې دا راکښل شوی پارابول د $f(x)$ گراف لمس کړي. د لمستکي کواوردینات وشمیري.

ټ - a داسې وټاکي چې $f(a) - f(a+1) = 0$ باور ولري.

څلورم - یو مربع تابع $f(x)$ ورکړ شوی.

a داسې وټاکي، چې پارابول $g(x)$ د $f(x)$ گراف لمس کړي.

پنځم – وښايي، چې د a داسې ارزښت نه شته، چې د $f(x)$ گراف نورمال پارابول لمس کړي.

$$f(x) = ax^2 + 1$$

شپږم – يو پارابول د تابع مساوات $f(x)$ سره په $S(0|6)$ کې يوه ککره لري او د x محور په ټکي ${}^tP_x(2\sqrt{3}|0)$ کې غوڅوي.

د تابع مساوات وټاکي او گراف يې رسم کړي.

اوم – د وييمې درجې ټول کسري (راشنل) تابع $f(x)$ کو او د دینات محورونه په ټکو $P_y(0|-k)$ او $P_{x_1}(k|0); P_{x_2}(-2|0)$ کې غوڅوي.

د $f(x)$ تابع مساوات وټاکي.


اتم – ضریبونه a_1 او a_2 داسې پیدا کړي، چې تابع $f(x) = a_2x^2 + a_1x + 3$ په $x = -1$ او $x = 0,5$ ځایونو کې همغه تابع ارزښت ولري لکه تابع $g(x) = 2x - 1$.

پوښتنې

پارابولونه د ورکړو شرطونو سره ||

لومړۍ – د څیړنو څخه د تابع مساوات وټاکي..

الف	ب –
-----	-----



دویم - د یوه مربع تابع $f(x) = 3x^2 - bx + b$ کراف د x محور په $x = -3$ کې غوڅوي. د تابع ترم وټاکي.

دریم - یو مربع مساوات صفرځایونه -2 او 3 لري او خورا کوچني تابع ارزښت $f(x)$ وټاکي.

څلورم - د مربع تابع $f(x) = x^2 + a_1x + a_0$ د ضریبونو a_1 او a_0 په هکله کومي ویناوي (د ریاضي منطق وگوري) کېدی شي؟

الف - $f(x)$ یو صفرځای $x = 0$ لري.

ب - د $f(x)$ صفرځایونه په مخنځینه کې یو له بل توپیر لري.

پنځم - د یوه مربع $f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ تابع لپاره $f(0) = 5$ او $f(1) = 2$ باور لري

الف - د a_2 او a_1 ترمنځ کومې اړیکې پرتې دي؟

ب - د a_2 او a_1 د کومو ارزښتونو لپاره $x = 3$ صفرځای دی؟

شپږم - پارابولونه د ورکړشو شرایطو له اړخه

الف - د شمیرنې له لارې وښایي، چې د مساوات $f(x) = x^2 - 1,5x + 2$ سره پارابول د x محور سره غوڅتکی نه لري.

ب - د a_2 (د صفر سره نابرابر) د کوم ارزښت سره پارابول د مساوات $f(x) = a_2x^2 + 1,5x + 2$ سره یو تکی، نه کوم تکی یا دوه تکی د x محور سره لري؟

اوم - د تابع $f(x) = x^2 + a_1x + a_0$ د ضریبونو لپاره باید کوم شرطونه پوره وي، چې د هغو له مخې $f(x)$ کوم صفرځای ونه لري؟

اتم - د تابع $f(x)$ خورالوی یا همداسې خورا کوچني ارزښتونه وټاکي.

الف - $f(x) = (x-2)^2 - 2x - 2$ ب - $f(x) = -0,5x^2 + 0,5x - 6$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{47}{8}$
خورالوي ارزښت دی.

د ډاکټر ماخان شینواري لیکنې:

1988 Vienna (Austria):

لومړۍ:

H.K. Kaiser , M. Shinwari : Aproximation compact pological algebra : contributions to general algebra 6 ; Page 117 – 122

1987 Vienna (Austria):

دویم:

Diss . Uni. Interpolation und Aproximation durch Polynime in Universalen Algebren .
Wien

*Dissertation at the Interpolation and Aproximation by Polynome in universal Algebras,
University of Vienna/Austria*

لاندې د شمیرپوهنې پښتو ټول کتابونه په المان کې د ،، افغانستان کلتوري ودې ټولنه، له
خوا چاپ شوي دي

2000 Bonn (Germany):

دریم: د شمیرپوهنې ستر کتاب : د شمیرپوهنې برسیره د انجنري، فزیک او اقتصاد
لپاره ، همداسې د بنوونکو او زده کوونکو لپاره (دا کتاب په ۹۰۰ مخونو کې چاپ
او دا نوي لیکنه به یې ځنو ځایونو غزېدلې او ځنې ځایونه ترې لرې شوي دي)

2003 Bonn (Germany):

څلورم: ځمکچپوهنه (هندسه) ، په سلو، زرو کې شمیرنه، د گټې – او کټې د کټې
شمیرنه ، د احتمالي شمېرنه کتاب د بنوونځي ټولې اړتیاوې پوره کوي

2003 Bonn (Germany):

پنځم: الجبرونه (د الجبر بنسټونه دي)

2003 Bonn (Germany):

شپږم: د شميرپوهنې انگرېزي - پښتو ډکشنري.

2003 Bonn (Germany):

اووم: د شميرپوهنې الماني - پښتو - او پښتو الماني ډکشنري

Mathematical dictionary German/ Pashto and Pashto/German

2003 Bonn (Germany):

اتم: دفرنخيال برابرون (دا کتاب په دې څانگه کې يو پيل دی، ساده ليکل شوی)

Differential equation Translation; An Introduction

Bonn (Germany): 2003

نهم: د شمير پوهنې فرمولونو ټولگه

Mathematical Formulas

2003 Bonn (Germany):

لسم: شميرپوهنه له عربي په پښتو

1997 Bonn (Germany):

يوولسم: د افغانستان په هکله سپينې خبرې: په المان کې

،د افغانستان روغي او بيا ابادولو ټولنه،، له خو

يادونه: له ۲۰۰۰ کال دمخه ډاکټر ماخان شينواري د ،،د افغانستان روغي او بيا
ابادولو ټولنه،، له خوا درې ساسي مجلې هم را وستلي.

د ډاکټر ماخان ،،ميري،، شينواري ليکنې او ژباړې چې په چاپيدو يې پيل کيږي

2012 Bonn; Germany; Kabul Afghanistan

ژباړې:

: Prof. Brinkmann. (From Brinkmann.du.de)

لاندې د برينکمن ليکنې چې له پرينکمن ن ج څخه ژباړل شوي دي.

- ۱ - شميرپوهنه د بنوونځي لپاره لومړی ټوک
- ۲ - شميرپوهنه د بنوونځي لپاره دويم ټوک
- ۳ - شميرپوهنه د بنوونځي لپاره دريم ټوک
- ۴ - د احتمالي شميرنه د بنوونځي لپاره
- ۵ - احصايه يا ستاتيستيک د بنوونځي لپاره

لاندې کتابونه د شتوتگارت د پوهنتون د استادانو د لکچرونو څخه چې د شتوتگارت
پوهنتون ن ج څخه خپاره شوي را ژباړل شوي.

- ۶ - اناليزی ۱
- ۷ - اناليزي ۲
- ۸ - کربنيز الجبر
- ۹ - د شميرپوهنې بنسټونه
- ۱۰ - د فرمولونو ټولگه

۱۱ – فنکشنل انالیز

۱۲ – وکتور شمیرنه

نورې ژباړې

۱۳ – له www.grundstudium.info/linearealgebra څخه: کرښيز الجبر

۱۴ – Georg Guttenbrunner گڼونپوهنه يا د اعدادو تيوري

زما ليکنې

Bonn (Germany):

۱۵ - د شميرپوهنې ستر کتاب دويم چاپ د پوره تغيراتو سره : دا کتاب د شميرپوهنې برخې برسيره د

انجنري، فزيک او اقتصاد لپاره ، همداسې د ښوونکو او زده‌کوونکو لپاره پوره گټور دی. په کتاب کې د اړتيا سره زياتونه او کونه راغلي

۱۶ - ځمکچپوهنه (هندسه) دويم چاپ د پوره تغيراتو سره

۱۷ – الجبر بنسټونه دويم چاپ له تغيراتو سره

۱۸ - ډېرې پوهنه يا سټ تيوري

۱۹ – د شميرپوهنې سم اند (منطق رياضي)

۲۰ - د يو څو شميرپوهانو ژوندليک

۲۱ – د شمير پوهنې گډې وډې ليکنې

۲۲ - داهم ژباړه ده، خو لیکونکی يې متأسفانه راڅخه نابلد شوی: د مشتق او انتيگراډ شميرنو ته تمرينونه او اوبيوني يا حلونه يې

۲۳ – د شميرپوهنې انگريزي پښتو او عربي + درې ډکشنري

۲۴ - د شمیرپوهنې پښتو انگرېزي ډکشنري

۲۵ - د شمیرپوهنې پښتو ډکشنري د شمیرپوهنیزو وییونو په پښتو روښانه ونه

۲۶ - د زړه له کومې (دا هغه لیکنې دي، چې ځنې یې په نړیول جالونو کې خپرې شوي دي).

۲۷ - د افغانستان په هکله سپینې خبرې، چې و به غزیري.

نوري لیکنې، چې په ژباړه یې پیل شوی، خو لا پوره نه دي

- د شتوتکارت پوهنتون لکچرنوټونو څخه، چې د شتوتکارت پوهنتون ن ج څخه خپریږي:

د گروپونو تیوري

- د ښوونځي لپاره فزیک د برینکمن لیکنه

له پنځم ټولگي څخه تر اووم ټولگي پورې ژباړل شوی (دا چې زما دویم مسلک فزیک دی، دا لیکنې ژباړم. دا هم د دې لیکوال یوه ډېره ښه لیکنه ده، چې د شمیرپوهنې په څیر- دلته هم زیات تمرینونه د حل یا اوبیوني سره په کې راغلي او ماته زیات گټور برېښي)

دا لاندې د ښوونځي کتابونه دا اوس پای ته ورسیدل:

شمیرپوهنه د اوم ټولگي له پاره

شمیرپوهنه د اتم ټولگي له پاره

شمیرپوهنه د نهم ټولگي له پاره

شمیرپوهنه د لسم ټولگي له پاره

شمیرپوهنه د یولسم ټولگي له پاره

شمیرپوهنه د دولسم ټولگي له پاره

ریاضي برای صنف دوازده

د ليکوال ژوند ته لنډه کتنه

ماخان په اولني نوم ميري شينواری د ارواښادي پستو او ارواښاد نوررحمان زوي په ۱۳۲۰ ه لمریز کې د شينواریو هسکه مینه کې دې نړۍ ته سترگې راغړولي. د هسکې مینې د لومړني ښوونځي (د لومړنيو زده کوونکو څخه) څخه وروسته د رحمان بابا لیسې له ۱۹۵۴ تر ۱۹۶۵ پورې (ښوونځي له لومړي ټولګې پیل او د دویم ټولګې څخه ګام او پای).	
--	--

د ۱۹۶۶ تر سپټمبر د کابل طب پوهنځۍ له ۱۹۶۶ سپټمبر څخه د اتریش برس، چې هلته یې د شمیرپوهنې ډاکټري په پوره ستونځو تر لاسه کړه.

د ۱۹۸۷ ش ک تر ۱۹۸۸ د فبروري تر پای د دباندنیو چارو وزارت کې مامور.

د ۱۹۸۸ مارچ څخه تر ۱۹۹۲ جون پورې په بن کې د افغانستان جمهوریت سفارت شارژد افیر (صفر نه وو).

له هغې وروسته په جرمني کې سیاسي پناه. له ۲۰۰۸ مارچ څخه د ۲۰۰۹ دسمبر پورې د ریاضي څانګه کې د پوهنې وزارت درسي نساب کې دنده.

ماخان ميري په ۱۹۷۲ کې له لري د میرمن ښاپیری سره واده شوی، چې د واده خبر ورته اتریش ته راغی.

ده د میرمن ښاپیری سره په ۱۹۶۳ ز ک کې کوزده کړې وه.

دوي ته لوي څښتن په اتریش ویانا کې د مای په شلم ۱۹۷۹ ز ک دوه بچیان وبخښل، چې څانګه او اباسین نومیري. څانګه په المان کې د پوهنتون علمي همکاره وه او د حقوقو ډاکټره ده او اباسین ملي اقتصاد او ټولنیزه سایکولوژي لوستلی.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library